Als ich im
welche den
anderweit n
schriften mi
aufzutreten.
— aber aucl
sondern dur
sei dieser D
Das mi
stellungen d
stomeen, l
den Laien
milie bekan
Haupttypus
heiten mit
Da ich
acquirirten
eine Wildbau
selbst nach
liehen, de
Hi
den vie
Sträuch

No. 17.

Preis-Courant

von

G. Geitner's
Treibegärtnerei

zu

Planitz bei Zwickau

in

SACHSEN.

Frühjahr und Herbst

1858.

Inhalt.

Kalt-, Warmhaus-, Freilandpflanzen und deren 37 Unterabtheilungen, nebst vollständigem, alle Synonymen mit enthaltendem Index.

Allgemeine Bemerkungen.

Wer nicht selbst von diesem Preis-Courant Gebrauch mach verbindet mich durch Verbreitung desselben im Kreise seiner Fre vielem Dank.

Die Preise sind in Preuss. Courant: 1 Thlr. = 30 Ngr., 4 Thlr. = 7 fl. b und österreichische Fl. nach Cours. Beträge unter 10 Thlr. avancire i(die Post. Ueber, 3 Monat nach Absendung noch ungetilgte Posten, verfüge Wechsel. Aufträge von unbekannten Bestellern bleiben, ohne beigefügten Betrag messe auf gute Häuser und Plätze) stets unberücksichtigt. **Aufträge und Gel gen werden franco erbeten; ebenso deutliche Namensunter**

Der Transport der Waaren geschieht **stets und ohne Ausnah Kosten und Gefahr der Empfänger.** Colli's unter 20 Pfd. werden der rüber der Eisenhahn direct (also ohne Vermittelung eines Spediteurs) zur B als Eilgut übergeben. **Von besonderer Wichtigkeit ist die Angabe Bestimmungsorte zunächst gelegenen Bahnstation, und da, Spediteur-Vermittelung nothwendig oder gewünscht wird, A einer betreffenden Firma.** Zur Beschleunigung der Effectuirung ist derlich, die Commission auf ein besonderes Blatt zu verzeichnen. **Etwaige I ferenzen gegen andere Cataloge von soliden Häusern bin ich stets auszugleichen.**

Zeichenerklärung.

Nachstehende öfters hier vorkommende Zeichen bedeuten: **r** rankend, **z** zwiebel **k** knollig, **b** im Freien ausdauernd, **e** unter Decke, **f** auf Sommergruppen, **st** S ***** gigantische Form, † grosse Blattform.

Einiges über die Behandlung frisch angekommener Pflanzen.

Weitere Reisen, plötzlich eintretende Kälte, meist aber verfehlte Behandlung nach dem Auspacken der Pflanzensendungen — rauben oft das Beste! es mögen daher nachstehende Andeutungen dem weniger Eingeweihten willkommen sein.

Bei gut ankommenden Sendungen, halte ich sofortiges Verpflanzen für sehr gerathen, und selbst kalten Pflanzen, wird dann ein wenig Bodenwärme und gesperrte feuchte Luft dienlich sein. Für kranke Pflanzen ist die erste Bedingung kein Luftzug, wenig Bodenwärme, feuchte Atmosphäre, nothdürftiges Giessen, keine Sonne, doch hinlängliches Licht. Bei knolligen Pflanzen ohne, oder doch gewelktem Trieb und noch irgend feuchter Erde, darf anfangs gar nicht gegossen werden; durch die feuchte Luft müssen die Sauggefässe erst wieder gehörig anschwellen, um die später in reicherem Maasse gewährte Nahrung verbrauchen zu können. Würden diese einfachen Rathschläge befolgt, wie manche gute Pflanze würde erhalten, wie mancher ungerechte Vorwurf unterbleiben.

Da mein erster Blumenzwiebel-Catalog mit so grossem Beifall aufgenommen wurde, so erscheint derselbe auch in diesem Jahre, jedoch im Juni, und bitte daher, geneigte Aufträge hierfür, an sich zu halten.



Vorwort.

Als ich im vergangenen Jahrgange diejenigen Gewissenlose und Unwissende schalt, welche den Glauben zu verbreiten suchen, — als kämen hier gezogene Pflanzen anderweit nicht fort — erhielt ich aus allen Theilen des Festlandes billigende Zuschriften mit der Aufforderung, noch energischer gegen so schmähliche Verläumder aufzutreten. Diese erfreuliche Theilnahme verdient zunächst meinen wärmsten Dank — aber auch Denen, die nicht nur meiner Firma auch in diesem Jahre treu blieben, sondern durch ehrende Empfehlungen nach Aussen deren Ruf erweitern halfen — sei dieser Dank gewidmet.

Das mir gesteckte Ziel verfolge ich unermüdet, und sind die neuen Zusammenstellungen der **Acanthaceen**, **Amaryllideen**, **Liliaceen**, **Araliaceen** und **Melastomeen**, hierfür der redendste Beweis — und hoffe ich, diese Arbeit möge besonders den Laien zu gut kommen, denn ist ihnen nur eine Gattung aus irgend einer Familie bekannt, so stehen diese einander immer so nahe, dass sich leicht auf den Haupttypus der ganzen Familie schliessen lässt, so dass sie bei der Masse von Neuheiten mit oft prunkenden Namen nicht leicht irre geleitet werden können.

Da ich in diesem Jahre mit meinem Etablissement auf einem eigens hierzu acquirirten grösseren Grundstück und unter Leitung eines besonderen Obergärtners eine Wildbaumschule und deren Nebenzweige vereine, so wird ihm hierdurch — selbst nach Aussage vieler ehrenwerther Geschäftsfreunde — erst der Umfang verliehen, der ihm längst Noth gethan.

Hierzu habe ich die von meinem seligen Vater, dem unter den Pflanzenfreunden viel gekannten **Dr. E. A. Geitner** zu **Auerhammer**, angelegte Baum-Sträucher- und Staudenschule übernommen, und kann daher schon im ersten Jahre so Manches bieten.

Dass ich ausserdem keine Kosten scheute, wiederum viel **Gediegenes** und **Neues** zu bieten, wird Jeder finden, der der Durchsicht des Catalogs nur ein Stündchen widmet. Damit aber, bei so vielen Namenswechseln, nicht manche Pflanze unaufgefunden bleibe — so sind im Register auch alle im Catalog enthaltenen *Synonyma* aufgenommen, wodurch ersteres zu dem erhoben wird, was es überhaupt sein soll — ein untrüglicher Führer durchs Namenlabyrinth.

Mit Beginn des kommenden Mai führt die Eisenbahn ein kleines Viertelstündchen unterhalb des Gartens vorbei (Station **Cainsdorf**), und da Niemand riskirt, die im Catalog verzeichneten Pflanzen hier nicht zu finden — so wird es mich freuen, ausser neuen Aufträgen auch wieder so manchen meiner ehrenwerthen Geschäftsfreunde persönlich kennen zu lernen. Inzwischen bietet Ihnen hochachtungsvollst seinen Gruss

G. Geitner.

Warmhauspflanzen.

	Thl.	ngr.
Abrus precatorius *L.*	—	10
— species (Ost Indien)	—	20
Achyranthes porrigens *Jacq.*	—	5
— sanguinolenta *Crantz* (Aërva sanguinolenta *Blume*)	—	5
Acronychia Cunninghami *Hook.*	1	—
Adamia cyanea *Wall.*	—	10
— versicolor *Fortune*	—	10

Schöner Blumenschmuck und so frühes als dankbares Blühen empfehlen diese Pflanze.

Rtl. ngr.

Afzelia grandis *hort.* . . . . . 3-8 —
Algalmyla staminea *hort.* . . . . 1 —
Allamanda cathartica *L.* . . r — 10
— neriifolia *Ad. Brogn.* . . — 10
— Schottii *Pohl.* . . . . r — 10
— verticillata *Desf.* . . . . . — 10

Wegen leichter Cultur und dankbarem Blühen wird diese Gattung viel gesucht; überraschend ist der Effect, wenn sie ausgepflanzt werden können.

Angelonia Gardneri *Hook.* . . f — 5

Im Sommer ins Freie gepflanzt giebt sie grosse Büsche, die auch dankbar blühen. Beim Berühren der Blätter verbreitet sich der Duft einer reich gefüllten Aepfelkammer.

Anguria Makoyana *Ch. Lem.* . r — 8
— Warszewiczli *Ch. L.* . . r — 10
Ardisia acuminata *W.* . . . . . 1 —
— complanata *Wall.* . . . . 1 —
— crenulata *Vent.* . . . . . — 5-10
— — fructu albo . . . . — 15
— crispa *DC.* var. rubra (Bladhia crispa *Thbg.* Ard. crenulata *Lodd. non Venth.* crenata *Bot. M.* lentiginosa *Ker.* glandulosa *Bl.* . . . . . . 1 —
— hymenandra *Wall.* . . . ½-1 —
— paniculata *Roxb.* 1 15
— punctata *Linn.* . . . . . 1 —

Ardisia crenulata und fr. alb. gewähren, bedeckt mit rothen oder weissen Früchten einen herrlichen Anblick; die anderen sind eben so schöne Blattpflanzen.

Argyreia argentea *A. Chois.* . r — 7

Schön geformtes Blatt, mit silberweisser Rückseite.

— Choisyana *J. Makoy Cat.* . — 10
Aristolochia gigas *Hartw.* et *Sk.* r — 5
— picta *Karst.* . . . . . . r — 10
— saccata *Wall.* . . . . . r — 10
— trilobata *L.* . . . . r — 5

Diese Gattung zeichnet sich durch originelle Formen und buntes Colorit der Blumen aus.

Artanthe Cumanensis *Miq.* Columb. 1 —
Asclepias curassavica *L.* . . f — 5

Im Sommer ins Freie ausgepflanzt macht sie grosse Büsche, bedeckt mit gelben und braunen Blüthenbüscheln.

†Astrapaea mollis *hort.* . . . . ½-1 —
* — Wallichii *Lindl.* . . . . . ½-1 —

Ausserdem besitze ich eine sehr grosse und schöne Pflanze von 16 Fuss Höhe und 10 Fuss Kronendurchmesser, welche alljährlich kostbar blüht. — Preis 25 Thlr.

Bambusa Metakli . . . . 1 —
Banisteria argentea *Spr.* (Heteropsis *H.B.K.* . . . . . . 1 —
— splendens *D.C.* . . . . . 1 —

Rtl. ngr.

Barbacenia purpurea *Hook.* . . . — 15
— Rogierii *Planch.* . . . . . — 15
— squamata *Paxt.* (sanguinea *hort.*) . . . . — 20

Ihr reiches und schönes Blühen rechtfertigt hinlänglich ihren Ruf.

Barringtonia acutangula *G.* (Eugenia acutangula *L.* racemosa *Roxb.* Stravadium rubrum *P.* coccineum *D. C.*) Columb. . 6 —
Barnadesia floribunda *hort.* . . . — 10
— grandiflora *hort.* . . . . . — 10
— rosea *L.* . . . . — 10
Bignonia Carolinae *Lindl.* . . r — 5
— grandiflora *Jacq.* . . . r — 10
— speciosa *Lindl.* (picta *Hook.*) r — 10
— Tweediana *Lindl.* . . . r — 10
Biophytum sensitivum *D. C.* . . — 5

Dieses kleine Pflänzchen ist ein Seitenstück zu Mimosa pudica; nur legt sie bei der Berührung ihre Blätter rückwärts zusammen; aber auch der ganze Bau der Pflanze ist originell, denn die mehrere Zoll langen gefiederten Blätter stehen schirmartig im Kreise um das Stämmchen.

Bleekeria kalokarpa *Hisk.* (Lactaria calocarpa *Cat. nost.* . 1 —
*Bonapartea juncea *Ruiz* et *Pav.* (Littaea geminiflora *Brign.* Agave) . . . . 3-20 —
*Brexia chrysophylla *Swt.* . . . 1 —
* — madagascariensis *Ker.* . . 1 —
* — serrata *Lindl.* . . . . . . 1 —
— umbellata *hort.* . . . . . 1 —

Sie zeichnen sich durch Form und Haltung der Blätter aus, die der chrysophylla sind zart colorirt.

†Brownea coccinea *Jacq.* . . . 1-2 —
— erecta *hort.* (Theophrasta pinnata *Jacq.*) . . . . . . 10 —
† — grandiceps *Jacq.* . . . . 10 —
† — latifolia *Jacq.* . . . . . 5 —
† — princeps *hort.* . . . . . . 10 —

Während des Triebes der B. sind Farbe, Form und Haltung der Blätter höchst originell.

Brucelia violacea *hort.* (Phytolacca) — 5

Reich belohnt sie die wenige Mühe ihrer einfachen Kultur, mit fusslangem rothem Blüthenstiel, weissen Blüthchen und später fast schwarzen Beeren.

Bruckea grandiflora *hort.* . . . — 20
Brugmansia bicolor *Pers.* (Datura sanguinea *R.* et *P.* . . . . — 15
— candida *Pers.* . . . . . f — 10
— floribunda *Paxt.* (Juanulloa parasitica *R.* et *P.* . . . . — 15
Brunfelsia americana *L.* . . . . — 10

Thl. ngr.

Bryophyllum calycinum *Salisb.* . — 5
Höchst merkwürdig durch ihre Knospenbildung aus den Blättern.

Buginvillea grandis *hort.* . . . . — 10
— spectabilis *Juss.*, (— bracteata *P.* — brasiliensis *Rausch* — Josepha augusta Arabida) — 10

Burchellia capensis *R. Br.* . . . . — 10
Eine alte Bewohnerin unserer Warmhäuser; erfreut sie durch ihre langdauernden Blumen selbst im Freien.

Calodracon heliconiaefolia *Planch* (Cordyline *Otto* et *Dietr.* Dracaena brasiliensis *hort.* Cord. Escholziana *Mart.*) . . . 1/6-1 —
— Jacquinii *Planch.* var. atrosanguinea *Goepp.* (Drac ferrea *L.*) . . . . 1/6-1 —
— — var. purpurea-variegata *Goepp.* (Drac. terminalis *hort.*) . . . . 1/6-1 —
— Sieboldii *Planch.* (Drac. nobilis et Sieboldii *hort.*) . . 1/3-2 —

Calotropis gigantea *P. B.* . . . . 1 —

Campylobotrys discolor. *Ch. Lem.* (Higginsia *Planch.*) . . . — 10
Jedes zwischen den Blattrippen liegende Theilchen ist erhaben, so dass das schön dunkelgrün, im Sonnenschein atlasschimmernde Blatt wie gepresst erscheint; ausserdem ist sie unermüdlich im Blühen.

Cecropia palmata *W.* . . . . . 1 —
— peltata *L.* . . . . 1-3 —
Mit gefingerten Blättern und fast schneeweisser Rückseite, während die Blattrippen bei jungen Blättern rothbraun sind.

Cephalotus follicularis *La Bill.* . 4-8 —
Diese kleine originelle Schlauchpflanze legt mit gepressten und gefranzten Rändern, sowie mit bunten Deckeln versehene Schläuche rings auf den Topf. Gehört gleich den Sarracenien zu den Wundern der Schöpfung.

Cerbera fruticosa *Roxb.* . . . . . — 15

Ceropegia elegans. *Wall.* . . . . — 10
Wer die eigenthümliche Färbung und den Bau der Stapelienblumen liebt, ohne deren widerlichen Geruch, der wähle diese Ceropegie.

Charlwoodia angustifolia *Miq.* (ensifolia *hort.*) . . . . . . — 15
— congesta *Sweet.* (Arista *hort.* Drac. *Sweet.* Cordyline *Knth.*) — 5-15
— longifolia *Goepp.* (Cordyline *hort. Belg.*) . . . . — 10
— rubra *Planch.* (Cord. *Hüg.*) — 15
— spectabilis *Planch.* (Cord. *Knth.* et *Bouché.* Cord dracaenoides *Knth.* Dracaena stricta *hort. Berol.* splendens *hort.*) . . . . — 15

Charlwoodia stricta *Knth.* (Drc. *bot. Mag.* Cordyline stricta *Knth.*) — 10
Zur Zimmerdecoration empfehlen sie sich besonders durch Dauer und Schönheit.

Chlorophytum Orchideastrum *Ldl.* — 10
— Sternbergianum *Steudel.* (Cordyline vivipara *hort.*) . — 5-10
Eine sehr eigenthümliche Ampelpflanze, wie die Erdbeere rankend und an diesen junge Pflänzchen bildend.

†Cissus discolor *Blume* (marmorea *hort.*) . . . . — 5-10
Ihr Ruf ist ein so anerkannter, dass sie, obwohl zu Tausenden verbreitet, immer neue Gönner wirbt; denn selbst im gewöhnlichen Zimmer verliert sie kaum von ihrem prachtvollen Colorit.
— elegans *hort.* . . . . . . — 10
— velutina *h. Belg.* . . . r — 5

Clerodendron calamitosum *L.* . — 10
— capitatum *Schuhm.* . . . . — 20
— emirnense *Hook.* (— floribundum *Ldl.* non *R. Br.*) . — 5
— fallax *Ldl.* (— speciosissimum *Paxt.* squamatum *H. Anglici*) . . . . — 15
— foetidum *Bunge* (Cl. Bungei *Steud.*) . . . . 1/2-1 —
— fortunatum *L.* . . . . . . — 20
— fragrans *W.* (Volkameria fragrans *Vent.* — Volkmannia japonica *Jacq.* . . . — 5
— glaucum *Wall.* . . . . . . — 10
† — hastatum *Wall.* . . . . . — 10
— heterophyllum *R. Br.* . . . — 5
— Kaempferia *Siebold* . . . — 20
— laevifolium *Bl.* . . . . . . — 10
— paniculatum *L.* (pyramidale *Andr.*) . . . . — 20
— purpureum simplex . . . — 5
— splendens *Knight* . . . . — 15
— tomentosum *R. Br.* . . . . — 10
— villosum *Bl.* (infortunatum *Dennst.* non *L.*) . . . . . — 10
— volubile *P. B.* . . . . — 10
Im Winter stelle man sie sämmtlich trocken (selbst wenn sie die Blätter werfen) und kühl, lasse sie ordentlich ruhen, und man wird sich im Sommer durch deren Blüthenpracht reich belohnt finden.

Clitoria dichotoma *hort.* . . . . — 15
— ternata *L.* . . . . — 10
— — alba. . . . . — 10
Es sind dies ausgezeichnete Schlingpflanzen, die selbst ganz jung schon durch ihre eben so schönen als originellen Blumen einen hohen blumistischen Werth haben.

Fl. ngr.

Clusia superba *hort.* . . . . . 1 —
— spec. (Columb.) . . . . 6 —
Coccoloba barbadensis *Jacq.* . . 1 —
† — excoriata *L.* . . . . . . 1 —
— macrophylla *Desv.* . . . 2 —
* — pubescens *L.* . . . . . . — —
†Coleus Blumei *Benth.* (Plectranthus versicolor *v. Htte.* Pl. scutellarioides *Bl.*) . . . — 5
† — Mackayi *Benth.* . . . . — 5
— Persoonii *Benth.* . . . . . — 5

Vorstehende Pflanzen bilden mit ihren verschiedenfarbig gestreiften und gefleckten Blättern eine sehr belebende Zierde bei Decorationen.

Combretum argenteum *Wall.* (C. purpureum *Vahl.*) . . . — 10
— macrophyllum *Roxb.* (latifolium *G. Don.*) . . . . . 1 —
Convolvulus fruticulosus *Desr.* r — 15
— pentanthus *Jacq.* . . . r — 10
— scaber *hort.* . . . . . . r — 10
*Cordyline arborea *Goepp.* (Dracaena *Lk.* Rumphii *hort.* non *Hook.* Aletris arborea *Willd.*) 1/6-4 —
— australis *Kth.* (Dracaenopsis *Bl.* Dracaena *Hk.*) . . 2/3-1 —
* — cannaefolia *R. Br.* . . . 3 —
† — concinna *hort.* (Dr. concinna) 4 —
† — Fontanesiana *Planch.* (Dr. elliptica *Desf.* Dr. nigra *hort.* Drac. Fontanesiana *Schott.*) — 15
* — fragrans *Planch.* (Drac. fragrans *Ker.* Aletris arbor. *L.* 10N.-20 —
† — fruticosa *Goepp.* (Drac. fruticosa *h. Berl.* Dr. excelsa *Ten.*) — 20
— indivisa *Steud.* (Dr. *Forst.* Charlw. *Swt.*) . . . . .6-10 —
† — juncoides *hort.* . . . . . 3 —
† — marginata *Goepp.* (Drc. marginata *Lam.* Drac. tessellata *Willd.* Drc. mauritiana *hort.* Drac. gracilis *hort.*) . . . 1-2 —
† — reflexa *Planch.* (Drc. reflexa *Lam.* Drac. purpurea et cernua *h. Berol.*) . . . . . — 10
† — salicifolia *Goepp.* (Drac. linifolia et salicifolia *hort.* Drc. pumila *hort.*) . . . . . — 5-10
* — Sieboldii *Planch.* var. maculata . . . . 1-2 —
* — umbraculifera *Goepp.* (Drac. umbraculifera *Jacq.* . . . 2 —

Aus unsern beliebten Dracaenen sind meist Cordylinen, Charlwoodien und Calodracon geworden. Sie sind und bleiben demungeachtet unsere unentbehrlichen Decorationspflanzen. Im düstersten Winkel des Blumentisches halten sie Jahre lang unverdrossen aus.

Corynocarpus laevigatus *Forst.* . 2 —
Cosmophyllum cacaliaefolium *Ad. Br.* et *Bché.* . . . . . . — 10
Crescentia macrophylla *hort.* (Ferdinandusa superba *hort.*) . 2 —
— montana *h.* Columb. . . . . 1 —
Croton pictum *hort.* (Codiaeum chrysostictum *Sprgl.* pictum *Hook.*) . . . . — 15

Dunkelgrünes Blatt mit hellgelben Blattrippen und lichten Blattstielen machen sie zu einer effectvollen Blattpflanze.

— spec.? (Codiaeum) . . . 1-3 —

Diese kostbare Acquisition stammt aus Java; deren Blätter sind bei nur 1/2 Zoll Breite am Rande und in der Mitte mit einem hellgelben Längsstreifen versehen. Bedenkt man nun, dass bei dieser geringen Breite und dem effectvollen Colorit die Blätter an 24 Zoll lang und herunterhängend sind, sowie dass die Pflanze dicht belaubt ist, so wird man mir beistimmen, dass ich sie eine kostbare Acquisition nenne.

Cryptolepis longiflora *Bl.* . . . — 10
*Curculigo recurvata *Dryand.* . . — 5-10
* — Sumatrana *Roxb.* . . . . . — 20

Bei Zimmerdecorationen schon ihrer Ausdauer wegen unentbehrlich.

Cyrtoceras Gibsonii *hort. Angl.* (Hoya *hort.*) . . . . — 10
Desmodium gyrans *D. C.* . . . . — 20

Vom frühen Morgen in steter Bewegung, sinken ermattet die Blätter und Blättchen am Abend in sich zusammen. — Ein Wunder der Schöpfung.

Dichondra sericea *Sw.* . . . . . — 15

Niedliche weissglänzende Ampelpflanze.

†Dichorisandra ovalifolia *Prest.* k — 10
— ovata *Mart.* . . . . . . k — 10
† — picta *Lodd.* (D. picta cuprea alba) . . . . k 1 —
— pumila *hort.* . . . . . . — 10
— vittata *hort.* (cupreata *hort.* *v. Htte.*) . . . . 1 —

Die ganze Gattung zeichnet sich nicht nur durch schöne, theilweise mit seltenem Colorit überzogene Blätter, sondern auch durch effectvolle Blumen aus.

Dictyanthus campanulatus *Rchb.* (D. Pavoni) . . . . — 10

Hält in Bezug auf seine Blüthen einen Vergleich mit den originellen Stapelien aus.

*Dionaea Muscipula *Ellis* . . . 1/3-3 —

Wem wäre nicht diese zierliche, wunderbar ausgerüstete „Fliegenfalle der Venus“ bekannt? Ein Wunder der Schöpfung! Wie mir selbst viele Damen ver-

fl. ngr.

sichern, die nobelste, zierlichste und interessanteste Nipptischpflanze, welche existirt, und im Zimmer cultivirt nur einer kleinen Glasglocke und eines Untersetzers bedarf, um die zu ihrem Gedeihen nöthige regelmässige Feuchtigkeit zu erhalten. Ich kenne solche Pflanzen, die auf diese Weise Jahre lang sich hielten, und selbst bei solchen, die sich nicht zu Pflanzenfreunden zählen, Beifall und Staunen erweckten.

Dioscorea alata *L.* . . . . . . r — 10
— discolor *hort.* (vera) . . r k — 10
Die nobel geformten Blätter beider, deren leichte Cultur, üppiger Wuchs und das bunte Colorit lassen sie empfehlen; die letztere rankte im Palmenhause in einem Holzkasten gepflanzt, in wenig Wochen 24 Fuss hoch, zeugte auch ellenlange weitverzweigte Blüthentrauben und erregte allgemeine Bewunderung.

Dipladenia urophylla *Hook.* (Echites *Hook.*) . . . . 1 —
Dodonaea macrocarpa *hort.* . . 2 —
Dorstenia arifolia *Lam.* . . . — 15
— contrajerva *L.* . . . . . — 20
— Ceratosanthes *Lodd.* . . . — 20
Dracaena Boerhavii *Ten.* . . . 5 —
— Draco *L.* (yuccaeformis *Vand.* canariensis *hort.*) . . . . — —
Duranta Ellisia *L.* . . . . — 5
Echites difformis *Wall.* . . r — 10
* — melaleuca (picta) *hort.* . r — 10-20
— nutans *Anders.* . . . r — 10-20
— purpurea *hort.* (Tylophora flavescens *hort.* — Tyl. lutescens *Desn.*) . . . . . — 10
— sinensis *hort.* . . . . . r — 5
Die Echites zeichnen sich schon durch ihr schönes Blattcolorit aus, zumeist aber E. nutans, auf dessen dunkelgrünen Blättern der kleinste Nerv wie mit Blut gezeichnet erscheint, wogegen sinensis geeignet ist, in kurzer Zeit die grössten Wandflächen mit seinem dichten massigen Laubwerk zu bedecken.

Elaeocarpus cyaneus *Sims.* . . 2 —
Embryopteris glutinifera *Roxb.*
* (Diospyros Embr. *P.*) . . . — 15
Erythrina glauca *W.* Columb. . — 20
— velutina *W.* . . . . . . 3 —
Erythrochiton brasiliensis *Nees.* 1-3 —
Eucephala crocea *Moritz.* . . . . — 15
Mit prachtvollen orangenen Blumen.

Euphorbia caput Medusae *Linn.* — 10
— fulgens *Karw.* (jacquiniaeflora *hort.*) . . . . — 10
— pulcherrima *W.* (Poinsettia *Grah.*) . . . . — 10
— splendens *Boj.* . . . . . . — 10
Schlanker Wuchs, feurige Blumen zeichnen diese Gattung aus.

fl. ngr.

Exostemma floribundum *R.* et *Sch.* 1 —
Ficus acuminata *Hamilt.* (cerasiformis *H. Glask.*) . — 15
† — Afzelii *G. Don.* . . . . . — 15
— aquatica *W.* . . . . — 15
— arbutifolia *Lk.* . . . . — 10
† — australis *W.* . . . . . 1/3-1 —
† — bengalensis *L.* (Urostigma *Miq.*) . . . . — 20
† — cerasiformis *Parment.* . . 1 —
Zeichnet sich durch sehr schöne Früchte aus.

— citrifolia *Lam.* . . . . . — 10
— cuspidata *Desf.* . . . . . — 10
† — diversifolia *Blume.* Synoecia *Miq.*) . . . . — 10
* — elastica *Roxb.* (Urostigma *Miq.*) . . . . 1/3-2/3 —
— glabrata *H. B. K.* . . . . — 15
† — heterophylla *Lam.* . . . — 15
— indica *L.* . . . . — 10
— lucida *Ait.* . . . . — 10
— macrophylla *Desf.* . . . — 20
— — *Roxb.* (Roxburghii *hort.* Artocarpus imperialis *hort.*) (Covellia *Miq.*) . 1-3 —
† — Martinicensis *hort.* (et *W.* Brosimum microcarpum ? *Schott.*) . . . . 1/2-1 —
— maxima *Mill.* . . . . . . — 15
Die grossen mit weisser Mittelrippe gezeichneten Blätter reihen ihn unter die schönsten F.

* — Murrayana *h. Berol.* . . . — 20
— nitida *Thbg.* . . . . . . — 15
— nymphaeaefolia *L.* (Urostigma *Miq.*) . . . . 2 —
— oblongata *Lk.* . . . . . . — 20
— quercifolia *Lodd.* . . . . . — 5-15
— religiosa *L.* (Urostigma *Miq.*) — 10
— scabra *Forst.* . . . . . . — 10
* — Schottii *h. Berol.* . . . — 20
— stipulata *Thbg.* (scandens *Lam.*) . . . . r — 10
Da wo feuchte Wände sind, ist zu deren Bekleidung nichts empfehlenswerther.

* — subpanduraeformis *De Vriese?* (leonensis et sp. d'Afrique *h. V. Houtte*) (Urostigma *Miq.*) . . . . — 15
† — tomentosa *Roxb.* (barbata *Wall.*) . . . . r — 10
Wächst rasch an feuchten Wänden empor, und macht durch seine grossen atlasschimmernden, zu beiden Seiten dicht und dachziegelförmig stehenden Blätter einen köstlichen Effect.

Thl. ngr.

Ficus spec. e Columbia . . . . 3 —
— urophylla *Wall.* . . . . . . — 15
— venosa *Ait.* (infectoria *W.*) — 10

Die ganze Gattung verleiht durch ihre meist dunkelgrünen lederartigen Blätter und grossen mannichfaltigsten Formen unseren Warmhäusern einen schönen Schmuck und darf in keiner Sammlung fehlen.

Flacourtia inermis *Roxb.* . . . . — 10
†Franciscea acuminata *Pohl* . . — 10
— calycina *Hk.* (confertiflora *Moore* Brunfelsia calyc. *Bth.*) — 20
— elegans . . . . 4 —
— eximia *Scheidw.* . . . . . 1 —
— gracilis . . . . — 15
— Hopeana *Hk.* (uniflora *Pohl.*) — 10
— hydrangeaeformis *Pohl.* . 1 15
— latifolia *Pohl.* 1 15

Diese Gattung verdient der besonderen Erwähnung, denn ihre Blüthen, die an einer Pflanze oft in 3 Farben prangen, erfüllen unsere Häuser mit dem lieblichsten Duft und sind deshalb der Liebling der Damenwelt. Hopeana ist aber der schönste Zimmerschmuck, sie gönnt sich oft nur wenig Wochen Ruhe, um auf's Neue Aug' und Geruchsnerven zu beglücken.

Galphimia splendens *h. Berol.* . — 5
† Gardenia florida *L.* . . . . . — 5-10
— latifolia *Ait.* . . . . — 10
— lucida *Roxb.* . . . . — 10
— radicans *Thbg* . . . . . . — 5
— — Veredelte Halbstämme 1/2-1 —
— Sherbourniae *Hook.* . r — 10-20
— Stanleyana *Hook.* . . . . — 15
— Thunbergii *L.* . . . . . — 10
— Whitfieldii *Lindl.* (malleifera *Hook.*) . . . . . . 1-2 —

Kaum bedürfen sie der Empfehlung. Selbst bahnten sie sich den Weg bis zum eisigen Nordpol und zieren mit ihren dicht gefüllten, unschuldfarbigen, süss duftenden Blumen zu jedem Feste die schöne Welt. Von G. radicans ziehe ich Halbstämme, die bedeckt mit Blumen ein wahrer Liebreiz sind.

Goethea cauliflora *Nees ab Esenb.* — 15
Gelonium denticulatum *h. Berol.* — 20
Glossarhen pauciflorus *Lindl.* (Schweiggeria *Spgl.* Gl. parviflorus *DC.*) . — 15
Gmeline arborea *Roxb.* . . . . — 10
Grewia Akora *Hort Tüb.* . . . 1 —
Guazuma ulmifolia *Lam.* (Bubroma) 1 —
Gyrocarpus americanus *Jacq.* (Columb.) . . . . — 10
Hamelia chrysantha *Sbr.* . . — 10
Hebeclinium ianthinum *Hook.* (Conoclinium *D. C.* . . . . . — 5-10

Bei leichter Cultur entwickelt sie sich ungemein rasch zu grossen Büschen, an deren Spitzen sie in grossen Dolden ihre Blüthen entfaltet.

Thl. ngr.

Heckera umbellata Kunth (Piper *L.*) — 10
Helicteris spicata *Coleb.* . . . . 1 —
— Isora *L.* . . . . 1 —
*Heritiera macrophylla *h. belg.* (— grandis *Fisch.*) . . . 3-6 —
*Hernandia sonora *L.* . . . . . 1 —
Hibiscus Cameroni *K.* et *W.* . . — 10
— — fulgens. . . . . — 10
— — Van Houtteanus *Ranniger.* . . . . — 15

Vom Vorstehenden und Fullerianus gezogen — daher ausgezeichnet von Colorit.

— immutabilis *Dehnh.* . . f — 10
— liliiflorus *Cav.* (puniceus *hort.*) . . . . — 10
— Manihot *L* . . . . — 5
— mutabilis *L.* . . . . . f — 5
— palmatus *Cav.* . . . . . — 10
— regius *V. Houtte.* . . . . — 10
— Rosa sinensis *L. fl.* rubro pl. — 10
— — — flavo pleno . — 10
— — — fol. variegatis *hort.* . . . . 2 —
— speciosus *Ait.* . . . . . k — 5-10
— Telefosii *hort.* . . . . . . — 10
— tortuosus *hort.* . . . . . — 15
— tricolor du Japon *h. Belg.* f — 10

Die grossen feurig leuchtenden und mannigfaltig variirenden Blumen machten diese Gattung seit alter Zeit zu den Lieblingen der Pflanzenfreunde.

Higginsia elegans *Planch.* . . . . — 10
Hillia longiflora *Sw.* (parasitica *L.*) — 15
Hoya bella *Hook.* . . . . . . — 10
— carnosa *R.Br.* (Asclepias *L.* Schollia crassifolia *Jacq.*) r — 5
— clandestina *hort.* . . . . . — 20
— coccinea *hort.* . . . . . r — 10
— imperialis *Lindl.* (Asc. Lussuella *Roxb.*) . . . . . r 1 —
— mollis . . . . r — 10
— pendula *W.* et *A.* . . . . r — 10
— picta *Sieb.* . . . . . . r — 20
— Pottsii *Lindl.* . . . . . r — 10
— rotundifolia *Sieb.* . . . r — 10
— Rumphii *Blum.* . . . . . — 15
— suaveolens *Hort.* . . . . r 1 —
— variegata *de Vriese* . . r 2 —

Als Zimmerpflanze ist der Gattung durch die alte carnosa der Weg gebahnt. Theils bunte Blätter, niedlichere oder gigantische Form der Blüthen empfehlen die neueren Species.

Impatiens Jerdoniae *Wight.* . . . — 15

		Rℳ.	ngr.
Impatiens latifolia *Wight*.		—	5

Gedeihen bei sehr mässiger Wärme, blühen dankbar und gereichen jeder Sammlung zur Zierde.

Inga ferruginea *Planch.* (superbiens *Ch. Lehm.*)		1	—
— pulcherrima *Cervant.*		—	10

Die feinsten Mimosa-Blättchen, mehr noch die hohe Grazie und Zartheit der Blumen lassen sie jeder Sammlung werth sein.

— Saman *W.* Columb.		—	10
0 Ipomaea bonariensis *Hook.*	r	—	10
0 — grandiflora *L.*	r	—	10
0 — Learii *Paxt.*	r	—	5
— palmata *Forsk.*	r	—	5
0 — Sellowii *Penny.*	r	—	5
0 — tyrianthina *Lindl.*	r	—	10

Jede leere Wand, auch noch so gross, sonnig oder schattig — Ipomaeen sind würdig, sie zu decken, und lohnen durch dichte Blätterfülle und reizende Blumen; ihre volle Pracht erlangen sie aber, wenn sie im Sommer ausgepflanzt werden, wozu sich besonders die mit 0 bezeichneten eignen.

Isolepis praelongata *N. E.*		—	5
— prolifera *R. Br.* (Ampelpfl.)		—	5
— pygmaea *Kunth* (Ampelpfl.)		—	5
Ixora Bandhuca *Roxb.* (coccinea *L.* arborea *Lodd.*)		—	20
— coccinea *hort.* (grandifl. *D. C.*)		—	10

Eine alte Lieblingspflanze, die wohl kaum weiterer Anpreisung bedarf.

— Griffithii *Hook.* (hydrangeaeformis *hort.*)		1	10
†Jacaranda mimosaefolia *D. Don.* (ovalifolia *R. Br.*)		1	—

Schon das feine graziös getragene Laub empfiehlt sie sehr.

Jacquinia mexicana *hort.*		—	10
Jasminum grandiflorum *L.*		—	10
— multiflorum *Roth.*		—	10
— Sambac *L.*	r	—	10
— — fl. plenissimo		—	15
— — grand Duc de Toscana		—	15
— — Maid of Orleans	r	—	15

Die drei letzten sind die schönsten dichtest gefüllten aller Jasminen, blühen schon als Stecklinge und duften gleich dem Sambac.

Jonesia Asoca *Roxb.*		3	—

Ist schon im Wuchs eine noble Pflanze, betrachtet man aber die grossen krapprothen Blumendolden; die von Unmassen gleichgefärbter Staubfäden überragt werden, so möchte man glauben, es könne kaum Schöneres existiren.

Lacepedea insignis *H. B.*		—	15
Lantana alba grandiflora		—	5
— crocea superba	f	—	5
Lantana delicatissima	f	—	5
— Docteur Sicard	f	—	5
— flava lilacina		—	5
— formosa	f	—	5
— gigantea	f	—	5
— kermesina		—	5
— L'abbé Touvre		—	5
— lilacina		—	5
— lutea kermesina		—	5
— oculata	f	—	5
— rosea elegans		—	5
— Sellowii *Lk.*	f	—	5
— Siengii	f	—	5
— Tillonii		—	5
— variegata *Otto* et *Dietr.*	f	—	5
— Wilhelm Schüle		—	5

Bilden im Sommer in grösseren Gruppen des freien Landes durch ihre grosse Farben-Nüancirung den schönsten Schmuck.

Lapageria rosea *Ruiz* et *Pav.*	r	4	—

Blühte diesen Sommer prachtvoll und übertrifft bei Weitem die darüber vorhandenen Abbildungen.

Lebretonia Helleri *hort.*		—	20
Lecythis grandiflora *Aubl.*		10	—

Affen-Cocos; deren Fürchte erlangen auch wirklich die Grösse der Cocos-Nüsse.

Lomatophyllum borbonicnm *W.*		1	—
Ludolphia glaucescens *W.* (Arundinaria *P. B.*)		—	15
Luffa pentandra *Roxb.* (Cattu-piciuna *Sering*=Retola *Sering*		—	15
Malpighia coccifera *L.*		—	10
— nitida *Mill.*		—	20
Manettia glabra *Schldl.*	r	—	5
— latifolia	r	—	5
— uniflora *H. B.*	r	—	5
Marica coerulea *Ker.*		-	15
— humilis *Herb.*		—	15
Mariscus aggregatus *Willd.*		1	—
— elatus *Wahl*		1	—

Wachsen ausgezeichnet im Wasser und sind mit ihren fahlfarbigen Blüthenbüscheln sehr imponirende Gräser.

Mikania odorata *Lehm.*	r	—	5
— speciosa *hort.*		—	15

Sind beide schon hinlänglich empfohlen.

†Mimosa grandiosa *hort.* Columb.		1	—

Aeusserst nobel im ganzen Bau, ganz fein behaart, mit grossen Fiederblättern und unten rosa angehaucht.

— pudica *L.*		—	5

Bekannt genug unter dem Namen: „Rühr mich nicht an."

Morenia odorata *Lindl.*	r	—	10
Mucuna urens *D. C.*	r	3	—

Eine der prächtigsten Schlingpflanzen, schnellwachsend und bunten Blättern.

Thlr. ngr.

Mundulea erubescens *hort.* (Derris) 3 —
Die herrlich rosafarbigen Blüthentrauben bilden sich am alten Holze.

Murraya exotica *L.* . . . . . . — 15
Mussaenda Afzelii *Schum.* . . . — 10
† — frondosa *L.* . . . . — 10
† — macrophylla *Wall.* . . . . — 10
Es kann wohl kaum etwas Ueberraschenderes geben als eine blühende Mussaenda, die sich selbst erst von den Blättern einen weissen Teppich breitet, um darüber ihre hochgelben Blumen zu präsentiren.

Napoleona imperialis *P. B.* (Whitfieldii *Hook.*) . . . . . 1 —
Wer das Glück hat, sie zur Blüthe zu bringen, wird staunen über Farbenpracht und Bildung der Blumen.

Neea spectabilis *D. Cand.* (Mitscherlichia spectabilis *Kth.*) — 20
— verticillata *R.* et *Pav.* . . — 20
*Nepenthes destillatoria *L.* . r 5 —
Bekannt unter dem Namen „Kannenträger" bildet er die Krone auserwählter Sammlungen; meine alte Pflanze trägt solche Kannen fast von Fusslänge.

— laevis *Lindl.* . . . . . 5 —
— Phyllamphora *Willd.* . . 5 —
Norantea guianensis *Aubl.* . . — 20
Ophioxylon album *H. Bogor.* - — 10
Oxalis rusciformis . . . . . . — 5
Ein originelles Pflänzchen.

Panicum plicatum *Lam.* . . — 5
Passiflora Actinia *Hook.* . r — 10
— amabilis *Ch. Lem.* . . r — 10
— amatissima . . . . f r — 5-15
— Beleotii *hort.* . . . . r — 10
— coerulea *L.* . . . f r — 10
— — Colvilli *Swt.* . . r — 10
— — racemosa *Sabine* . r — 10
— Comte de Nesselrode . . — 10
— „ „ Woronzoff . r — 10
— Comtesse de Kiseleff . r — 10
— edulis *Sab.* . . . . . . r — 10
— Hartwissiana *hort.* . . r — 10
— holosericea *L.* . . . r — 10
— laurifolia . . . . . . r — 10
— Loudoni *Atkins.* . . . r — 10
— marmorea *Linden* . . . r — 15
— Maximiliana . . . . r — 10
— Mayana *Loud.* . . . f r — 10
— Napoleonis . . . . . r — 15
— ochroleuca. . . . . . . r — 10
— princeps *Lodd.* (racemosa) r — 10
— quadrangularis *L.* . . . r — 15
— — Decaisneana *Gout.* r — 10
— racemosa rubra *L.* . . r — 20

Thlr. ngr.

Passiflora rubra *L.* . . . . . r — 10
— Schlachteri . . . . . . r — 10
— Skinneri . . . . . . r — 10
— sp. de Mexico . . . . r — 20
Die Passionsblumen, an denen man schon seit dem 17. Jahrhundert die Zeichen der Leiden Christi versinnlicht glaubt, kommen ungemein, wegen ihrer unbestritten originellen Blumen in Aufnahme, weshalb ich mich mühte, meinen geehrten Kunden eine reiche Auswahl vorzuführen!

Pavetta indica *L.* . . . . — 10
Peliosanthes Teta *Andr.* . . . . — 15
Pentas carnea *Benth.* (Sipanea *hort. Belg.* . . . . — 10
— carnea rosea *hort.* . . . . — 10
Beide können nicht genug empfohlen werden; im freien Lande schon bezaubern ihre grossen fein colorirten Dolden: die erste rosa angehaucht, die andere leuchtend rosa.

Peperomia asarifolia *Schiede* et *Deppe* . . . . — 10
— blanda *H. B.* . . . . — 10
— decussata . . . . — 10
— magnoliaefolia *Dietr.* (Piper *Jacq.*) . . . . — 10
— incana *Dietr.* . . . . — 10
— microphylla *H. B.* . . . . — 5
— reflexa *A. Dietr.* var. americana *Miq.* . . . . — 10
— spec.? . . . . — 10
Pereskia aculeata *Plum.* . . . . — 10
— grandifolia *Haw.* . . . . . — 10
— longispina *Haw.* . . . . — 10
— rosea *hort.* . . . . — 10
Da sie so leicht in der Cultur, so wenig Platz rauben und doch so köstlich rosa blühen, sind sie gewiss überall willkommen.

Pharus vittatus *Ch. Lem.* . . . . 1 —
Wohl selten trifft man so eigenthümliche Form, im Einklange mit dem merkwürdigen bunten Colorit, welches dieser Pharus trägt.

Phyllanthus angustifolius *P.* (Xylophylla *Sw.* ⅓-1
— latifolius *Swt.* (Genesiphylla asplenifolia *L'Her.*) . . . 2 —
— speciosus *Jacq.* (X. Arbuscula *W.* X. speciosa) . . 1 —
Sind äusserst interessant, da eine Masse kleiner Blüthchen die Ränder der dunkelgrünen Blätter bedecken.

Phyllartron Boyerianum *D. C.* (Artrophyllum madagascariense *Bojer.*) . . . . — 20
Pilea serpyllifolia *Lindl.* . . . . — 5
Ueberall vorlieb nehmend, fesselt sie trotz ihres bescheidenen Aussehens doch

Thl. ngr.

die Aufmerksamkeit Aller, die sich Mühe nehmen wollen, ihr einzelne Knospen abzukneipen oder die ganze Pflanze mit lauem Wasser zu besprengen; die ersteren werden in der hohlen Hand zerspringen und ein Kreuz formiren, und die letzteren werden Stunden lang explodiren, so dass kleine Staubwölkchen nach allen Richtungen auffliegen.

Pilea trianthemoides *Lindl.* . . . — 5
Eignet sich ausgezeichnet zu Einfassungen.

Piper discolorum *Swt.* . . . . . — 10
— nervosum . . . . — 5

Pluchea odorata *Cassini.* (Conyza *Sims.* Con. carolinensis *Jcq.*) 1 —

Plumbago coerulea *H. B. K* f — 5
— rosea *L.* . . . . f — 5
Besonders dankbar im freien Lande, P. rosea ist aber überaus zart, und blüht im Winter reizend.

Polymnia Uvedalia *L.* . . . f — 10
Blattpflanze für den freien Grund.

Portlandia grandiflora *L.* . . . . — 10

Pryonium Palmita *E. Mey.* (Acorus Palmita *Lchtst.* Juncus serratus *Thnb.*) . . . . . 1 —

Pterolobium lacerans *R. B.* (Caesalpinia *Rxb.* ligulata *Resc.* Reichardia decapetala *Wight.* Quartinia abyssinica *A. Rich.*) 4 —

Quisqualis indica *L.* . . . . r — 5-20
Mit ihrem schönen Laub vermag sie ganze Häuser zu umranken. Die sich wohl drei mal verfärbenden Blumen üben einen eigenthümlichen Reiz.

*Rhopala corcovadensis *De Jonghe* 3 —
Die ganze Pflanze ist besonders während des Triebes wie mit feinster goldgelber Wolle überzogen, die je nach der Reife desselben sich dunkler färbt.

Rhynchospermum jasminoides *hort.* (Trachelospermum) r — 10

Rhytiglossa cristata *Rgl.* (Porphyrocoma cristata *hort.*) . . — 10

Rivea nervosa *hort.* . . . . . . — 15

Rivina brasiliensis *Nocca* . . . — 5
Das ganze Jahr mit scharlachfarbenen Beeren bedeckt.

Rondoletia anomala *hort.* . . . — 10
— odoratissima *hort.* . . r — 10
— racemosa *L.* . . . . . . r — 10
— speciosa *Lodd.* . . . . r — 15
— — major *h. Belg.* . r — 10
Sind äusserst niedliche, dankbare, schöne und in der Blüthe lang dauernde Pflanzen.

Russelia juncea *Zuccar.* . . . f — 5-10
— multiflora *Sims.* . . . . f — 5-10
— sarmentosa *Jacq.* (verticillata *H. B. K.*) . . . . . f — 5-10
Bei richtiger Cultur, d. h. im Sommer im Freien in sonniger Lage, erfreuen sie mit zahlreichen dunkelrothen Blüthen, können aber auch als Ampelpflanzen gezogen werden.

Thl. ngr.

Sanseviera fulvo-cincta *Kaw.* . . — 15
— guineensis *W.* . . . . . . — 20

†Saurauja setosa *hort.* . . . . . — 20
† — spectabilis *Hook.* . . . . . — 20
† — villosa *h. Belg* . . . . . . — 20

Sarracenia adunca *Sw.* (variolaris *Mchx.*) . . . . 3 —
— Drummondii *Crom.* . . . 5 —
— flava *L.* . . . . 2 —
— rubra *Walt.* 4 15
Sie treffend zu beschreiben ist schwer. Ihre originellen Schläuche gleichen von oben antiken Urnen oder Humpen mit reicher Deckelverzierung; von der Seite gesehen aber Delphinen mit buntem Schlund. Jedem sind es Wunder der Schöpfung ! ! !

Schistocarpha bicolor *Lees* (Perymenium discolor *Schrad.*) f — 10
Ausgezeichnete Rasenblattpflanze.

Schizolepis Geitneriana *Schldl.* . 3-5 —
Ist ein durch Herrn Prof. v. Schlechtendal bestimmtes und von mir eingeführtes, im Juliheft der Hamburger Gartenzeitung beschriebenes Gras mit starkem aufrechtstehendem Schaft und $1\frac{1}{2}$ Zoll breiten, 1 Fuss langen gefältelten (noch auffälliger als bei Curculigo) weit überhängenden Blättern. Die grosse Pflanze hat an 30 Schafte über 2 Fuss hoch getrieben, an deren Spitzen die Blüthen und Samen in Menge erscheinen. — Die letzteren geben durch den fast schwarzen Glanz und da sie über die Hälfte frei auf dem Kelch aufsitzen, der Pflanze ein eigenthümliches Ansehen. Da die grosse Pflanze einen Durchmesser von 4 Fuss resp. einen Umfang von 12 Fuss hat, dabei aber auch im Freien gedeiht, so lässt sich annehmen, dass sie für unsere Freilandgruppen eine ausgezeichnete Acquisition ist und eine gute Zukunft hat.

Schubertia Kefersteinii *Schldl.* r — 15

Scutellaria scarletina *hort.* . . — 15
— splendens *Lk.* et *Otto* . . . — 5
— Trianeii *Pl.* et *L.* . . . . — 15
— villosa *hort.* . . . . — 10
Sie sind alle ausgezeichnete Acquisitionen; kräftigt man sie im Sommer im freien Lande, so blühen sie schon dort sehr dankbar; amoena mit ihren schön blauen Rispen ist unstreitig die dankbarste, denn selbst die kleinsten Stecklinge blühen.

Serjania Guarumima *Mart.* . . — 10
— paniculata *H. B. Kth.* . . — 10

Sicydium Lindheimerii *hort.* . . — 15

Siphocampylus canus *Pohl.* . . — 10
— longipes *Cat. Linden.* . . — 10

Rb. ngr.

Siphocampylus nitidus *hort.* (manettiaeflorus *Hook.*) . . — 5
— Warszewiczii *Rgl.* . . . — 10
Blühen meist dankbar und zierlich.

Solandra grandiflora *Swartz.* . . — 15
— guttata *D. Don.* . . . . . — 15
Colossale, langeröhrte, oben gefranzte, in der Hauptfarbe weisse Blumen sind eine köstliche Zierde dieser riesigen Pflanzen.

†Solanum atropurpureum *Schrk.* — 20
† — betaceum *Cav.* . . . . f — 10
— capsicastrum *Lk.* . . . . . — 10
† — glutinosum *Dun.* . . . f — 10
† — hyporrhodium *Al. Br.* . f — 15
† — palmetosum *hort.* . . . . — 15
† — quitense *H. B. K.* . . f — 10
— sodomaeum *L.* (Hermanni *Lam.*) . . . . — 10
— torvum *Sw.* (stramoniifolium *Lam.* ficifolium *Orteg.*) . . — 15
Zeichnen sich besonders durch reiche und abwechselnde Blattform aus, die am hervorstechendsten wird, wenn man sie im Sommer auspflanzt.

*Spathodea campanulata *P. B.* . 2 —

Stephanotis floribunda *Brogn.* r — 15
Eine reich und willig blühende Schlingpflanze mit glänzenden dunkelgrünem Laube.

Sterculia argentea *hort.* . . . . . 2 —

Stifftia chrysantha *Mik.* (insignis *Fisch.*) . . . . ½-1 —
Kräftig im Wuchse gleicht sie während der Blüthe, im Kleinen einer sich entladenden Bombe, aus deren dichten Feuerstrahlen die dicht gedrängten, langen hochrothen Blumen hervorbrechen.

Strophanthus dichotomus *D. C.* . — 10

Tabernaemontana coronaria *W.* fl. pl. . . . . — 10
Hat viel Aehnlichkeit mit Gardenien, nur ist sie viel zärtlicher.

Tacsonia Helleri *hort.* . . . r — 10
— splendens *Makay* . . . r — 10

Testudinaria elephantipes *Burch.* (Tamus *L'Her.*) . . r k 5-15 —
Die originell geformten Knollen haben manchen Unkundigen glauben gemacht, sie seien künstlich geschnitzt.

Tetrameles Horsfieldii *Steud.* . . — 20

Tetranema mexicanum *Benth.* (Penstemon mexican. *hort.*) — 5
Ist unermüdlich im Blühen.

Theophrasta longifolia *L. Jacq.* (Clavija ornata *Don.*) . . 1-2 —

Torenia asiatica *L.* . . . . . . — 5
Ob als Ampel-, Schling- oder Hochstammpflanze gezogen überall entfaltet sie ihren Reiz, am üppigsten aber, wenn sie mit dem Topfe im Wasser steht.

Tradescantia delicatula *hort.* (Calisia monandra *Kth.* v. delicatula) . . . . r — 5
† — discolor *Sm.* . . . . . . — 5-15
— — lineata *Miq.* (Tr. discolor *Sm.* var. vittata *Miq.* foliis variegatis *hort. v. Htte.* 1-3 —
Eine ausgezeichnete Neuheit, die viel robuster als unser alter Liebling, die discolor, und sich ausserdem durch die regelmässigen weissen Längenlinien auf der Oberfläche der Blätter auszeichnet, während die Rückseite das dunkelste violett ziert.
— picta *hort.* (Dichorisandra) r — 5
— fuscata *Lodd.* . . . . r — 5-10
— quienensis *hort.* . . . r — 10
— velutina *Kth.* et *Bouché* r — 10
† — Warszewiczii *Kth.* et *Bché.* — 20
— zebrina *Lindl.* (Zebrina pendula *Schnizl.*) . . . . r — 5
Der meist niedrige oder hängende Wuchs lässt sie als Einfassung der Beete, aber auch als Ampelpflanze sehr empfehlen.

*Uhdea bipinnatifida *Kth.* (Polymnia grandis *h. Berol.*) . f — 10
Für Freilandgruppen der schönste Schmuck.

Unsinia jamaicensis *Pers.* . . . ½-1 —
Ein sehr zierliches südamerikanisches Gras.

Uraria picta *Desv.* (Hedysarum pictum *Jacq.*) . . . . . . 1 —
Eine ausgezeichnete bunte Blattpflanze, deren schmale lange Blätter der ganzen Länge nach, fast weiss, marmorirt sind.

Urtica baccifera *L.* . . . . . . — 10
— biloba *hort.* . . . . — 5

Urticaceae species *hort.* . . . 1 —
Bringt sehr grosse schöne Blätter.

Urvillea ferruginea *hort.* (Serjania cuspidata *hort.*) . . r — 10

Uvaria spec. e Java *hort. Amst.* . — —

Verbesina sinuata *Ell.* . . . . . — 10

Vinca rosea *L.* . . . . — 5
— — alba . . . . — 5

Whitfieldia lateritia *Hook.* . . . . — 10

Xanthoeronium Herbertii . . z — 20

Yucca gloriosa *L.* . . . . ⅓-4 —
— longifolia *Karw.* . . . . . — —

Warmhaus-Sortimentspflanzen.

Acanthaceae.

Diese Familie umfasst viele der beliebtesten Pflanzen für das warme und temperirte Haus. Bei der leichtesten Cultur erfreuen sie durch dankbares und schönes Blühen, einige Arten derselben zeichnen sich noch ausserdem durch prachtvolles Blattcolorit aus.

Rg. ngr.

Acanthus mollis *L.* . . . . . f — 10

Athatoda aenea *hort.* (Gendarussa) . . . . — 10

— cydoniaefolia *Nees.* . . . 1 —

Die erstere ist eine der kleinen bunten Blattpflanzen. Die zweite, nach der Abbildung zu urtheilen, eine reich und prächtig blühende Pflanze.

Aphelandra cristata *R. Br.* (Justicia *hort. Schönbr.* . . . — 10

— grandis *Klotzsch.* . . . . . — 10

— micans *hort.* . . . . . . — 10

— Porteana *Morel* . . . . — 10

— squarrosa *Nees.* var. Leopoldii *Car. Segr.* . . . . . — 15

Vorzüglich ist es die A. Leopoldii, welche — da ihre Blätter dunkelgrün mit fast reinweissen regelmässigen Streifen geziert sind — sehr viel Effect macht.

Brillantesia ovariensis *Beauv.* . — 10

Coleostylis aurantiaca *hort.* . . . — 5

Cyrthanthera magnifica *Nees.* (Justicia carnea superba *hort.*) — 5

Dipteracanthus spectabilis *Hook.* — 10

Blüht dankbar und schön.

Eranthemum bicolor *Schrank.* (Justicia bicolor *Sims.*) . . . — 5

— coccineum *Lem.* (Salpinganthe coccinea *Hook.*) . . . — 5

— leuconeuron *hort.* . . . . . — 5-10

Die weiss geaderten Blätter geben dem Pflänzchen ein sehr nobles Ansehen.

— pulchellum *Andr.* (Ruellia varians *Vent.* E. nervosum *R. Br.*) . . . . — 5

Im Sommer im Freien gehalten, blüht sie sehr dankbar im Winter.

— strictum *Colebr.* . . . . . — 5

— variabile *R. Br.* . . . . . — 5

Geissomeria longifolia *Lindl.* . . — 5

Graptophyllum hortense *Nees.* (Justicia picta *L.*) . . . . . — 15

Eine äusserst noble Pflanze; deren dunkelgrüne Blätter mit grossen gelben Flecken geschmückt sind, oft ist auch der Stengel von goldgelber Farbe.

Harrachia speciosa *Jacq.* (Crossandra infundibuliformis *Nees.* Cr. undulaefolia *Salisb.* . — 5

Henfreya scandens *hort.* . . . — 10

Hexacentris coccinea *Nees.* (Thunbergia *Hook.*) . . . . . r — 10

— Mysorensis *Wight.* . . r 1/3-1 —

— lutea *hort.* . . . . . . r 1/3-1 —

Sind leicht und schnellwachsende Kletterpflanzen, die eben so schön als reichlich blühen.

Justicia amoena *hort.* . . . . — 5

— carnea *Lindl.* (Cyrthanthera Pohleana *Nees.*) . . . . . — 5

— glabrata *hort.* . . . . . . — 5

— violacea *Vahl.* (Dianthera *Vahl.*) . . . . — 5

— zebrina *hort. Amst.* . . . . 1 —

Letztere ist sehr selten. Die reizende Blattfärbung macht sie der grössten Verbreitung würdig.

Meyenia erecta *Benth.* . . . . . — 10

Ruellia formosa *Andr.* . . . . . — 5

Blüht im Sommer köstlich im freien Lande.

— glomerata *Wall.* . . . . . — 5

— maculata *hort.* . . . . — 5

— salicifolia *Vahl.* . . . . . — 5

Schaueria calycotricha *Nees.* (Justicia flavicoma *Lindl.* J. calycotricha *Lk.* et *Otto.*) . — 5

Strobilanthes discolor *hort.* . . . — 5

— lactata *Hook.* . . . . . . — 5

Mit weissbuntem Blatte!

— Sabiniana *Nees.* . . . . . — 5

Thunbergia Chrysops *Hook.* . . — 5

— grandiflora *Roxb.* . . . . . — 10

— ? havanensis *hort.* . . . — 10

Thyrsacanthus barlerioides *Nees.* — 10

— Schomburgkianus *Nees.* (rutilans *Pl.* et *Lind.*) . . — 10

Amaryllideen und Liliaceen.

Sind unstreitig mit die lohnendsten Geschlechter des Pflanzenreichs; die leichteste Cultur, prachtvolles Blühen, oft vereinigt mit herrlichem Blattschmuck haben sie in Glashäuser und Salons bis in die bescheidene Wohnung des Landmanns, in

die grössten Parks bis in das einfachste Hausgärtchen des Bürgers eingeführt. Von vielen Arten habe ich reichlichen Vorrath importirter Zwiebeln, welche in jeder Qualität abgegeben werden können. Die mit k bezeichneten sind fürs Kalthaus. Vorzüglich mache ich Handelsgärtner auf die unter den Engrospreisen befindlichen Notirungen aufmerksam.

	Rg.	ngr.
Alstroemeria psittacina *Lehm.* (brasiliensis *Sello*)	—	10
Amaryllis Belladona *Linn.*	—	6
— leonensis *Ch. Lem.*	—	10
— parviflora *hort.*	1	—
Ammocharis longifolia *Roem.* (A. *Linn.* Crinum *Thbg.*)	—	20
Calyphruria Hartwegiana *Herb.*	1	—
Clivia nobilis *Lindl.* (Immalophyllum Aitoni *Hook.*)	—	15
Crinum amabile *Donn.* (Cr. superbum *Roxb.*)	2	—
— americanum *Linn.* (Commelynii *Red.* Bulbine uncinata *Moench.*)	½-2	—
— asiaticum *Linn.* (toxicarium *Roxb.* floridum *Fraser.* americanum *Red.* Bulbine asiatica *Gaertn.* Lilium zeylanicum *Herm.*	1	—
— Broussonetianum *Hrb.* (yuccaeflorum *Salisb.* Amaryllis ornata *Ait.* A. yuccaeoides *Tomps.* A. spectabilis *Andr.*)	4	—
— caucasicum *auct.?*	½-1	—
— Commelynii *Jacq.* (angustifolium *hort.* Commelinianum *Herb.*)	½-1	—
— defixum *Gawl.* (asiaticum *h.* Amaryllis vivipara *Lam.*	1	—
— erubescens *Ait.* (revolutum *Lindl.* Lindleyanum *Schult.* Kunthianum *Roem.* americanum *Rodschied.*	⅓-1	—
— giganteum *Andr.* (petiolatum *Herb.* Amaryllis gigantea *Ait.* ornata *β. Gawl.* A. Jagus *Tomps.* A. candida *Trost.* A. latifolia *Lam.*	½-2	—
— humile *Herb.*	1	—
— Knyffii *hort.*	6	—
— scabrum *Sims.* (scaberrimum *Herb.* undulaefolium *Herb.*	—	20
— variabile *Herb.* (crassifolium *Herb.* variab. *β.* roseum *H.* Amaryllis variabilis *Jacq.* A. revoluta *β.* robustior *Bot. Reg.*)	8	—

Wenn je eine Pflanzenart Anspruch auf Lob wegen dankbaren schönen Blühens bei herrlichem graciösen Blattschmuck machen darf, so stehen diese Crinum mit in erster Reihe. Bei der geringen Pflege — mässiger Wärme, reichlichem Begiessen während der Vegetationsperiode nach vorhergegangener Ruhezeit — erfreuen sie uns oft zwei- und dreimal mit ihren schönen weissen und rothen lilienartigen Blüthen, den köstlichsten Mandelduft verbreitend.

	Rg.	ngr.
Eucharis candida *Pl.* et *Lind.*	½-2	—
— grandiflora *Pl.* et *Lind.*	½-2	—

Zwei neue Einführungen, blühen im Winter köstlich weiss, wozu es keineswegs starker Zwiebeln bedarf.

	Rg.	ngr.
Eucomis punctata *Ait.*	—	20
Griffinia hyacinthina *Herb.* (Amaryllis *Gawl.*)	—	—
Haemanthus virescens *Herb.* *β.* albiflos. (albiflos. *Jacq.*)	—	10
— coccineus *L.*	2	—
— hyalocarpus *Jacq.*	—	20

Sind unter den Amaryllideen merkwürdige Erscheinungen, theils der walzenförmigen Blattbildung als auch der gedrungenen schönen Blüthenbüschel wegen.

	Rg.	ngr.
Hippeastrum aulicum *Herb.* var. platypetalum *Roem.*	—	15
— bulbosum *Herb.* var. acuminatum (Amaryllis *Gawl.*)	—	10
— — var. pulverulenta (Amaryllis *Lodd.*)	—	10
— — var. rutilum (Amaryllis *Gawl.* H. latifolium *Roem.* Callion rutila *Lk.*)	—	10
— reticulatum *Herb.* (Amaryllis *L'Herit.* Coburgia *Herb.* Leopoldia *Herb.* Calliore *Link.*)	—	15
— reticulatum var. striatifolium (Amaryllis *Gawl.* A. Carolinae *Sterler.* Coburgia striatifolia *Herb.* Hippeastr. striatifol. *Herb.* Leopoldia striat. *Herb.* Amaryllis princeps *Salm. Dyck.* Leopoldia principis *Roem.*)	½-1	—
— robustum *A. Dietr.* (Amaryllis Tettaui *hort. Topf.* A. Blumenauana *hort.*) extra starke	1-3	—
— solandriflorum *Herb.* (Amaryllis *Lindl.*)	⅓-1	—

Diese Gattung noch loben, heisst Was-

Rß. ngr.

ser ins Meer giessen, und beschränke ich mich hier nur auf Empfehlung letzterer, von der ich vor Jahren aus Südamerika eine ziemlich bedeutende Zahl prächtiger Zwiebeln importirte, die nun gut acclimatisirt sind. Ich überlasse dieselben zu oben bestimmtem Preise; die stärksten Zwiebeln treiben oft zwei bis drei Blumenschäfte mit 2—4 Blumen.

Hymenocallis amoena *Herb.* β ovata *Roem.* (Pancr. amboinense β. *Linn.* P. fragrans *Lodd.* P. amoenum *Andr.* P. ovatum *Mill.*) . . . . 2-4 —

— caribaea *Herb.* β. declinata (H. formosa *Roem.* fragrans *Salisb.* Pancratium declinatum *Jacq.* P. speciosum *Red.*) 1 —

— expansa *Herb.* (Pancratium *Sims.*) . . . . 2-5 —

Herr Professor Dr. Karl Koch war so freundlich, diese Hymenocallis in No. 23 Seite 181 seiner sehr gediegenen Allgemeinen Gartenzeitung zu beschreiben und sagt gleich im Anfange des betreffenden Artikels: „Dass die Pflanze sowohl durch ihre zahlreichen, blendend weissen Blüthen als auch durch den vorzüglichen Wohlgeruch den sie namentlich des Abends verbreitet, unsere volle Aufmerksamkeit verdient," und der Herr Verf. hat darin vollkommen Recht. Da sie im genannten Artikel so trefflich beschrieben, enthalte ich mir hier einer weiteren Beschreibung und empfehle sie nur aus vollster Ueberzeugung, dass sie der Liebling eines jeden Blumenfreundes werden wird. Ich habe eine hinreichende Zahl der schönsten Zwiebeln erhalten, um jedem Wunsche genügen zu können.

— odoratissima *auct.* ? . . . 1/2-2 —

Eine schöne Art mit glänzend dunkelgrünem Laube.

— rotata *Herb.* var. disciformis (paludosa *Salisb.* disciformis *Roem.* mexicana *Herb.* Dillenii *Roem.* Pancr. mexicanum *L.* P. rotatum β. biflorum *Gawl.*) . . . — 5

Die Blüthen sämmtlicher H. sind sehr interessant und originell. Ein aufrechter Schaft trägt 10—20 Blüthen, welche sich nach und nach öffnen und eine Dolde von lilienartigen aufrechtstehenden grossen schneeweissen Blüthen bilden, den herrlichsten Vanillegeruch spendend. Das Originellste dabei ist der zart weisse durchsichtige Kranz, welcher in der Blumenkrone die Basis der Staubfäden verbindet. Kultur wie bei Crinum.

Rß. ngr.

k Lilium eximium *Curt.* . . f — 20

k — lancifolium album *Thbg.* f 1/3-2 —

k — — var. punctatum *hort.* f 1/2-2 —

k — — roseum punctatum *Geitn.* . . . . . f 1/3-2 —

k — — rubrum *hort.* . . f 1/3-2 —

k — — speciosissimum *Geitn.* f 1-3 —

Den Lilien, den ältesten Bewohnern unserer Gärten, das Wort reden, ist überflüssig; was wir aber durch diese neueren Erscheinungen gewonnen, ist ausserordentlich. Denn nicht nur, dass sie unter leichter Bedeckung ebenfalls unsere Winter aushalten, sondern ihr Vanillengeruch und das prachtvolle dunkelrothe Colorit in den mannigfachsten Schattirungen bis zum weissen Rand, sind Vorzüge, die der Erwähnung und der Hindeutung werth, dass der Garten, dem diese Lilien fehlen, — dem edelsten Schmucke entsagt!

Methonica Leopoldii *Ch. Lem.* (Gloriosa *hort.*) . . . r 2/3-1 —

Ihre köstlichen grossen gelben Blumen verfärben sich bis ins roth und machen einen herrlichen Effect. Einem Kronleuchter gleich schweben sie in der Luft.

— virescens *Lindl.* var. Plantii

Diese ist kleinblumiger aber der Farbenschmelz ist um so köstlicher, als jedes Blumenblatt auf gelbem Grunde, rothe Flammen zieren.

— superba *Lam.* (Gloriosa *L.*) — 20

k Nerine curvifolia *Herb.* (Amaryllis *Jacq.* A. Fothergilli *H.* Ner. Fotherg. *Roem.*) . . 1 —

Pancratium maritimum *Linn.* . . 1 10

k Sprekelia formosissima *Herb.* (Sp. Heisterii *Trew.* Amaryllis *L.*) . . . . — 5

Vallota purpurea *Herb.* (Amaryllis purpurea *Ait.* (A. speciosa *L'Herit.* Crinum speciosum *Linn.* Cyrthanthus purpureus *Herb.*) . . . . 2 —

k Zephyranthes candida *Herb.* (Amaryllis cand. *Lindl.* A. nivea *Schult.* Z. nivea *Dietr.* Argyropsis *Roem.*) . . . . — 10

k — lilacina *Liebm.* . . . . . — 10

k — rosea *Lindl.* (Amaryllis rosea *Spr.* A. carnea *Schult.*) . — 10

Araliaceen.

Sie bilden mit den grössten Schmuck unserer Pflanzensammlungen; erfreuen sie auch nicht durch prächtige Blüthen, so ist es die grazile, oft gigantische Tracht ihres so mannigfach geformten Laubes, welches ihnen so viele Liebhaber gewonnen

hat. Sie lassen sich sämmtlich leicht cultiviren, einige Arten halten bei uns im Freien (f) aus, die mit vorgesetztem k gehören ins kalte, die übrigen ins warme Haus.

		Thl.	ngr.
Aralia nudicaulis *L.*	f	—	10
— papyrifera *Hook.* (siehe off. und techn. Pfl.)		5	—
— quinduensis *H. B. K.* (Carolina alba *hort.*)		1	—
— racemosa *L.*	f	—	10
— Schefflerii *Spgl.* (Scheffleria digitata *Forst.*)		2	—
— spinosa *L.* (japonica *hort.*)		—	15

Letztere ist eine wirklich schöne Pflanze für Rasenparthieen. Sie hält unsere Winter unter Bedeckung vollkommen aus und erfreut im Sommer durch ihre graciösen farrnwedelähnlichen doppelt gefiederten Blätter.

		Thl.	ngr.
Brassayopsis speciosa *Decn.* et *Pl.* (Hedera glomerulata *Hook.* Gastonia Candollei *hort.* G. dentata *hort.* Trevesia spec. *hort. Amst.*)		2	—

Prachtvolle Blattpflanze mit gefingerten Blättern und schönem Habitus.

		Thl.	ngr.
Dendropanax arboreum *Decn.* et *Pl.* (Aralia arborea *L.* Hedera *Sw.*)		1	15

Mit grossen ganzrandigen Blättern.

		Thl.	ngr.
Didymopanax marginatum *Decn.* et *Pl.* (Aralia praemorsa *h.*)		2	—

Mit kleinem, aber interressanten Laube.

		Thl.	ngr.
Fatsia japonica *Decn.* et *Pl.* (Aralia japonica *Thbg.*)	f	1	—
kHedera algeriensis latifolia *h.*	f r	—	15
k — Helix *L.*	f r	—	5-15
k — — β. variegata *hort.*	f r	—	5-10
k — — γ. Roegneriana *h.*	r	—	5-15

Bekannt als Epheu verdient vorzüglich algeriensis und Roegneriana die wärmste Empfehlung, denn sie bringen ungemein grosse Blätter.

	Thl.	ngr.
Oreopanax capitatum *Decn.* et *Pl.* (Aralia capitata *Jacq.* Hedera *Sw.*)	1	—
— catalpaefolium *Decn.* et *Pl.* (Aralia guatemalensis *hort.* Hedera *hort. Lind.*)	3	—

Eine schöne grossblättrige Pflanze mit dunklem glänzenden Laube.

	Thl.	ngr.
kPanax crassifolium *Decn.* et *Pl.* (Aralia *Forst.* A. heterophylla *Soland.*)	2	—
— fruticosa *L.* (Nothopanax *Miq.*)	1	—

Erstere eine schöne Kalthauspflanze, letztere gehört mit ihrem schönen feingefiederten prächtigen Laube ins Warmhaus.

	Thl.	ngr.
Paratropia elliptica *Miq.* (Artrophyllum *Bl.* Sciodaphyllum *Bl.*)	10	—
— longifolia *Decn.* et *Pl.* (Sciodaphyllum)	6	—
— pulchra *Decn.* et *Pl.* (Sciodaphyllum *W.* Aralia *hort.* Bombax insignis *hort.*)	4	—

Ausgezeichnete Pflanzen mit grossen langgestielten gefingerten Blättern; sehr decorativ.

	Thl.	ngr.
Trevesia palmata *Decn.* et *Pl.* (sundaica *Miq.* Gastonia palmata *Roxb.* Aralia *Reinw.*	1-2	—

Dieser letzten gebührt die grösste Aufmerksamkeit, denn ein schöner Habitus, grosse, saftig grüne handförmige Blätter, schnelles Wachsthum, hat sie zu einer der ersten Decorationspflanzen erhoben. Sie dürfte in keiner Sammlung fehlen, ihre Culturansprüche sind die bescheidendsten. Bei einem guten kräftigen Erdreich, feucht warmem Standort lohnt sie jede kleine Mühe durch ihr imposantes Aussehen.

Aroideen.

Sämmtliche Aroideen blühen weniger schön als originell. Als Decorationspflanzen sind sie längst schon für die unentbehrlichsten erklärt, weshalb ich sie mit aller Sorgfalt sammelte, und um sie den Liebhabern zugänglicher zu machen, **bedeutend in den Preisen ermässigte.** Keine Familie bildet in Formen, — die meist von architektonischem Werth — diese Abwechslung. Ein grosser Theil hat Knollen und zieht im Winter ein, die übrigen haben ausser nobler Form das schönste dunkle Grün, und bieten, gleich den ersteren, keine Schwierigkeit in der Cultur.

		Thl.	ngr.
Acontias helleborifolius *Schott.* (Arum *Jacq.* Caladium *Vent.*)	k	—	10
Aglaonema marantaefolium *Bl.* (Caladium *Zipp.*)		2	—
— oblongifolia *Schott.* (A. simplex *Bl.* integrifolium *Schott.* Arum integrifolium *Lk.* Caladium simplex *Bl.*)		—	10
Alocasia alba *Schott* (Colocasia alba *hort.*)		—	10
— cucullata *Schott.* (Calad. *Prs.*			

Thl. ngr.

Colocasia *Schott.* Arum *Lour.* A. ramosum *hort.*) . . . — 10

Alocasia macrorrhiza *Schott.* (Colocasia mucronata *Knth.* Arum *L.* Caladium *R. Br.* C. indica *C. Koch* et *Bché.* . . — 10

— metallica *Schott.* (Calad. cupreum *Koch* et *Bouché.* C. metallicum *V. Htt.*) . . . 2 —

— odora *C. Koch* (Arum odoratissim. *hort.* Calad. odoratissim. *hort.* Calad. *Bot. Reg.* Colocasia *Brogn.*) . . . . — 20

— rugosa *Schott.* (Colocasia cochleata *Miq.* Calad. *Desf.* Calad. Haworthii *hort.*) . — 15

Amorphophallus bulbifer *Bl.* (Phytonium *Schott.* Arum *Rxb.* Conophallus *Schott.*) . . k $1/3$-10 —

— campanulatus *Bl.* (Arum *Roxb.* A. Rumphii *Gaudich.* Tacca phallifera *Rumph.* Candarum Rumphii, Roxburghii et Hookeri *Schott.*) 3 —

— serpentinus *Karlt.* (Sauromatum punctatum *hort.*) k 2 —

Die kurze Winterruhe scheint erforderlich, um Kraft für den mächtig aufschiessenden Schaft zu sammeln, über dessen Spitze sich ein in unzählige Blätter getheilter Schirm wölbt. Alle 3 Species zeichnen sich noch ausserdem durch ihre schön colorirten Schafte aus; serpentinus erscheint aber, durch seinen höckrigen, in allen Farben bemalten Schaft, als Stieglitz unter den Pflanzen, von dem man ebenfalls sagen könnte — es habe der Schöpfer an ihm den Pinsel ausgewischt.

Anthurium albocostatum *Miq.* . 2 —

— amplum *Kth.* (Pothos macrophyllus *hort. Berol.*) . 1 —

— Beyrichianum *Kth.* (A. scolopendrioides *hort.* longifolium *hort.*) . . . . — 20

— cartilagineum *Kth.* (Poth., cartil. *Dsf.*) . . . . — 20

— caudatum *Kth.* (Poth. *hort.*) r — 10

— cordifolium *Kth.* (Pothos cordata *Willd.* (P. macrophyllus *Willd.*) . . . . r — 10

— crassinervium *Schott* (Pothos *Jacq.* P. maximus *Desf.*) 1 —

— digitatum *Schtt.* (Poth *Jcq.*) r $1/2$-5 —

— erythropodum *Miq.* . . . . — 10-20

— fissum *C. Koch.* . . . . 5-10 —

Diese von mir aus Venezuela importirte Art steht hinsichtlich ihrer Form einzig da; schön glänzend grüne 3—5fach und mehr getheilte oder mehr handförmige Blätter werden auf fusslangen Stielen, welche wagrecht vom Strunk abstehen, getragen. Es ist unstreitig eine der schönsten Decorationspflanzen ihres Geschlechtes, ja unter der ganzen Familie der Aroideen. Ich erlasse: 1 sehr starkes Exemplar 1' hoch 10 Thl. 1 desgleichen schwächeres $1/2$' hoch 5 Thl..

Thl. ngr.

Anthurium Galeottii *C. Koch* . . — 20

— Hookeri *Kth.* (Pothos acaulis *h. Berol.* A. neglectum *h. Amst.* A. Hügelii *Schott.* P. crassinervius *Hook.* P. solitarius *Flor. Flum.*) . . . — 20

— Humboldtianum *h. Belg.* (A. cardiophyllum *Koch* et *Aug.*) r 1 —

— intermedium *Kth.* . . . . 1 —

— lucidum *Kth.* (Poth. *h. Berl.*) — 10

— membranuliferum *Schott.* . 3 —

— microphyllum *Endl.* (Pothos *hort.*) . . . . — 15

— ochranthum *Koch* . . . . 2-4 —

— Olfersianum *Kth.* (Pothos lucidus *hort. Ber.*) . . . — 20

— Ottonianum *Kth.* . . . r — 10

— Podophyllum *Kth.* (Pothos *Schl. Cham.* P. membranuliferus *van Sp.*) . . . . $2/3$-1 —

— radicans *Koch* . . . . r 1 15

— sagittatum *Kth.* (A. rubrinervium *Knth.* Pothos rubrinerv. *Lk.* P. *Sims.* P. suaveolens *Desf.*) . . . . — 10

— spec. Imperfor. . . . . 5 —

— spec. e Mexico . . . r 1 —

— — — Mirador No. I. . r — 20

— — — — No. II. r — 20

— — — Venezuela . . r 1 —

— trinervium *Kth.* . . . . . — 20

— undulatum *C. Koch* et *Bouché* (A. Harrisii *hort.*) . . . 2 —

— variabile *Knth.* (helleborifolium *Hort Erf.* jatrophaefolium *Hort Belg.* Pothos enneaphyllus et heptaphyllus *Flor. Flum.* . . . . . . — 10-20

— varians *Miq.* . . . . . . 1 —

— violaceum *Schott.* var. latifolia. (Poth. violaceus *Swt.* Poth. microstachyus *Willd.* Dracontium scandens *Aubl.* Dr. repens. *Descourt*) . r — 10

— Wildenowii *Kth.* (Pothos lanceolatus *Willd.*) . . $1/2$-1 —

	Thl.	ngr.
Arisaema atrorubens *Bl* (Arum *Ait.*, Arum triphyllum *L.* k	—	5
Arum italicum *Mill.* . . . . . k	—	7
— Sieboldii praecox *Sieb.* . .	1	—
— orientale *M. B.* . . . k	—	7
— pictum *L.* (Caladium *h. Berl.*) k	1/2-1	—
— sp. de Caracas	1	—
Caladium arboreum *H. B. Kth* .	1	10
* — bicolor *Vent.* (Arum *Ait.*) k	—	10-20
* — concolor *C. Koch.* . . .	2	—
* — discolor *hort.*	—	10
* — haematostigmum *Kth.* . .	—	15
— marginatum *C. Koch* und *Bouché*	1	—
* — marmoratum *L'Math.* k	—	10-20
* — picturatum *h. Belg.* . k	—	10
* — poecile *Schott.* . . . . . k	—	10-20
— smaragdinum *Koch* et *Bché*	1	—
— spec. Sellow	—	—
— surinamense *Miq.*	—	20
— violaceum *Desf.* . . . k	—	5-15

Die mit Sternchen bezeichneten, deren Blätter oft durchscheinend mit den feurigsten Farben überzogen, sind unstreitig das Köstlichste, was die Natur in bunten Blättern schuf. Hierher gehört noch Diffenbachia Seguina picta.

	Thl.	ngr.
Calla palustris *Linn.*	—	10
Colocasia antiquorum *Schott.* (Arum Colocasia *L.*) . . . . . k	—	5-15
— esculenta *Schott.* (Caladium *Vent.* Arum *L.* A. vermitoxicum *Flor. Flum.* A. peltatum *β. Lam.*)	—	5-15
— nymphaeaefolia *Knth.* (C. esculenta *Lour.* Calad. *Vent.* Arum *Roxb.*)	—	15
— ramosa *Schott* (Arum *Roxb.*)	—	10
Dieffenbachia costata *Karst.* . .	1	—
— integrifolia? *hort.*	1	—
— lineata *Koch* et *Bouché* . .	1	—
— robusta *Koch* et *Bouché* (Aglaonema *hort. Petrop.*) .	—	20
— Seguina *Schott* (Arum L. Caladium *Vent.*)	—	5-20
— — *β.* picta	1/2-5	—
— variegata *hort.* (D. liturata *Schott.*)	1	—
Dracunculus vulgaris *Schott* (Arum Dracunculus *L.* Dr. polyphyllus *Bl.*) . . . . . k	—	10
Gonatanthus sarmentosus *Kl.* (Caladium *h. Berol.* Calad. pumilum *Don.* Colocasia pumila *Knth.*) . . . . . . k	—	10
Heteropsis ovata *Miq.* (Monstera dilacerata *C. Koch.*) . . .	—	10
— surinamensis *Miq.*	—	10
Homalomena rubrum *Hssk.* (rubescens *Knth.* rubens *C. Koch*)	1	—
Lasia heterophylla *Schott.* (Dracontium spinosum *Linn.* Pothos *Rxb.*)	—	10
Massowia cannaefolia *C. Koch* (Pothos odorota *Anders.* P. *Dryandr.* Spatyphyllum *Schott.* Sp. candicans *Poepp.* Monstera *Knth.*)	1/2-4	—
Monstera acuminata *C. Koch* (M. dimidiata *hort.* Philod. inaequale *hort.*)	—	10
— Adansonia *Schott.*	—	10
— deliciosa *Liebm.* (M. Lennea *C. Koch*, Philodendron pertusum *Kth.* et *Bché.*) . .	1-5	—
Orontium aquaticum *Linn.*	—	15
— japonicum *Wb.*	1/2-1	—
— — fol. marg.	1/2-1	—
Otophyllum semicrenatum *hort. Aug.*	—	15
Philodendron albo-vaginatum *C. Koch* et *Sello* . . . . . r	1	—
— asperatum *hort.*	—	20
— crassinervium *Lindl.* (Bauersia nervosa *Hffg.* recurvatum *hort. Amst.* plantagineum *hort. Amst.* Caladium Bauersii *Rchb.* Bauersia maculata *Rchb.* B. Pothos platyneuron *Desf.* Calad. platynervium Arum lanceolatum *Fl. Flum.*)	—	15
— crinipes *Ad. Brogn.* (Ph. squamiferum *Poep.*) . . r	—	10
— cuspidatum *C. Koch* et *Bché.* (Dracontium cordatum *hort. Ber.* *β.* scandens *C. Koch* et *Bouché.*)	—	15
— erubescens *C. Koch* et *August* (Anthurium *Cat. Lind.*)	1	—
— eximium *Schott.*	—	20
— Fontanesii *Kth* (Caladium brasiliense *Desf.*)	2/3-1	—
— grandifolium *Schott.* (Arum *Jacq.* Caladium *W.*) . . .	—	10
— heliconiaefolium *hort.* . . .	—	15
— Hookerii *Schott* (Caladium grandifol. *Hook*).	1	—
— Imbé *Schott.* (Caladium *h. Berol.* Colostigma *Schott*) .	—	10.

Thl. ngr.

Philodendron hastatum *C. Koch* et *Sello* (P. Simsii *hort.* Calad. *hort.*) . . . . — 25
— inciso-crenatum *Kth.* (laciniosum *Schott*) . . . . . . — 15
— microphyllum *hort.* . . . . — 10
— ornatum *Schott* . . . . . — 15
— pedatum *Kth.* (Cal. *Hk.* C. lacerum *hort. Berl.* P. quercifolium *Hort*) . . . . r — 10
— pinnatifidum *Schott* (Arum *Jaq.* Calad. *W.*) . . . . 1/2-1 —
— quinquenervium *Miq.* . . — 20
— Riedelianum *hort.* (Syngonium *Schott*) . . . . . . — 20
— serpens *hort.* . . . . — 15
— Simsii *Kth.* (Fontanesii *hort.* Calad. grandifol. *Sims.* C. Simsii *Hook.*) . . . . . . 1 —
— spec. e Meridor . . . . 2 —
— tripartitum *Schott* (Arum *Jacq.* Calad. *W.*) . . . . . — 20

Plectogyne lurida (Macrogyne) . — 20
— variegata *Lk.* (Aspid. elatior *Moor.* et *Dcsne.* var. striata) — 10-20

Pothos lanceolata *L.* (Anthurium *Knth.*) . . . . — 20
— viridis *Parment* (Anthurium *C. Koch*) . . . . 1/2-4 —

Remusatia vivipara *Schott* (Arum *Rxb.*, Caladium *N. E.*) . k — 5-10

Richardia aethiopica *Kth.* (Calla *L.* Zantedeschia *Spr.*) . . k — 5

Sauromatum pedatum *Schott* (Arum *Fisch.*) . . . . k — 10

Scindapsus glaucus *Schott* (Pothos glauca *Wall.* non *Lk. Otto.* Poth. Wallichii *Steud.*) . — 15
— pinnatifidus *Schott* (Philod. giganteum *h. Belg.* . . . 1/2-1 —

Solenosterigma bicolor *Kl.* (Philodendron micans *Kl.*) . r — 10

Thl. ngr.

Spatiphyllum lanceolatum *Schott* (Dracontium lanceaefolium *Joig.*) . . . . — —

Syngonium auritum *Schott.* (Arum L. Caladium *Vent.* Philod. *hort.*) . . . . — 10
— podophyllum *Schott* . . . — 20

Typhonium divaricatum *Dcsne.* (Arum *L.* A. trilobatum *bot. Mag.* A. diversifolium *Cat. hort. Buiterz.* A. oriaense *R. Br.* Arisarum amboinicum *Rumph.* . . . k — 5

Xanthosoma appendiculata *Schott* — 10
— atrovirens *Koch* et *Bouché.* k — 20
— belophyllum *Kth.* (Arum sagittaefolium *L.*) . . . k — 10
— edule *Schott* (Calad. *Mag.*) k — 10
— hastaefolium *C. Koch* (Acontia *Schott.* Arum sagittaefolium *Lk.* Calad. brasiliense *Desf.*) . . . . — 10
— sagittifolium *Schott* (Mafaffa *hort. Belg.* Arum *L.* Calad. *Vent.* C. *hort.* Calla. sag. *Mich.* Peltandra *Raf.* . k — 5-10
— undipes *C. Koch.* (Alocasia undipes *C. Koch* et *Bché.* X. Jacquini *Schott* h. Schönbr. nec. in metelemata) . 1 —
— versicolor *Moritz* . . . . . — 10
— violaceum *Schott* (ianthinum *C. Koch.* sagittifolium *Willd.* Calad. *Desf.*) . . . . . . — 10
— xanthorrhizon *C. Koch* (Arum *Jacq.* Calad. *W.* X. Jacquini *Schott* in melet. nec in h. Schönbrunn) . . . . . . 2 —

Zantedeschia cordata *C. Koch.* (Homalonema *Schott.* Dracontium *Houtt.* . . . . . — 10

Begonia.

(Im weitesten Sinne.)

Auch in diesem Jahre ist meine Sammlung durch manche ausgezeichnete Neuheit bereichert worden. Vorzüglich sind es neben den von mir im verflossenen Jahre in den Handel gegebenen Xanthina Hybriden des Herrn Garten-Insp. C. Bouché, welche sich als wirklich schön bewährten, die B. Griffithii *Hook.* (picta) Roylei und splendida, welche wohl alle bisher bekannten, neben der Thwaitesii und zeylanica an Schönheit — Eleganz der Blattform und Colorit — übertreffen. Unter den weniger durch Blattschmuck sich auszeichnenden Arten verdient besonders die Billeterii, eine Hybride von diversifolia und acuminata, der besondern Erwähnung, da dieselbe vom Spätsommer bis weit in den Winter hinein mit köstlichen rosascharlach-

farbenen Blüthen sich bedeckt. Die mit einem † bezeichneten lassen sich als Blattpflanzen besonders empfehlen, die übrigen stehen zwischen beiden Abtheilungen, zeichnen sich also theils durch Blätterschmuck oder reiches und dankbares Blühen aus.

	Thl.	ngr.
acuminata *Dryand.* (B. Hamiltoniana *Lehm.*)	—	5
†albo-coccinea *Hook.* (Mitscherlichia *Kl.*)	—	10
†argentea *V. H.* (Gaerdtia *Kl.* Beg. aculeata *Walp.*)	—	10
†argyrostigma *Fisch.* (B. maculata *Rddi.* Gaerdtia maculata *Kl.*)	—	5
aucubaefolia *h. Berol.* (Knesebeckia *Kl.* Helleri *hort.*)	—	10
†auriformis *V. H.* (Bachia *Kl.*)	—	10
brasiliensis *Kl.* (Wageneria *Kl.*)	—	10
Billeterii *hort.* (diversifolia-incarnata.)	—	20
caffra *Meisn.* (Augustia *Kl.* B. sinuata *Meyer.* B. uncinata *h. Berol.*)	—	10
†carolinaefolia *Regel* (Gireoudia *Kl.* cauliflora, crassicaulis *h.*	—	10

Sehr interessante Art mit gefingerten grossen Blättern.

	Thl.	ngr.
†Carolina indivisa *hort.*	—	15
castaneaefolia *Otto* et *Dietr.* (Titelbachia *Kl.*)	—	5
coccinea Fischeri *hort.*	—	10
†conchaefolia *Dietr.* (B. scutellata *Liebm.*, Gireoudia *Kl.* cochleata *hort.*)	—	5
†dichotoma *Jacq.* (Wageneria *Kl.*)	—	5
dipetata *Grah.* (Haagea *Kl.* madida *hort.*	—	5
†Dirixii *h. Belg.* (B. hernandiaefolia *hort.* non *Hook.*)	—	10
discolor *R. Br.* (Knesebeckia *Kl.*) k	—	5
Dregei *Otto* et *Dtr.* (B. parvifolia *Meyer*, Augustia *Kl.*)	—	5
fagifolia *Fisch.* (Wageneria *Kl.*) k	—	7
†ferruginea *Dryand.* (Stiradotheca *Kl.*)	—	10
Finleysoniana *Wall.*	—	15
Fischeri *Otto* et *D.* (Pritzelia *Kl.*)	—	5
frigida *hort.*	—	10
fuchsioides *Hk.* (Titelbachia *Kl.*)	—	5
— acuminata *hort.*	—	10
glabra *Herb. Ruiz.* (Sarsea *Kl.*)	—	10
†Griffithii *Hook.* (picta *Smith.*)	1	—

Die schönste aller Begonien. Die grossen, weichbehaarten lebhaft grünen Blätter sind mit einem hellen Gürtel längs des Saumes geziert, das Centrum mit rothem Scheine.

	Thl.	ngr.
†heracleifolia *Cham.* et *Schldl.* var. nigricans *hort.* (Begonia punctata *Kl.* nigrescens *hort.* [*Belg.* ricinifolia maculata *hort.*)	—	10

Grosse eingeschnittene Blätter, auf hellgrünem Grunde schwarzgrüne Zeichnung.

	Thl.	ngr.
†hernandiaefolia *Hook* non *hort.* (umbilicata *hort.*)	—	10
Hügelii *hort.*	—	10
hybrida *hort. Belg.*	—	5
— Deuringerii *hort.*	—	10
— Ingrami *h. Angl.*	—	10
†hydrocotylaefolia *Grah.* (Gireoudia *Kl.* erythrophylla *hort. Amst.*)	—	5-10
— Warszewiczii *h. Berol.*	—	5
incarnata *Lk.* et *Otto* (B. insignis *Grah.*, Knesebeckia *Kl.*)	—	5
Janti *Linden.*	—	10
†jatrophaefolia *hort.*	—	10
†laetevirens *hort.*	—	15
La Peyrousii *V. Htte.*	—	10

Eine der am dankbarsten blühenden B. mit schönen glänzenden Blättern, blüht vom December bis zum März.

	Thl.	ngr.
†Lindleyana *Warsz*	—	10
†lobulata *hort.*	—	15
lucida *Kth.* (Gaerdtia *Kl.* B. Kunthiana *Walp.*)	—	10
†luxurians *Scheidw.* (Scheidweileria *Kl.* verticillata digitata *Rd.*)	—	10

Schon der Name sagt, dass die Natur diese Pflanze mit einem eignen Reiz ausstattete, ziemlich grosse gefingerte Blätter besetzt mit kurzen rothgefärbten Härchen.

	Thl.	ngr.
†macrophylla *Dryand.* (Gireoudia *Kl.* peponifolia *hort.*)	—	15
†manicata *Vis.* (Gireoudia *Kl.*)	—	5
†Meyeri *O.* et *D.* (B. eriocaulis *Vis.* Gurltia *Kl.*)	—	10
microphylla *Hrb. Willd.* (Lepsia *Kl.*)	—	10
miniata *Planch.* et *Lind.*	—	5
— rosea *hort.*	—	10
Moritziana *Kunth* et *Bouché*	—	10
natalensis *hort.* (Augustia *h.*)	—	10
nitida *Dryand.*	—	5
odorata *Willd.*	—	5
— sanguinea *hort.*	—	10
opuliflora *Putzeys.*	—	10
— miniata *hort.*	—	15
Ottonis *Walp.* (fuchsioid. alba *hort.*)	—	10

Thl. ngr.

†pannosa *hort.* . . . . — 15
papillosa *Grah.* (Knesebeckia *Kl.*) — 5
†peltata *Otto* et *Dietr.* (Rachia *Kl.*) — 5
† — coccinea *hort.* . . . . — 15
phyllomaniaca *Mart.* (B. Moehringii *Rgl.*, B. dipetata Warscewiczii *h. Berol.*, Knesebeckia *Kl.*) . . . . — 10
†platanifolia *Schott* . . . . . . — 10
†Porteriana *hort.* . . . . — 20
Prestoniensis *Moore* (*hybr.*) . . — 5
— superba *hort.* . . . . — 10
Beide dankbare Blüher mit scharlachfarbenen Blumen.
†princeps *hort.* (Pritzelia *Kl.*) . — 15
†pruinata *h. Berol.* . . . . . . — 10
Putzeysii *hort.* . . . . — 10
repens *hort.* . . . . — 10
†reticulata *Gardn.* . . . . . . — 10
†rhizocaulis *hort.* . . . . — 15
†Royleii *Koch.* . . . . 1 —
Der B. Griffithii sehr ähnlich und eben so schön.
rubicunda *hort.* . . . . — 10
†rubro-nervia *hort.* . . . . . . — 10
† — venia *Hk.* (Platycentr. *Kl.*) — 10
rutilans *hort.* . . . . — 10
sanguinea *Raddi* (Pritzelia *Kl.*) . — 10
— coccinea *hort.* . . . . . . — 15
Saundersiana *hort.* . . . . . . — 10
scandens *Sw.* (B. scandens *Aubl.?*) — 5
semperflorens *Lk.* et *Otto* . . . — 5
sinuata *Grah.* . . . . — 5
spathulata *Haw.* (B. nervosa *Dsf.*, cucullata *W.*) . . . . . . — 5
speciosa *hort.* . . . . — 10
† — e Brasilia *h. Berol.* . . . . — 7
† — — Java (Bergmanni) . . 1 —
— — Meridor No. I. . . . 1 —
† — — — No. II. . . . — 20
— — — No III. . . . 1 —
†splendida *Lindl.* . . . . 1 —
Die jungen Blätter könnte man leicht für rothen Plüsch halten.
†stigmosa *Lindl.* (Gireoudia *Kl.*) — 8
†Thwaitesii *Hk.* (Reichenheimia *Kl.*) ½-1 —
Köstliche Färbung, auf dunkelgrünem glänzendem Grunde lichte Flecken, gehoben durch die rothe Behaarung, welche der Oberfläche der Blätter ein sammetartiges Ansehen verleiht; unter einer Glasglocke erreicht das Colorit den zartesten Schmelz.
†tomentosa *Schott.* (Wageneria *Kl.*) — 10
ulmifolia *Humb.* . . . . — 20
undulata *Hook.* (Gaerdtia *Kl.*) . — 5
†urophylla *hort.* . . . . — 20
†Verschaffelti *hort.* . . . . . . — 10
†vitifolia *Schott.* (B. grandis *Otto*, Wageneria *Kl.*) . . . . . — 5
Wagenerii *hort.* . . . . — 15
†xanthina *Hook.* . . . . — 10
† — gandavensis *h. v. Htt.* . . — 10
† — — marmorea *hort.* . . 1 —
† — — argyrea *C. Bouché* . — 15
† — — atrorubens *C. B.* . . — 15
† — — laetevirens *C. B.* . . — 15
† — — lucida *C. B.* . . . . . — 15
† — — margaritifera *C. B.* . — 15
† — — viridis *C. B.* . . . . — 15
† — Kaiserin Elisabeth *Abel.* . 1 —
† — Reichenheimii *hort.* . . . 1 —
† — latimaculata *hort.* . . . 1 —
† — marmorea *h. v. Htt.* . . — 20
Die ältern Xanthina-Hybriden waren schon seit ihrem ersten Erscheinen die Lieblinge aller Begonienfreunde, und belohnen die wenige Mühe ihrer Cultur mit schnellem üppigen Wachsthume und prächtigen Blattzeichnungen. Die im vorigen Jahrgange meines Catalogs pag. 15. beschriebenen 6 Blendlinge des Herrn C. Bouché sind sehr zu empfehlen und habe ich die Preise in Folge bedeutender Vermehrung sehr ermässigt.
zebrina *hort.* (Pritzelia *Kl.*) . . — 5
— alba *hort.* . . . . — 15
— pallida *hort.* . . . . . . — 6
— purpurea *hort.* . . . . . . — 5
— rubra *hort.* . . . . — 10
— sanguinea *hort.* . . . . . — 15
— splendens *hort.* . . . . . — 10
†zeylanica *v. Houtte.* . . . . ⅔-1 —
Ganz der Thwaitesii ähnlich, nur dass sie etwas weniger hervortretendes Colorit hat, und diese auf der Unterfläche grün, Thwaitesii aber brillant roth gefärbt ist.

Bromeliaceae.

Dankbares Blühen, und eine den meisten Arten eigene gefällige Form, sichern den Bromeliaceen überall ein Plätzchen in den Gewächshäusern. Besonders bemerkbar machen sich die Aechmea durch ihre herrlichen korallenartigen Blüthenähren, die Billbergia und Pitcairnia durch die verschiedenartigsten Farben der Blumen, als: roth, blau, violett, weiss, grün u. s. w., sowie die Pholidophyllum und Vriesea durch ihre mit bunten Querstreifen gezierten Blätter. Bezüglich der Cultur passen sie sehr gut ins Orchideenhaus.

	Rthl.	ngr.
Acanthostachys strobilacea *Lk. Kl. O.* (Hohenbergia strobilacea *Schult.*)	—	10
Aechmea discolor *Hook*	—	20
— fulgens *Brogn.*	—	20
— miniata *Hook* β. discolor	2	—
Ananassa sativa Cayenne à feuilles épineuses	2	20
— — Cayenne à feuilles lisses	5	—
— — nervosa maxima *hort.*	1	—
Billbergia acaulis *h. Belg.*	—	10
— amoena *Lindl.*	—	10
— clavata *Lindl.* (Bromelia melanantha *Ker.*)	—	10
— discolor *h. Belg.*	—	20
— farinosa *hort.*	—	20
— iridifolia *Lindl.*	—	5
— Moreliana *Brngt.*	—	10
— Quesnelliana *h. Belg.*	—	—
— rhodocyanea *Lem.*	1	—
— thyrsoidea *Mart.*	—	20
— tinctoria *Mart.*	—	10
— zebrina *Lindl.*	—	10
Bromelia bicolor *hort.*	—	10
— Commelyniana *de Vriese.*	2	—
— bracteata *Sodt* (Anan. *Ldl.*)	1	—
— humilis *L.*	—	10
— Karatas *L.*	—	10
— sp. e Brasilia No. 1.	1	—
— — — No. 2.	—	20
Caraguata lingulata *Lindl.*	1	—
Dasylirion geminiflorum *Broncel.*	—	—
— nova spec. Texas.	3	—
Dyckia rariflora *Schult.*	—	15
— remotiflora *Otto* et *Dietr.*	—	20
Gutzmannia tricolor *R.* et *P.*	1	—
Hechtia spec. *Warscewicz.*	—	15
Pholidophyllum zonatum *Vis.* (Tillandsia zonata var. viridis *hort.*	—	10

	Rthl.	ngr.
Pholidophyllum fuscum *Vis.* (Till. zon. β fusca *hort.*)	—	10
†Pitcairnia albucaefolia *Schrd.*	—	10
— angustifolia *Ait.*	1	—
— bromeliaefolia *Ait.*	—	10
— decora *hort.*	1	—
— fastuosa *hort.*	1	—
— flammea *Ldl.*	—	15
— fulgens *Dcsne.*	1	—
† — furfuracea *Hook.*	—	10-20
— latifolia *Ait.*	—	10
— muscosa *Mart. Schult.* (Puya leiolema *H. Petrop.*)	—	10
— pruinosa *H. B.*	—	10
— punicea *Scheidwl.*	—	5-10
— ramosa *Jacq. fil.*	—	10
— ringens *Lk. Kl. Otto.*	—	10
— speciosa *hort.*	—	10
— suaveolens *Lindl.*	—	5
— sulphurea *Andr.*	—	15
— undulatifolia *Hook.*	—	15
Pourretia floccosa *Linden*	½-1	—
— magnispatha *hort.*	—	—
— meridensis *Lind.*	—	20
— mexicana *hort.*	—	—
— surinamensis *Miq.*	—	—
— sp. e Merida	1	—
— truxillensis *Lind.*	—	20
Puya Altensteinii *Otto* et *Dietr.*	—	5-10
— aurantiaca *h. Vindob.*	—	10
— flavescens *hort.*	—	10
— Funkiana *Lind.*	—	10
— maidifolia *Morr.*	—	10
— undulata *Ch. Lehm.*	—	10
Tillandsia farinosa *hort.*	1	—
— nana *hort.*	—	10
— nigra *hort.*	—	15
— Schüchii *Beer* et *Fenzl.*	—	10
Vriesea speciosa *Hook.* (Tillandsia splendens *Ad. Brogn.*).	1-3	—

Filices et Lycopodiaceae.

Jeder weiss, dass man hier nicht nach Blüthenfülle und Farbenschmelz suchen darf; dagegen stattete sie die Natur auf andere Weise durch Merkwürdigkeit und Reichthum der Formen aus, so dass sie von mikroskopischer Kleinheit an sich in den mannichfaltigsten, oft gigantischen Formen, bis zur Grösse und Pracht der majestätischen Palmen emporschwingen und mit jenen um den Preis vollendeter Schönheit kämpfen!!! Solche, die sich im Kalthaus halten, sind mit einem * bezeichnet.

	Rthl.	ngr.
Acrostichum brevipes *Kze.* (A. callaefolium *Lk.* non *Bl.* A. alatum *hort.* Elaphoglossum callaefol. *J. Sm.*)	—	20
— conopodium *Mett.*	—	—
— crassinerve *Kze.* (conforme *Lk.*, Elaphoglossum *J. Sm.*)	—	20
— guatemalense *Kl.*	1	—

	Rℓ.	ngr.
Acrostichum lomarioides	—	—
— melanopus *Kze.*	3	—
— piloselloides *Pr.*	2	—
— scolopendrifolium *Raddi* (Elaphoglossum *J. Sm.*, Olfersia *Pr.*)	2	—
— simplex *Swt.* (Elaphoglossum *Schott.* Olfersia *Pr.*)	—	20
— viscosum *Sw.* (Olfersia *Pr.*)	1	—
Adianthum aethiopicum *L.* (trigonum *Labill.*)	—	5
— assimile *Swz.* (non *hort.*)	—	10
— brasiliense *Raddi*	—	10
— capillus *Lk.*	—	5
— cuneatum *Langsd.* et *Fisch.*	—	5
— curvatum *Klfs.*	—	10
— denticulatum *Sw.*	—	15
— formosum *RBr.*	—	5
— intermedium *Sw.* (fovearum *Raddi*, triangulatum *Klfs.*)	—	20
— macrophyllum *Swz.*	—	20
— Moritzianum *Lk.*	—	5
— obliquum *W.* (lucidum *Sm.*)	1	—
— pubescens *Schk.* (plicatum *Klfs.*)	—	5
— reniforme *L.* (asarifolium *W.*)	—	20
— setulosum *Sm.* (affine *W.*)	—	5
— tenerum *Sw.*	—	5
— tetraphyllum *H. B. K.* (Joverianum *h. Angl.*)	—	10
— trapeziforme *L.* (rhomboideum *Schk.*)	—	20
— venustum *Don.*	3	—
— Wilsonii *Hook.*	3	—
Allosurus falcatus *Kze.* (Pteris *R. Br.*, Platyloma *J. Sm.*, Pl. Brownii *Sm.*)	—	5
— rotundifolius *Kze.* (Pteris *Forst.*, Platyloma *J. Sm.*)	—	10
— sagittatus *Pr.* (Pteris *Cav.*, Platyloma cordatum *J. Sm.*)	—	10
Alsophila vide Baumfarrn.		
Aneimia Drégeana *Kze.*	—	10
— laciniata *Lk.* (Aneimidictyon *Pr.*)	1	—
— Phyllitides *Sw.* (Aneimidictyon *J. Sm.*)	—	10
— villosa *W.*	—	15
Angiopteris vide Baumfarrn.		
Anisogonium spec. I.	2	—
— spec. II.	2	—
Aspidium alatum *Bl.* (vastum *Bl.*)	5	—
— abortivum *Bl.*	—	—
— chrysolobum *Klfs.*	—	10
— coniifolium *Kze.* (A. carvifol. *Kze.*, A. coniifolium *Wall.*)	1	—
— coriaceum *Sw.* (capense *Sw.*, Tectaria Calahuala *Cav.*, Ruhmora aspidioides *Raddi*, Polypodium argentatum *Jacq.*)	—	7
— decursive pinnatum *Kze.* (Polypodium *van Hall*, Lastrea decurrens *J. Sm.*)	—	5
— dilaceratum *Kze.*	1	—
— Fadyenii *Mett.* (Fadyenia prolifera *Hook.*, Asplenium proliferum *Sw.*)	—	20
— falcatum *Sw.* (Cyrtomium *Pr.*)	—	5
— Foenicesii *Lowe.*	2	—
— molle *Sw.* (Polypodium *Jacq.*, P. nymphale *Schr.*)	—	5
— molliculum *hort.*	—	15
— patens *Sw.* (nymphale *Schk.*)	—	10

	Rß.	ngr.
Aspidium Plumieri *Kze.*	1	—
— proliferum *R. Br.*	1	—
— pubescens *Sw.*	—	20
— quinquangulare *Kze.*	2	—
— rivulosum *Lk.*	—	20
— Serra *Sw.* (Cyclodium *Brogn.*)	—	10
— Sieboldii *hort. Gand.*	—	10
— submarginale *Luet.* ?	1	—
— trifoliatum *Swz.* (Bathmium *Lk.*, Polyp. *Jacq.*)	⅓-1	—
— uliginosum *Kze.* (Polystichum pruinosum *Miq.*)	—	15
— unitum *Swz.* (Nephrodium *Schott.*)	—	15
— vestitum *Sw.*	—	—
— violascens *Lk.*	—	10
Asplenium alatum *H. B. K.*	—	15
— alternifolium *Mett.*	2	—
— arborescens *Mett.* (Diplazium *Sw.*, Callipteris *Bory*) vd. Bmf.		
— asperum (Diplazium *Bl.*)	2	—
— Belangeri *Kze.* (Darea *Bory*)	—	10
— Blumei *Bergsm.* (Diplazium marginatum *Bl.*)	3	—
— Brownii *Sm.* (Allantodia australis *R. Br.* Athyrium australe *Pr.*)	—	20
— bulbiferum *Forst.* (Caenopteris *Desv.*)	—	10
— caudatum *Forst.* (Tarachias *Pr.*)	—	15
— celtidifolium *Mett.* (Diplazium *Kze.*) vd. Bmf.		
— cicutarium *Swt.* (Caenopteris *auct.*, Darea *auct.*)	—	15
— crenulatum *Pr.* (Nidus *Raddi.* serratum *Lk.*)	—	20
— cyrtopteron *Kze.* (Karstenii *hort.* non *Kl.*)	—	8
— decurtatum *Kze.*	—	15
— dilaceratum *Kze.*	2	—
— dispersum *Kze.* (bipartitum *Lk.*, sulcatum *Pr.*)	—	10
— Dregeanum *Kze.*	—	10
— Drepanopterum *R. Br.*	—	10
— ebenum *Ait.* (trichomanoides *Schk.*)	—	10
— firmum *Kze.* (abscissum *Kl.*)	—	20
— flabellifolium *Cav.*	—	5
— foecundum *Kze.* (compressum *h. Angl.*, Caenopteris vivipara *Lodd.*)	—	10
— furcatum *Sw.* (praemorsum *hort.*)	—	10
— Halleri *R. Br.*	—	15
— heterodon *Bl.*	—	15
— Klotzschii *Mett.* (Lotzea diplazioides *Kl.* vd. Bmf.		
— lacerum *auct.?*	—	10
— Lasiopteris *Mett.* (Diplazium *Kze.*)	—	5
— lucidum *Forst.*	—	20
— malabaricum *Mett.* (Diplazium *Spr.*) vd. Bmf.		
— marinum *L.* (Diplazium giganteum *Karst.*) vd. Bmf.		
— mexicanum *Mart.* et *Gal.* (planicaule *J. Sm.*, truncatum *Don.*)	—	10
— Nidus *L.* (Neottopteris vulgaris *J. Sm.*)	⅓-2	—
— Otites *Lk.* (pulchellum *Pr.*)	—	10
— pinnatifidum *Nutt.*	—	5
— plantagineum *Sw.* (Diplazium)	2	—
— polypodioides *Mett.* (Diplazium)	1	—
— praemorsum *Sw.* (A. dardaefolium *Bory*)	—	—
— pubescens *Mett.* (Diplazium *Lk.*) vd. Bmf.		
— pumilum *Sw.* (anthriscifolium *Jacq.*)	—	7

	Thlr.	ngr.
Asplenium Shepherdii *Spr.* (Diplazium *Spr.*) vd. Bmf.		
— spec. e Java	1	—
— — e Mexico	2	—
— — e Venezuela	5	—
— striatum *Mett.* (Diplazium *Pr.*)	—	—
— Trichomanes *L.*	—	5
— truncatum *Mett.* (Diplazium *Kze.*)	1	—
— viviparum *R.* (Caenopteris *Berg.* Darea *W.*)	—	20
Balantium vide Baumfarrn.		
Blechnum alpinum *Mett.* (Stegania *R. Br.*, Lomaria *Spr.*)	—	10
— angustifolium	1	—
— attenuatum *Mett.* (Lomaria *W.*)	—	20
— boreale *Sw.* (spicant *Roth.*, Lomaria *Desv.*, Struthiopteris *Scop.*, Osmunda *L.*, Onoclea *Hoffm.*, Lomaria borealis *Lk.*)	—	5
— brasiliense *Desv.* (campestre *hort.*, nitidum *Pr.*) vd. Bmf.		
— — β. corcovadense *Raddi.* vd. Bmf.		
— campylotis *Schldl.* (Lomaria *Kze.*)	—	10
— capense *Schldl.* (Lomaria *Willd.*)	1	—
— falcatum *Lodd.* (Lomaria *Spr.* Stegania *R. Br.*)	4	—
— Gilliesii *Mett.* (Lomaria *Hook.* et *Grev.*)	—	10
— glandulosum *Klfs.*	—	5
— — β. elongatum *Kze.*	1	—
— gracile *Klfs.*	—	10
— intermedium *Lk.*	—	10
— Lanceola *Sw.* (Bl. lanceolatum *Raddi*)	—	10
— latifolium *Moritz.*	2	—
— longifolium *H. B. Kth.*	—	10
— occidentale *L.*	—	5
— Patersonii *Mett.* (Lomaria *Spr.*, Stegania *R. Br.*)	—	10
— pectinatum *Pr.* (lomarioides *Pr.*, salicifolium *Klfs.*)	—	10
— polypodioides *Raddi*	—	10
— punctulatum *Sw.* (Lomaria *Kze.*)	—	20
— triangulare *Spr. Lk.*	—	10
— volubile *Klfs.* (Salpichlaena *J. Sm.*)	3	—
Ceratopteris thalictroides *Brogn.* (Arostichum *L.*, Furcaria *Desv.*, Pteris *Sw.*, Ellebocarpus oleraceus *Klfs.*)	—	10
Cheilanthes chlorophylla *Swz.*	—	20
— intramarginalis *Hook.*	—	10
— Mathewsii *Kz.*	10	—
— microphylla *Sw.* (micromera *h. Berol.*, Adiantum microphyllum *Klfs.*, Nothochlaena cheilanthoides *Spr.*)	—	20
— Preissiana *Kze.*	—	10
— pteroides *Swz.* (Cassebera *J. Sm.*)	1	—
— profusa *Kze.*	—	20
— tomentosa *Lk.* (Nothochlaena *J. Sm.*, Myriopteris *Feé.*)	—	15
Chrysodium diversifolium *Mett.* (Poecilopteris *Pr.*)	3	—
— flagelliferum *Mett.* (Acrostichum *Wall.*, Cyrtogonium *J. Sm.*, Heteroneuron heterocliton *Feé.*)	—	10
— nicotianaefolium *M.* (Gymnopteris *Pr.*)	1	—
— repandum *Mett.* (Campium)	5	—
Cibotium glaucescens *Kze.* (glaucophyllum *Pr.*, Barometz *J. Sm.*, Aspidium Bar. *h. Angl.*, Balantium glaucescens *Kze.*)	3	—
— Schiedei *Schldl.* vd. Baumfarrn.		

	Thl.	ngr.
Danaea guatemalensis *hort. Hüg.*	—	—
Davallia dissecta *Moore* (Caenopteris)	1	15
— elegans *Sw.* (bidentata *Schk.*, Humata elegans *Desv.*)	—	15
— pentaphylla *Bl.*, (Stenolobus *Pr.*, Scyphularia *Feé.*)	5	—
— pyxidata *Cav.* (Humata *Desv.*)	—	15
— spec. e Caracas	1	—
— — e nova Zeeland *hort. Lind.*	2	—
Dicksonia cicutaria *Swz.*	—	15
— dissecta *Swz.*	1	—
— Lindeni *Hook.* Stark	10	—
— nitidula *Kze.*	—	5
— obtusifolia *W.*	1	—
— rubiginosa *Klfs.* (Sitobolium *J. Sm.*)	—	5
— tenera *Pr.* (adiantoides *hort.*, Sitobolium *J. Sm.*)	—	10
— Zippeliana *Kze.*	—	15
Didymochlaena lunulata *Desv.* (sinuosa *Desv.*, squamata *Desv.*, trunculata *J. Sm.*, Adiantum lunulatum *Houtt.*, Aspidium lunulatum *Houtt.*, Aspidium truncatum *Sw.*, A. squamatum *W.*, A. cultratum *Pr.*, A. pulcherrimum *h. Angl.*, Diplaz. pulcherrimum *Raddi*, Lonch. ramosa *Plum.*) vd. Bmf.		
Gleichenia scandens *auct.?*	1	—
Gymnogramme Calomelanos *Klfs.* (Acrostichum *L.*, Ceropteris *Lk.*)	—	10
— chrysophylla *Klfs.* (Acrostichum *L.*, Ceropteris *Lk.*)	—	15
— gracilis *Lind.*	—	25
— javanica *Bl.* (variegata *Miq.*)	—	20
— lanata *Kl.*	—	15
— l'Herminierii *Bory*	—	10
— Martensii *Bory* (hybrida *Martens.*)	—	10
— — — (β. monstruosa *hort.*)	—	20
— peruviana *Desf.*	—	20
— rufa *Desv.* (Acrostichum *L.*, Hemionitis *Sw.*, Neurogramma *Lk.*)	—	15
— sulphurea *Desv.* (Acrostichum *Sw.*)	—	5
— tartarea *Desv.* (dealbata *L.*, Hemionitis dealbata *W.*, Acrostichum *Sw.*, Ceropteris *Lk.*)	—	5-10
— tomentosa *Desv.* Hemion. *Rddi.*, Neurogr. *Lk.*, Ceter. barbatum *Pr.*)	—	10
Hemionitis cordata *Roxb.* (Gymnogramme *Schk.*)	1	—
— palmata *L.* (Gymnogr. *Mett.*)	—	20
Hemitelia vd. Baumfarrn.		
Humata immersa *Mett.* (Leucostegia *Br.*)	1	—
Hypoderris Brownii *RBr.*	1	15
Hypolepis amaurorhachis *Hook.* (Cheilanthes *Kze.*)	—	10
— repens *Pr.* (Cheilanthes *Klfs.*, Lonchitis *L.*)	—	7
— tenuifolia *Bhdi.* (Cheilanthes dicksonioides *End.*, Ch. arborescens *Swz.* Dicksonia davallioides *R. Br.*)	—	10
Lomariopsis scandens *Fée* (Stenochlaena *J. Sm.*, Acrostichum *L.*, Lomaria *W.*, Olfersia *Pr.*, Onoclea *Sw.*)	—	15
Lophosoria vd. Baumfarrn		
Lycopodium Phlegmaria *Spring.* β. longifolia	2	—
Lygodium circinatum *Sw.* (Hydroglossum *W.*, Ophioglossum *Burm.*)	3	—
— japonicum *Sw.* (Hydroglossum *W.*, Ophioglossum *Thbg.*)	—	15
— scandens *Sw.* (microphyllum *RBr.*, diversifolium *h. Amst.*, Hydroglossum *W.*, Odontopteris *Bhdi.*; Ophioglossum *L.*, Ugena microphylla *Cav.*)	1	—
Marattia cicutaefolia *Klfs.* (fraxin. *Rddi.*, Raddiana *Schtt.*, Gymnoth. sp. *Pr.*)	4	—

	Fl.	ngr.
Marattia Kaulfussii *Kze.* (alata *Rddi.*, laevis *Klfs.*, macrophylla *hort.*, Eupodium Kaulfussi *J. Sm.*)	—	10
— sylvatica *Bl.* (intermedia *hort. Amstel.*)	10	—
Meniscium sorbifolium *Willd.* vd. Bmfarrn.		
— triphyllum *Sw.*	—	—
Mesochlaena javanica *RBr.* (Lastraea microchlaena *de Vriese*, Sphaerostephanus asplenioides *Kze.*) vd. Baumfarrn.		
Microlepia aculeata *M.* (Davallia *Swt.*)	10	—
— tenuifolia *Mett.* (Davallia *Sw.*, D. venusta *Schk.*)	2	—
— trichosticha *J. Sm.* (Davallia *Hook.*, Selenidium divergens *Kze.*)	—	15
Mohria thurifraga *Swz.*	—	15
Nephrolepis davallioides *Kze.* (Aspidium *Swz.*)	—	15
— exaltata *Schott* (N. neglecta *Kze.*, intramarginale *Kze.*, Aspidium *Sw.*, Nephrodium *Lk.*, Polypodium *L.*)	—	10
— pectinata *Schott.* (Aspidium *W.*, Nephrodium *L.*, Asp. trapezoides *Schk.*, Nephrod. Schkuhrii *Lk.*)	—	10
— platyotis *Kze.*	—	15
— tuberosa *Pr.* (Aspidium *Bory.*, Nephrodium *Lk.*)	—	10
Nothochlaena canescens *Kze.*	—	10
— chrysophylla	2	—
— laevis *Mart.* et *Galeot.*	1	—
— nivea *Desv.* (incana *Pr.*, Pteris *Poir.*, Acrostichum albidulum *Cav.*)	—	10
— rufa *Presl.*	1	—
— tenera *Gill.*	—	15
Oleandra hirtella *Miq.*	1	—
— nodosa *Pr.* (Aspidium *W.*)	2	—
Olfersia cervina *Kze.*	1	—
*Onoclea sensibilis *L.*	—	15
Osmunda gracilis *Lk.* (humilis *Swt.*, palustris *Lk.*)	—	7
— regalis *L.*	—	15
Phegopteris decussata *Mett.* (Polypodium *L.*) vd. Baumfarrn.		
— crenata *Mett.*	—	7
— Cuninghami *M.*	2	—
— divergens *Fée*	—	10
— tijuccana *Fée* vd. Bfrrn.		
— Linkiana *Mett.* (Gymnogramme *Kze.*)	—	10
— prolifera *Mett.* (Polypodium *Klfs.*)	—	20
— spectalibis *Mett.* (Polypodium *Klfs.*)	1	—
— villosa *Mett.* (Gymnogramme *Lk.*, Grammitis *Pr.*, Leptogramme *J. Sm.*)	—	10
Photinopteris Horsfieldii *auct.?*	4	—
Platycerium alcicorne *Desv.* (Acrostichum *Sw.*, Neuroplatyceros *Fée.*)	—	15
— grande *J. Sm.* (Acrostichum *A. Cunningh.*, Neuroplatyceros *Fée*)	—	—
Polybotrya aurita *Bl.* (Stenosemia)	3	—
— incisa	—	—
— cylindrica *Klfs.* (pubens *Lk.*)	3	—
— serratifolia *Kl.*	2	—
Polypodium areolatum *W.* (Chrysopteris sporadocarpum *Lk.* Pleopeltis *Pr.*)	—	15
— aureum *L.* (Chrysopteris *Lk.*, Pleopeltis *Pr.*, Plebodium *R. Br.*)	—	5-10
— Billardieri *RBr.* (Chrysopteris *Lk.*, Drynaria *J. Sm.*, Phymatodes *Pr.* Polyp. scandens *Labill.*, P. diversifolium *W.*)	—	5
— brevifolium *Lk.* (Campyloneuron *Pr.*)	—	15
— caespitosum *Lk.* (Campyloneuron *Pr.*)	—	15
— cambricum *Desv.*	—	5

		Fl.	ngr.
Polypodium	crassifolium *L.* (pachyphyllum *Kze.*, macrophyllum *Sieb.*, Anaxetum *Schott*, Phymatotes *Pr.*, Drynaria *Sm.*, Pleuridium *Fée*)	—	15
—	decurrens *Rddi.*	—	20
—	difforme *Bl.*	3	—
—	drepanopteron *Kze.*	—	10
—	fraxinifolium *Jacq.*	—	10
—	grandideus *Kze.* (colpotrix *Kze.*, angustatum *hort. Bonn.*, Goniophlebium *Fée*)	—	20
—	heracleum *Kze.* (morbillosum *Pr.*, coronans *hort.*, quercifolium *hort. Amst.*, Drynaria coron. *J. Sm.*, Phymatodes *Pr.*, Polypodium siifolium *Goldm.*)	1/3-1	—
—	ireoides. *Lam.* (Drynaria *J. Sm.*, Microsorum irregulare. *Lk.*, Phymatodes *Pr.*)	—	10
—	laetum *Rddi.* (Marginaria *Pr.*)	—	10
—	latipes *Lgsdf.* et *Fisch.*	—	10
—	leiorhizum *Wall.* (Phymatodes *Pr.*, Drynaria *J. Sm.*)	1	—
—	lepidopodum *Lk.* (Chrysopteris *Lk.*)	1	—
—	Lingua *Sw.* (Nipholobus *Spr.*, Craspedaria *Lk.*)	—	10
—	longissimum *Bl.* (melaneuron *Miq.*, nigrescens *Pl.*, rubidum *Kze.*, Dynaria *Sm.*)	—	15
—	lycopodioides *L.* (Pleopeltis lycopod. *Pr.*)	—	10
—	meniscifolium *Lgsdf.* et *Fisch.* (affine *hort.*, albopunctatum *Rddi.*, Marginaria *Pr.* Goniophlebium *J. Sm.*)	—	15
—	musaefolium *Bl.* (microsorum *Mett.*, Acrostichum alatum *hort.*)	—	20
—	nitidum *Klfs.* (Cyrtophlebium *J. Sm.*, Campyloneuron *Pr.*)	—	20
—	Otites *L.* (pectinatum *hort. Angl.*)	—	10
—	Paradiseae *Lgsdf.* et *Fisch.*	—	10
—	pennigerum *Forst.*	—	15
—	pertusum *Roxb.* (Nipholobus *Spr.*, Craspedaria *Lk.*)	—	10
—	Phyllitidis *L.* (Campyloneuron *Pr.*, Cyrtophlebium *J. Sm.*)	—	10
—	plumula *H. B.*, *Willd.* (pectinatum *Schk.*)	2	—
—	Preslianum *Spr.* (longifolium *Pr.*, meniscifolium *Lk.*)	—	10
—	pustulatum *Forst* (Drynaria *Lk.*)	—	5
—	pycnosorum *Lk.* (juglandifolium *Don.*)	1	—
—	quercifolium *L.* (callophyllum *Zipp.*, quercioides *Desv.*, sparsisorum *Desv.*, Schkuhrii *Bory.*, sylvaticum *Schk.*, Phymatodes *Pr.*, Drynaria *J. Sm.*)	2	—
—	ramosum *Lk.*	—	10
—	repens *Swz.* (Cyrtophlebium *J. Sm.*, Campyloneuron *Pr.*)	—	10
—	rupestre *Forst.* (Craspedaria *Lk.*, Nipholobus *Spr.*, N. serpens *Ldl.*)	—	10
—	sporadocarpum *W.* (Chrys. *Lk.*, Chrys. glauca *hort.*, Phlebod. *J. Sm.*)	—	15
—	sqamulosum *Klfs.* (leucolepis *Kze.*, myrtifolium *Lodd.*, Phlebod. *J. Sm.* Pleopeltis *Pr.*)	—	15
—	subauriculatum *Bl.* (P. metamorphum *Kz.*, P. Reinwardtii *Kz.*)	—	20
—	subtetragonum *Lk.* (tetragonum *L.*)?	—	10
—	taeniosum *H. B.* (angustifolium *Swz.*, dimorphum *Lk.*, loreum *Klfs.*, spartorosum *Spr.*, leucorhizon *Kl.*, nodosum *Kl.*, solutum *Kl.*, gracile *Kze.*, ensifolium *W.*, Marginaria *Pr.*, Campyloneuron cubense *Feé.*, Goniophlebium *Feé.*, Cyrtophlebium *J. Sm.*, Marginaria dimorpha *Lk.*)	—	15
—	vacillans *Lk.* (repandulum *Klfs.*)	—	10
—	vulgare *L.* (virginianum *W.*)	—	10
Pteris	arguta *Vahl.* (palustris *Poir.*, incompleta *Cav.*, Monogonia palustr. *Pr.*)	—	10
—	biaurita *L.* (Campteria *J. Sm.*)	—	10

	Rthl.	ngr.
Pteris crenata *Sw.* (chinensis *Loud.*, attenuata *Bl.*, Phorolobus chinens. *Dsv.*)	—	10
— cretica *L.* (serraria *Swz.*, vittata *Bory.*)	—	10
— denticulata *Sw.*, (reticulata *Dsv.*, tristicula *Raddi*, Litobrochia *auct.*)	—	20
— deflexa *Lk.*	—	10
— emergens *Lk.*	—	10
— elata *J. Agh.* β Karsteniana *Kze.*	1	—
— felosma *J. Sm.* (nemoralis *hort.*, Plumieri *hort.*)	—	10
— flabellata *Thbg.* (elegans *Jacq.*, paleacea et Hierohelenia *h. Lips.*, arguta *Schldl.*)	—	15
— hastata *Sw.* (Cheil. *Kze.*, Adiant. *L.*, Allos. *Pr.*, Cassebeera *J. Sm.*)	—	5
— — β macrophylla *Mett.* (Cheilanthes macrophylla *Kze.*, Cheilanth. hastata *Kze.*)	—	20
— japonica *Mett.* (Asplenium *Kze.*, Caenopteris *Thbg.*, Darea *W.*, Trichomanes *Thbg.*, Onychium *Kze.*, O. capense *Klfs.*)	—	10
— laciniata *W.*	3	—
— lata *Lk.*	—	15
— leptophylla *Sw.* (spinulosa *Rddi.*, Cheilanthes spinulosa *Lk.*)	—	10
— longifolia *L.* (ensifolia *Sw.*, costata *Bory*, vittata *W.*)	—	5
— macroptera *Lk.* (intermedia *Klfs.*)	1	—
— nemoralis *W.*	—	10
— palmata *W.*	—	10
— repandula *L.* (Sieberii *Tausch.*)	—	10
— serrulata *L.* (multifida *Poir.*)	—	5
— semipinnata *L.* (alata *Lam.*, dimidiata *Bl.*)	—	15
— tremula *R. Br.* (affinis *Rich.* chrysocarpa *Lk.*)	—	5
— umbrosa *R. Br.*	1	—
Scolopendrium Krebsii *Kze.*	—	10
— officinarum *Swz.* (Asplen. scolopendrium *L.*)	—	10
— — β crispum	—	10
— — γ daedaleum	—	10
— — δ undulatum	—	15
Selaginella africana *hort.*	—	15
— altissima *Kl.* (caesia arborea *hort.*)	⅓-1	—
— apotheca *Macho.*	—	10
— apus *Spring.* (Lycopodium apodum *L.*)	—	10
— cordifolia *Spring.* (Lycopodium *Desv.*)	—	5
— cuspidata *Lk.* (Lycop. tamariscinum *Lk. prius.*)	—	5
— denticulata *Lk.* (Lycopodium *L.*)	—	5
— dichrous *hort.*	—	15
— erythropus *Spring.* (Lyc. umbrosum *Ch. Lem.* Lyc. erythropus *Mart.*)	—	5
— flabellata *Spring.*	—	5
— flexuosa *Kze.*	—	5
— Galeottii *Spring.* (suavis *Kl.*, Schottii *hort.*)	—	10
— helvetica *Lk.* (Lycopod. *L.*)	—	5
— Hügelii *hort.*	—	10
— laevigata *Spring.* (Lyc. laevig. *W.* L. plumosum *L.* L. Wildenowii *Dsv.*)	—	10
— lepidophylla *Spring.*	—	10
— Martensi *Spring.* (Lyc. flabellatum *Mart.* et *Gal.*)	—	5
— paradoxa *hort.*	—	20
— Poeppigiana *Spring.*	—	10
— serpens *Spring.* (Lycop. *Desv.*)	—	10
— sulcata *Spring.* (stellata *Lk.*, Lyc. sulcatum *Desv.*, L. stoloniferum *Lk.*)	—	5
— uncinata *Spring.* (caesia *hort.*, Lycopod. caesium *hort.*)	—	5

	Rl.	ngr.
Selaginella variabilis *Hook.* (mutabilis)	—	10

Ist eine der originellsten Pflanzen, denn am Morgen noch schön grün, erblasst sie des Nachmittags bis zum Tode bleich!!! Auch leuchtendes Lycop. genannt.

	Rl.	ngr.
— viticulosa *Kl.*	—	10
— Warscewiczii *Kl.*	1	—
Taenitis revoluta *M.*	—	—
Trichomanes radicans *Swz.*	4	—
Woodsia incisa *Gill., Hook.* et *Gr.* (Physematium *Kze.*)	—	5
— mollis *J. Sm.*	—	10
— obtusa *Hook.* (Physematium *Kze.*)	—	5
Woodwardia angustifolia *Sm.* (floridana *Schk.*, onocleoides *W.*, Lorinseria areolata *Pr.*)	—	10
— aspera *Mett.* (Doodia *R. Br.*, D. rupestris *Klfs.*)	—	10
— blechnoides *Mett.* (Doodia *A. Cunningh.*, D. maxima *J. Sm.*)	—	15
— caudata *Mett.* (Doodia *R. Br.*, D. rupestris *Klfs.*)	—	5
— dives *Mett.* (Doodia *Kze.*)	—	10
— lunulata *Mett.* (Doodia *R. Br. J. Sm.*)	—	5
— media *Kl.* (Doodia *R. Br.*)	—	5
— radicans *Sw.* (stans *Sw.*, spinulosa *Mart. et Gal.*, Blechnum radicans *L.*)	—	15

Baumfarrn.

Ein Blick auf nachstehende Liste, oder besser — in mein Farrnhaus selbst wird Jedem die Ueberzeugung aufdringen, dass es nichts Imposanteres geben kann, als einen gut cultivirten, importirten Baumfarrnstamm.

	Stamm-höhe	Stamm-stärke	Wedel-zahl	Wedel-länge	Wedel-Breite	
	Fuss	Zoll	Stück	Fuss	Fuss	Rl.
Alsophila aculeata *Kl.* (Disphenia *Spr.* Cyathea *Willd.* A. ferox *Presl.*)	1¼	3	4	3½	1	40
— armigera *Kl.*	3¼	4	5	6	3	100
Ein seltenes und prächtiges Farrn.						
— gibbosa *Kl.*	½	3	3	1¾	1	40
— Humboldtii *Kl.* gigantisch!	1¾	6	6	6½	3	80
— pycnocarpa *Kz.*	3¾	1½	6	3	1½	100
Ein originelles Stämmchen von graziösem Wuchse, sehr selten!						
— radens *Klfs.*	¼	1	6	1½	¼	4
Angiopteris angustifolia	1	12	4	12	6	400
Asplenium arborescens *Mett.*	—	—	7	4	2	10
— celtidifolium *Mett.*	1	½	3	1¼	1	30
— Klotzschii *Mett.*	—	—	—	—	—	—
— malabaricum *Mett.*	1	½	4	1½	¼	—
— marinum *L.*	½	4	6	6	2½	6
— pubescens *Mett.*	½	2	4	2½	1½	1-4
— Shepherdii *Spr.*	¼	1	8	1	¼	—
— Wageneri *h. Berol.*	1½	3	5	5	3	30
Balantium antarcticum *Pr.*	1/12	1	3	1	⅓	1-4
— Karstenianum *Kl.*	⅙	1½	10	1	¼	4-8
Blechnum brasiliense *Dsv.*	½	1½	6	2	6	1
— β corcovadense *Raddi*	¾	2	18	1¾	6	20
Chrysodium vulgare *Feé*	—	—	—	—	—	15

	Stammhöhe	Stammstärke	Wedelzahl	Wedellänge	Wedelbreite	
	Fuss	Zoll	Stück	Fuss	Fuss	Rthlr.
Cibotium Schiedei *Schldl.* riesenhaft! Junge Pflanzen 4 Rthlr.	1½	8	9	12	7	200
Didymochlaena lunulata *Desv.*	1	2	5	2½	¾	5-10
Hemitelia capensis *R. Br.* klein	—	—	—	—	—	5
— guyanensis *Mett.* klein.	—	—	—	—	—	20
— horrida *R. Br.*	¾-1¼	4	4	5½	2½	30-50
— integrifolia *Kl.*	2-4	3	7-15	3-6	1-2½	20-60
— Karsteniana *Kl.*	1-2	12	6	7½	3	30-60
— Klotzschiana *Karst.* imposant!	1½	6	6	7	3	60
— obtusa *Kl.*	½-2½	6	2	2½	1½	3-60
— spectabilis *Kze.* Prachtstämme	2-3½	4-8	2-10	3-6	1-2½	20-80
— — — mit 3 Köpfen	2	12	19	5	1½	60
— speciosa	2	8	5	7	2½	60
Lophosoria affinis *Pr.* imposante Stämme! Junge Pflanzen 1—4 Rthlr.	2½	12	2	4	2½	60-80
— Moritziana	—	—	—	—	—	20
Meniscium sorbifolium *Willd.*	⅓	6	3	2	8	50
Mesochlaena javanica *R. Br.*	¼	1	2	4	1	1-5
Phegopteris decussata *Mett.* excellent!	1	7	5	6	2	30-60
— tijuccana *Fée.*	¼	2	3-4	1½	¾	20

Die der vorstehenden Farrn, bei denen nur 2 oder 3 Wedel angegeben, sind erst im Herbst importirt; sie werden voraussichtlich bis zum Sommer mindestens 6—10 Wedel und diese auch von grösserer Länge bringen. Ausserdem besitze ich noch eine Anzahl Stämme von 1—5 Fuss Höhe, unter denen sich noch manches Gute entwickeln wird.

Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Durch die Zusammenstellung dieser so nahe verwandten Familien glaube ich den Freunden derselben einen Dienst zu erweisen. Sie blühen leicht und sind eben so leicht zu cultiviren; der noch Unkundige wird aber, wenn er auch nur eine davon kennt, in seiner Wahl sich nicht irren, da sie die nobelsten und dankbarsten Sommerflorblumen sind. Die blassen und fast schmuzigfarbenen habe ich alle ausgeschieden, und nur die wirklich schön blühenden in dieses Verzeichniss aufgenommen.

Achimenes.

(Im weitesten Sinne.)

Sie bedürfen kaum einer Anpreisung, da sie schon selbst im kleinsten Gärtchen Eingang finden.

Rthlr. ngr.

3. Diastema gloxiniaeflora *Rgl.* (Achim. gloxiniaefl. *Forkel*) — 5-10
4. Guthnickia mimuliflora *Rgl.* (A. atrosanguinea *hort.*). . — 1
5. Locheria hirsuta *Rgl.* (Achimenes hirsuta *Lindl.*) . . — 1
6. — pedunculata *Rgl.* (Achimenes pedunculata *Benth.*) — 1
7. Niphaea oblonga *Lindl.* (Achimenes alba *hort.*) . . . — 1
8. — rubida *Lindl.* . . . . . . — 5
1. Scheeria mexicana *Sm.* (Achimenes Chirita *V. Htte.*, Mandirola Seemannia *Lem.*) . — 1

Ist eine der schönsten, dankbarsten Achimenen; sie treibt einen gedrungenen Stengel, verästelt sich zu einer gut geformten Pyramide, aus der köstliche dunkelblaue grosse Glocken denen der Gloxinien ähnlich treiben.

10. Trevirania coccinea *W.* (Achimenes *Pers.*) . . . . . — 1
11. — grandiflora *Schiede* (Achimenes *D. C.*) . . . . . — 1
12. — longiflora *Rgl.* (Ach. *D. C.*) — 1

Rℓ. ngr.

9. Trevirania picta *Dcsne*. (Achimen. picta *Benth.*) . . . — 1

Varietäten und Hybriden.

71. Jauregia alba grandiflora . — 5
73. gesneriaeflora . . . . . . — 10
68. Locheria Ottonis (hybrida?) — 2
— magnifica . . . . . . — 10
69. — Skinneri grandifl. (hybr.?) — 2
Mandirola Roezlii *v. Houtte* . 2 —
70. — picturata (Achim.) . . — 10

Die Blumen sind in Form der multiflora gleich; die Färbung ist eine neue eigenthümliche und wird allgemein gerühmt.

66. Trevirania Ambroise Verschaff. *Rgl.* . . . . — 5

Weisser Grund, bläulich angehaucht, mit köstlich dunkel violetten strahlenförmigen Adern.

Trevirania C. Bouché *Rgl.* . — 5

à Stück 1 Ngr., 12 Stück 10 Ngr.

13. Trevirania amabilis *Rgl.*
15. — Baumanni fulgens *Rgl.*
16. — — hirsuta *Rgl.*
17. — — lilacina *Rgl.*
18. — — oculata.
20. — Böckmanni *Rgl.*
21. — — coerulea *Rgl.*
22. — — hirsuta *Rgl.*
23. — Boothii *Rgl.*
24. — — variegata *Rgl.*
25. — — violacea *Rgl.*
26. — Camille Brozzoni *Rgl.*
27. — Carl Wohlfahrt *Rgl.*
29. — coccinea excelsa.
30. — — rosea Beatoni *Rgl.*
31. — — — formosa *Rgl.*
32. — — — pulchella.
35. — Escheri *Rgl.*
36. — — angustifolia *Rgl.*
76. — — picta elegans.
77. — — sanguinea.
40. — Geitneri *Ranniger jr.*
41. — Heerii *Rgl.*
42. — Hillii
43. — ignea *V. Houtte.*
44. — Liebmanni *h. Belg.*
45. — lilacina *Rgl.*
46. — longiflora alba *V. Houtte.* (Jauregia *Warsz.*).
47. — — candida.
48. — — ilicifolia *V. H.*
49. — — latifolia.
50. — Louis van Houtte *Rgl.*

Rℓ. ngr.

51. Trevirania Mackoy *Rgl.*
53. — Mme. de Parpart *Rgl.*
55. — — Rendatler *Rgl.*
56. — Margaretha.
57. — Napoleon Rossi *Rgl.*
58. — patens *Benth.*
61. — punctata *Rgl.*
62. — purpureo-violacea *Rgl.*
63. — sanguinea *Rgl.*
64. — Sir Treherne Thomas *Rgl.*
67. — Wageneri *Rgl.*

Aeschinanthus albidus *A. Dec.* . — 10
— atrosanguineus *Van Houtte* — 7
— Boschianus *de Vriese.* . . — 5
— Devonianus *hort.* . . . . . — 10
— floribundus. . . . . . — 10
— gracilis *hort.* . . . . . . — 10
— grandiflorus *Spr.* (parasiticus *Roxb.* ramosissimus *Wall.*) — 5
— Horsfieldii *R. Br.* . . . — 5
— hybridus splendidus . . . — 10
— Lobbianus *Hook.* . . . . . — 10
— longiflorus *Blume.* . . . . — 3
— maculatus *D. C.* (ramosissimus *Lindl.*) . . . . . . — 10
— Paxtoni *hort.*. . . . . . . — 8
— Roxburghii *Wall.* . . . . . — 10
— speciosus . . . . — 10

Sämmtliche Aeschinanthus in Moos gepflanzt, werden oft und schön blühen.

Alloplectus chrysanthus *Pl.* et *Lind.* — 10
— dichrous *D. C.* (Columnea zebrina *hort.*) . . . . . — 5
— Pinelianus *Ch. Lem.* . . . — 5
†Alloplectus Schlimmii *Pl.* et *Lind.* — 15
— sparsiflorus *Mart.* . . . — 5
† — speciosus *Hook.* (stark) . . — 10
Alsobia rubriflora *Hanst.* . . . 3 —

Eine neue höchst originelle schöne Pflanze, welche grosse feinbehaarte Blätter und eine $1^{1}/_{2}''$ lange Blumenkrone hat. Blüthe weiss mit köstlich violett purpurnem Schlunde. Stengel und Blattstiele sind sehr stark behaart, fast filzig, grün, grau und braun nüancirt. Ich führte dieselbe aus Columbien ein.

Besleria campanulata *Lind.* . . — 5-10
Capanea grandiflora *Dcsne.* . . — 10
Centrosolenia monoctenia *Schldl.* 1 —
Chirita sinensis *Lindl.* . . . . — 5
— — fol. var. . . . . . . — 5
Columnea bimaculata *Warsz.* . — 10
— crassifolia . . . . — 15
— Schiedeana *Schldl.* (Lindeniana) . . . . — 10

		Rthl.	ngr.
Columnea splendens *Paxt.* (Nematanthus Guilleminianus *h. belg.* C. grandiflora *hort.*		—	10
Drymonia cristata *Miq.*		—	10
— punctata *Lindl.* (Alsobia *Hanst.*)		—	10
Episcea bicolor *Hook.* (Physodeira *Hanst.*)		—	10
— melittifolia *Mart.* (Skiophila *Hanst.*)		—	10
Gesneria Cooperii *Paxt*	k	1	—
— discolor *Lindl.* (polyantha *D. C.*)	k	—	20
— Donckelaarii *Ch. Lem.*	k	2/3-1	—

Dunkelbrauner Blüthenschaft und Kelch, aus dem grosse feurig rothe Glocken nach allen Seiten entsteigen. Köstlich!

		Rthl.	ngr.
Gesneria elliptica *Dcsne.* β. lutea	k	—	15
— fulgens	k	1	—
— Gardneriana *Hook.*		—	10
— Geroldiana *K. et B.*	k	—	5
— lateritia	k	—	10
† — Leopoldii *Scheidw.*	k	1	5
— magnifica *Loud.*	k	—	5
— mollis *H. B. K.*	k	—	5
— paluriensis *hort.*	k	1	—
— picta		—	10
— pubescens	k	—	20
— rutila *Dcne.*	k	—	15
— spec. nova.	k	—	—
— tubiflora *Cav.*	k	—	5

Gloxinien.

(Im weitesten Sinne.)

à Stück 5 Ngr., à Dtzd. 1⅔ Thlr.

1. Gloxinia gesnerioides *Ch. L.*
2. — hirsuta *Lindl.* (Stenogastra *Hnst.*)
3. — maculata *L'Her.* (Salisia gloxiniaeflora *Rgl.*)
4. — suaveolens *Dcsn.* (Salisia *Rgl.*)

Varietäten und Hybriden.

63. atrosanguinea.
5. Bavaria.
64. Brunnowi.
6. Cartonii *Bot. Reg.*
7. caulescens major *Lindl.*
8. — superba.
65. cerina.
9. Comtesse Clamm Gallas *Josst.*
66. — Leopoldine Thun *Josst.*
10. — Therese Thun. *Josst.*
11. Dr. Gardner *V. Houtte.*
12. Duc d'Isly *V. Houtte.*
67. Duchesse de Leuchtenberg.
13. Fréderic Lenning *V. Houtte.*
14. General Bautrand *V. Houtte.*
15. Goodii.
16. Graf v. Neipperg.
17. Herzog George.
18. Josstii.
68. labiata.
49. Leonie *V. Houtte.*
20. Lowii (Alcdelli).
50. M. Borsig.
19. Madame Aglaë Adanson.
21. — de Genlis *V. Houtte.*
22. Madame de Staël *V. Houtte.*
23. Mademoiselle de Sombreuil.
24. Maria van Houtte *V. Houtte.*
25. maxima.
69. Mendelson Bartholdy.
26. Menziesii coerulea.
Merkii.
27. monstrosa *Lartey.*
23. Napoleon *V. Houtte.*
70. Passinghami.
29. P, G. Hoogeven.
30. praeexcellentissima.
71. Prince Camille de Rohan *Josst.*
72. Princesse Helene.
73. Pristleyana.
30. Professor Pallador.
31. pulcherrima.
74. pyramidalis multiflora.
32. Richteri.
33. rosea superba.
34. — grandiflora.
36. rubra grandiflora.
35. Saxonia.
38. Stanleyana.
39. Teichlerii.
37. Teutonia.
40. tricolor.
41. virginalis.
42. Wendlandii.

Gloxinien mit aufrechtstehenden Blumen.

Es ist erstaunlich, was man in der Hybridisation der Gloxinien erzeugte; so-

Thl. ngr.

wohl die aufrechtstehenden als nachstehende Auslese sind eine ausgezeichnete Zugabe zum vorstehenden auserlesenen Sortiment, wovon 1 Stück 10 Ngr., 12 Stück 3 Thlr., notire.

43. adamas oculata *Haake.*
44. alba auriculata *Haake.*
75. Gustav Geitner *Ranniger j.*
76. Gustav Schmidt.
45. Hauptmann Wuthe *Haake.*
46. Mars coerulea *Haake.*
47. Rex igneus *Haake.*
48. stellata *Haake.*
51. grandis.
52. lineata.
53. marmorea.
78. Petronella.
79. Sidonie.
80. Therese Müller.
81. Thuringia.
82. Violetta.

Neuere.

54. Agar.
55. Don Pedro.
56. Dr. Reichenbach.
57. Duc d'Oporto.
58. Etna.
59. Madame Lègrelle d'Hanis.
60. Majestica.
61. Novelty.
62. Princesse Marie.

Houttea pardina *Dcsne.* . . . . — 5
Hypocyrta gracilis *Mart.* . . . . — 15
Isoloma hondensis *Dcsne.* var. Wagenerii *Regel.* . . . . k — 5
— hybr. Decaisneana . . k — 5
— picta *Benth.* (Gesneria *Hook.*) . . . . k — 10
— Trianaei *hort.* . . . . . . — 10
Klugia Notoniana *D. C.* (zeylanica) — 5

Bei irgend sorgfältiger Behandlung wird man bald grosse Büsche, bedeckt mit köstlich blauen und weissen Blumen erzielen.

Moussonia elegans *Dcsne.* . . . — 5
Naegelia zebrina *Rgl.* (Gesneria *Paxt.*) . . . . k — 5

Thl. ngr.

Naegelia zebrina grandiflora . k — 5
— — splendens . . . k — 10
Rhytidophyllum floribundum *Ch. Lem.* (Ophianthe libanensis *Hnst.*) . . . . — 10
Sciadocalyx Warszewiczii *Rgl.* . — 10
Seemannia ternifolia *Rgl.* . . . — 10
Sinningia guttata *N. E.* . . . . . — 5
— Helleri *N. E.* . . . . . . — 5
Streptocarpus polyanthus *Hook.* . 1 —

Eine höchst originelle Pflanze, bringt meist nur ein Blatt, welches sich über den Topf herunterhängt und diesen ganz verdeckt, denn es wird oft 12 Zoll lang und 6 Zoll breit.

Tydaea amabilis *Pl.* et *Lind.* . . — 10
— elegans *Pl.* et *Lind.* . . . . — 10
— gigantea *van Houtte.* . . — 10
— — hybrida formosissima *M. Schmöger* . . . . . — 10
— — — G. Geitner *M. Schm.* — 10
— — — General v. Zweibrücken *M. Schm.* . . . . — 10
— — — Gräfin Wally von Rechberg *M. Schm.* . . . — 10
— — — M. Schmöger *Geitn.* — 10
— — — Profess. C. Seitz *M. Schm.* . . . . — 10
— — — puncticulata *M. Schm.* . . . . — 10
— hybrida argentea *Ortg.* . . — 10
— — chloroneura *Ortg.* . . — 10
— — Lennéana rutilans *Ortg.* — 10
— — — viridis *Ortg.* . . — 10
— — Regelii argentea *Ortg* — 10
— — — erythrichina *Ortg.* — 10
— — — obscura *Ortg.* . — 10
— — Rossiana lucida *Ortg.* — 10
— Warscewiczii *Rgl.* . . . — 10

Diese Tydaea sind prächtige Erscheinungen der Neuzeit. Die Hybriden von gigantea von Herrn Max Schmöger erzogen, blühen brillant. Die andern Hybriden vereinigen mit ihrem Blüthenschmuck interessante Blattzeichnungen und sind für jede Sammlung zu empfehlen und gedeihen herrlich in Zimmern. T. amabilis ist ein allerliebstes Blümchen mit dunkeln Punkten auf tiefrosafarbenem Grunde.

Melastomeen.

Eine jede Pflanzenfamilie hat ihr Eignes und Schönes: so auch die Melastomeen — sie sind vorzüglich interessante Blattpflanzen, grösstentheils geschmückt mit herrlichen Blüthen. Das Eigenthümliche derselben ist die originelle Nervatur der Blätter, indem einige Blattrippen an der Basis sich bogenförmig von der Mittelrippe entfernen, um an der Spitze sich wieder zu vereinigen. Die Rippen sind verbunden mit parallel laufenden Nerven, was ihnen das höchst originelle Ansehen

giebt, oft sind auch die Blattfärbungen köstlich wie bei Eriocnema und Sonerilla, welche beide Arten in einer feuchtwarmen geschlossenen Luft cultivirt werden müssen. Die andern gehören entweder fürs Kalthaus oder bedürfen nur geringer Wärme. Im Sommer lässt man sie im Freien stehen, dann blühen die meisten um so dankbarer im Winter.

	Rb.	ngr.
Calyptraria haemantha *Pl.* et *Lind.*	3	—

Schon ihr schöner Habitus rechtfertigt das Lob, was ihr gespendet wurde; sie gehört ins Kalthaus.

Centradenia floribunda *Planch.*	—	8
— rosea *Lindl.*	—	5

Man sagt nicht zu viel, wenn man sie die dankbarsten Blüher nennt; hat man dieselben im Sommer im Hause oder warmen Kasten zu kräftigen Pflanzen gebildet und ihnen im Winter einen Standort nahe am Glase gegeben, gewiss erfreuen sie im zeitigsten Frühjahr mit einer Fülle von Blumen vom schönsten Rosa. Bei letzterer haben die jungen Stengel und die Rückseite der Blätter die schönste purpurne Färbung.

Chaetogastra Geitneriana *Schldl.*	—	10

Diese von mir eingeführte Art blüht im Herbste dankbar im Warmhause mit zollgrossen rosafarbenen Blumen.

Eriocnema aenea *Naud.* (Bertolonia *D. C.*)	—	20
— marmorea *Naud.* (B. maculata *D. C.*)	1	—

Letztere vorzüglich, ist eine unserer schönsten Blattpflanzen. Auf atlasschimmernder Oberfläche der Blätter von bräunlichem Grün, weiss marmorirt! Die Rückseite des Blattes ist vom köstlichsten Rosa überhaucht.

	Rb.	ngr.
Heterodon macrodum?	1	—
Heterocentrum roseum	—	10
Lasiandra Hooybrenkii	1	—
— petiolata *Grah.*	—	10

Oeffnet schon im Spätherbst ihre schön dunkelvioletten Blüthen.

Medinilla magnifica *Lindl.*	1	15

Ist wohl die Königin der Familie zu nennen; denn nicht nur ihr graciöser Wuchs, sondern ihre herrliche Blüthentraube von 1 Fuss Länge macht sie werth, überall cultivirt zu werden.

Melastoma coeruleum *h.* (Pleroma)	—	10
— cymosum *Wendl.*	—	20
Micranthella lanceolata *Naud.* (Chaetogastra)	—	10

Wurde ebenfalls von mir neuerdings wieder eingeführt, dieselbe blüht vom November bis April in endständigen Trauben, Blumen weiss, 1 Zoll gross. Sehr empfehlenswerth. Siehe die Berliner Gartenzeitung. 1857.

Pleroma Benthamianum *Lindl.*	—	10
— heteromallum *Don.*	—	20
Rhexia elegans *h.* (Heterocentrum)	—	10
Sonerilla margaritacea *Naud.*	1	—

Auf dunkelgrünem Grunde regelmässige weisse, runde Punkte verleihen den Blättern das Ansehen als seien sie bemalt.

Ich besitze noch eine Anzahl verschiedener Arten, die ich aus Columbien einführte, und sämmtlich noch unbestimmt sind. Einige kostbare Acquisitionen sind dabei, interessante Blattfärbungen und grosse Blattformen. Sobald dieselben geblüht haben und bestimmt sind, werde ich ein Weiteres darüber bekannt machen.

Orchideen.

Die Orchideen bilden offenkundig den Gegensatz zu den Farrn; denn was ihnen, mit einziger Ausnahme der brillanten Anoecochilus und Goodyera, die Natur an Blätterschmuck entzog, das ist in überschwenglichem Maasse auf deren Blüthen gefallen, die nicht nur den Farbenreichthum und die Pracht der Schöpfung bekunden, sondern auch durch die verschiedensten Stellungen, bald hängend, bald emporsteigend, einzeln in gigantischer Grösse, oder zu Hunderten in langen Trauben imponiren; auch ausser dem Genusssinn noch dem Geiste reiche Nahrung durch ihre originellen tausendfältigen Formen geben, die bald einem mit Beute beladenen Adler, bald den brillantesten Schmetterlingen und andern Insecten gleichend, der Phantasie unendlichen Spielraum lassen, und einen bezaubernden, geheimnissvollen Reiz auf jeden Beschauer ausüben. Fragen wir uns: warum finden wir sie noch so selten? so liegt die Antwort nicht fern. Man glaubt, ihre Cultur biete unübersteigliche Schwierigkeiten, es bedürfe besonderer Häuser u. dergl. mehr, was ich wohl für grössere Sammlungen, wie auch für einige Gattungen zugebe, aber keineswegs für die hier mit einem † bezeichneten, welche sich in jedem Warmhäuschen leicht und dankbar cultiviren lassen. Ja dass man selbst im Zimmer ausgezeichnete Resultate erzielen könne, möge nachstehendes Factum beweisen. Mein Schwager Herr Georg von Grossmann in Schneeberg im Erzgebirge, also im rauhen Gebirge, ist ein besonderer Verehrer tropischer Pflanzen, vor Allem aber der Orchideen. Dass er kein Glashaus hat, hielt ihn nicht ab, längst schon Zimmet, Caffee, Dionaeen etc. im Zimmer zu cultiviren — endlich gab er mir auch nach, mit einem Oncidium Papilio, nur auf Torf geheftet, sein Heil zu versuchen. Schon hatte er einen Blüthenstiel von über 2 Fuss Länge erzielt — als leider eines Morgens die Pflanze mit

bis zur Hälfte abgebrochenem Stiel im Zimmer lag. Doch als ich ihm die Möglichkeit verhiess, aus dem Ueberbleibsel könne sich ein neuer Blüthenstiel entwickeln, — da cultivirte er mit neuem Eifer und konnte zu seiner und vieler Anderer Freude noch vergangenen Herbst seinen Schmetterling sich auspuppen sehen. Um wie viel leichter mag es also sein, ohne Unfall, im noch so bescheidenen Warmhäuschen, solche Resultate zu erzielen?

100 Stück Torf (von deren Brauchbarkeit zur Cultur der Orchideen ich mich immer mehr überzeuge) incl. Kiste — bin ich nach wie vor bereit, meinen werthen Correspondenten für 1 Thlr. zu berechnen.

	Thlr.	ngr.
Acanthophippium bicolor *Lindl.* Ceylon	2	—
Acineta Humboldtii *Lindl.* (Peristeria) Venez.	3	—
— purpurea *Rchb. fil.* Venez.	3	—
— Warszewiczii *Ldl.* Neugranada	10	—
†Acropera Batemanni *hort.* (Gongora *hort.*)	1	—
† — Loddigesii *Lindl.* Mexico. (Gongora galeata *Rchb. fil.*)	1/2-1	—
† — — concolor *Lindl.* Mex.	1	—
† — — fuscata *Lindl* Mex.	1	—
† — — purpurea Mex.	1	—
† — spec. Mex.	1	—
Aerides odoratum *Lour.* (coronatum *Roxb.*) Ostind.	8	—
— suaveolens *Bl.* Java.	30-40	—
Anguloa Clowesii *Lindl.* Merida.	6	—
— Ruckerii *Lindl.* Merida.	8	—
Anisopetalum Careyanum *Hook.* — Nepal.	1-2	—
†Anoecochilus argenteus *hort.* Brasilien	1-2	—
— intermedius *hort.*	5	—
† — pictus *Lindl.* Brasilien	1	15
— setaceus *Bl.* Java	4-6	—
— vittatus *Lindl.* (A. striatus *hort.*) Borneo	8	—
— xanthophyllus *Bl.* Java (Roxb.)	4-6	—
Barkeria melanocaulon *A. Rich.* et *G.* Mexico	6	—
— Skinneri *Lindl.* Guatemala	4	—
— spectabilis *Lindl.* (Epidendron Skinneri *Bat.*) Guatem.	6	—
†Bifrenaria atropurpurea *Lodd.* Brasilien	1	15
— aureo-fulva *Ldl.*	1	15
†Bletia floribunda *R. Br.* Westind.	1	—
† — hyacinthina *R. Br.* (Bletilla *Rchb. fil.*) China	—	15
† — Tankervillae *R. Br.* (Phajus grandifolius *Lour.* Limodorum Tankervillae *Ait.*) China	—	15
† — Woodfordii *Hook.* (Phajus maculatus *Lindl.*) Ostind.	2	—
Bonatea speciosa *Willd.*	5	—
Brassavola Digbyana *Lindl.* Honduras	—	—
— glauca *Ldl.* Mexico	2	—
Brassia caudata *R. Br.* Jamaika	1	15
— Keiliana *Rchb. fil.* (cinnamomea *Lind.*)	3	—
— verrucosa *Ldl.* (Cowani *hort.*)	2	—
Burlingtonia candida *Lindl.* (Rodriguezia candida *Bat.*) Demerara	10	—
— venusta *Lindl.* (Rodr. venusta *Rchb. fil.*) Brasilien	8	—
— rigida *Lindl.* (Rodr. rigida *Rchb. fil.*) Brasilien	2	—
Calopogon pulchellus *RBr.* Nord-Amerika	—	15
Catasetum atratum *Ldl.* Brasil.	10	—
— globiflorum	5	—
— floribundum *Hook.* var. grandiflorum. Brasilien	4	—
— Naso *Lindl.* Caracas	6	—
— Russelianum *Lindl.* Guatem.	2	—
— semiapertum *Hook.* Brasil.	—	—
— tridentatum var. sepalis latioribus labello flavo *Kl.*)	5	—
†Cattleya bicolor *Lindl.* Brasil.	8	—
† — citrina *Lindl.* Mexico	8	—
† — crispa *Ldl.* (Laelia crispa *Rchb. fil.*) Brasilien	4	—
† — Forbesii *Ldl.* Brasilien	1	15
† — granulosa *Ldl.* Guatemala	5	—
† — labiata *Ldl.* Brasilien	5	—
— — Mossiae *Ldl.* Venez.	3	—
† — Loddigesii *Ldl.* Brasilien	6	—
— Pinellii *hort.* (Laelia pumila *Rchb. fil.*) Brasilien	8	—
† — Skinneri *Bat.* (Guatem.)	4	—
— Youngii	8	—
Cheirostylis marmorata *Lind.* (Dossinia *Moor.*, Anoecochilus *Lowii.*) Indische Archipel	4-6	—
Chysis bractescens *Ldl.* Mexico	6	—
†Cirrhaea fusco-lutea *Hook.* (saccata *Lindl.*) Brasilien	—	15
† — viridi-purpurea *Lodd.* Bras.	1	—
Coelia macrostachya *Ldl.* Guatem.	2	—

	Thlr.	ngr.
Coelogyne fimbriata *Lindl.* China	2	—
Comparettia falcata *Poepp.* et *Endl.* Venezuela	6	—
Coryanthes eximia *hort.* Brasilien	8	—
— maculata Barkerii . . .	6	—
Cyclosia maculata *Kl.* (Mormodes pardina *Hook.* Coryanthes *Ldl.*) Oaxaca	8	—
— — concolor (Mormodes pard. var. unicolor). Mexico	6	—
— spec.	6	—
†Cypripedium barbatum *Ldl.* Mont Ophyr.	2	15
† — insigne *Wall.* Silhet . . .	—	20
— purpuratum *Ldl.* Java . .	2	—
— spec. e Java	5	—
† — venustum *Wall.* Silhet . .	1	15
Cyrtochilum filipes *hort.* . . .	4	—
— flavescens *Ldl.* (Miltonia flavescens) Mexico	1	—
— leucochilum *Planch.* (Oncidium *Bat.* Guatemala . .	2	—
— stellatum *Ldl.* (Miltonia flavescens *Ldl.*.) Brasilien .	1	—
Cyrtopodium punctatum *Ldl.* Bras. Starke Originalknollen.	4	—
— Wilmorei *Kn.* sehr stark. Demerara	2	—
— spec. nova. Venezuela . .	5	—
†Cymbidium aloifol. *Sw.* China	—	20
† — crassifolium *Wall.* Ostindien	1	—
† — ensifolium *Sw.* China . .	—	20
† — sinense *Willd.* China .	—	15
— triste *Willd.* (Epid. teres *Thunb.* E. triste *Forst.* Louisia teretif. *Gaud.* = trichorrhiza *Hook.*)	1	—
† — xiphiifolium *Ldl.* China .	—	15
Dendrobium aggregatum *Roxb.* Ostindien	3	—
— aureum *Ldl.* Ceylon . . .	4	—
— clavatum *Wall.* (Stachyobium) Ostindien	4	—
— cupreum *Herb.* Ostindien .	3	—
— Dalhousianum *Paxt.* Ostind.	14	—
— Devonianum *Paxt.* Ostind.	8	—
— fimbriatum *Wall.* Ostind.	2	—
— Henshallii *Ldl.* Java . .	10	—
— humile	1	—
— Kingianum *Bidw.* Ostindien	10	—
— macranthum *A. Rich.* (macrophyllum *Ldl.*) Manilla .	5	—
— moniliforme *Sw.* Ostindien	3	—

	Thlr.	ngr.
Dendrobium moschat. *Wall.* (Cymb. *Willd.* Epd. *Ham.* Stachyob. *Lindl.* Dendr. Calceolus *Wall.* Dendr. cupreum *Hort.* Dendr. Calceolaria *Hook.*) . . .	4	—
— nobile *Lindl.* China . . .	2	—
— Paxtoni *Ldl.* Ostindien . .	6	—
— Pierardii *Roxb.* (cucullatum *R. Br.*) Ostindien . . .	1	15
— pulchellum *Roxb.* (buxifolium) Silhet	1	—
— pumilum *hort.* Sierra Leona.	1	15
— sanguinolentum *Ldl.* Ceylon	6	—
— secundum *Wall.*	5	—
— spec. de Cuba II.	—	—
† — speciosum *Sm.* Neuholl. .	5	—
— squalens *hort.*	4	—
— tortile *h. Belg.* Ostindien .	8	—
Disa grandiflora *L.* (uniflora *Berg.* Satyrium grandiflor. *Thbg.*) Cap.	20-30	—
†Epidendrum adenocarpum *La Llav.* Mexico	5	—
† — aurantiacum *Bat.* Guat. .	3	—
† — ciliare *L.* Westindien . .	1	—
† — — var. major *hort.* Westindien	1	—
† — cinnabarinum *Salz.* Pernambuco	1	—
† — cochleatum *Ldl.* Jam. . .	½-1	—
† — — majus. Mexico. .	1	—
— cochlidium *Ldl.* (pulcherrimum *Kl.*) Columb.	3	—
Von diesem köstlichen E. besitze ich grosse Originalbüsche von 10—20 Thlr.		
† — elongatum *Jacq.* Neugrand.	—	20
— heterodatum *Rchb. fil.* Columbia	5	—
† — macrochilum roseum *Hook.* Guatemala.	4	—
— nocturnum *Jacq.*	2	—
† — nutans *Sw.* Westindien . .	2	—
† — phoeniceum *Ldl.* (vanillosmum *Ch. Lem.*) Cuba . .	4	—
† — selligerum *Bat.* Guat. . .	1	15
— spec. e Cuba	—	—
— — e Mexico	—	—
— — e Venezuela	1	—
— sphaerobulbon Guat. ? . .	2	—
— Stamfordianum *Bat.* (Psilanth.) Guatemala . . .	4	—
† — tigrinum *Ldl.* (coriaceum) Neugranada	3	—

	Fl.	ngr.
Epidendron tovarense *Rchb. fil.* Venez.	10	—
Eria floribunda *Ldl.* Singapore	1	—
† — stellata *Lindl.* Ostindien	—	15
†Eulophia streptopetala *Ldl.* Cap	3	—
Gomeza planifolia *Kltzsch.* et *Rchb. fil.* Columb.	4	—
†Gongora atropurpurea *Hook.* Demerara	1	15
† — — major *hort.*	1	15
† — bufonia *Ldl.* Brasilien	1	20
† — leucochila *Ch. L.* Chiapas	2	—
† — maculata *Ldl.* Guyana	1	15
† — — alba Guyana	1	15
† — — blanda *Rchb. fil.* Col. (tricolor)	1-3	—
† — — pallida Guayana	1	15
— — quinquenensis *Ruiz. Pav.*	2-4	—
— — — var. Hookeriana *Kl.*	3	—
— — — erythrorrhachis *Kl.*	2	—
† — odoratissima *Ch. Lem.* Col.	1	15
†Goodyera discolor *Ker.* (Haemaria *Ldl.*) Brasilien	1/3-2	—
— procera *Hook.* Nepal	2	—
† — pubescens. Brasilien.	2	—
Grobia Amherstiae *Lindl.* Brasilien	4	—
Houlletia Brocklehurstiana *Lindl.* Brasilien	6	—
— vittata *Ldl.* Guyana.	8	—
Huntleya marginata *Ldl.* (Warscew. marginata *Rchb. fil.*) Neugranada	8	—
Laelia acuminata *Lind.* Neugran.	4	—
— anceps *Ldl.* Mexico	2	15
— — superba	4	—
— aurantiaca *hort.* Mexico	5	—
— spec.	2	—
— superbiens *Ldl.* Guatemala	8	—
Leptotes bicolor *Ldl.* Brasil.	2	—
Lockhartia parthenocomos *Rchb. fil.* var. purpurata. Caracas	3	—
†Lycaste biseriata (brevispatha *Kl.*) Columbien	5	—
† — Deppei *Ldl.* Mexico	1	—
† — — varietas	2	—
— gigantea *Ldl.* (Heyndericksii) Caracas	2-4	—
† — macrophylla *Ldl.* Columb.	2	—
† — picturata	8	—
† — Skinneri *Ldl.* Guatemala	5	—
† — — latimaculata	5	—
Masdevallia fenestrata *Ldl.* Bras.	1	—
†Maxillaria aromatica *Hook.* (Lycaste *Ldl.*) Mexico	1/2-1	—
† — atro-rubens. Südamerika	1	—
† — Barringtoniae *Lodd.* Westindien	2	—
† — Colleyi *Bat.* Mexico	1	—
† — foveata *Ldl.* (Xylobium) Vnz.	1	—
— guareimensis var. purpurea vinosa *Rchb. fil.* Columb.	2-4	—
† — Harrisoniae *Ldl.* (Bifrenaria Harr. *Rchb. fil.*) Brasilien	1	10
† — leucochila *Hffg.* Guatemala	1	—
— pallidiflora *Hook.*	2	—
† — Parkerii *Hook.* Demerara	1	—
† — picta *Hook.* Brasilien	1	—
— — concolor (M. porrecta *h.*)	2	—
† — Rollisoni *Ldl.* (Promenaea *Ldl.*) Brasilien	2	—
— stapelioides *Ldl.* (Promenaea *Ldl.*) Brasilien.	1	15
† — tetragona *Ldl.* Brasilien	1	15
† — triangularis	2	—
† — variabilis *Bat.* var. unipunctata *Ldl.* Vera Cruz	1	—
† — Wageneriana *Rchb. fil.* (Xylobium) Venezuela	2	—
— Warreana *Lodd.* (Warrea tricolor *Ldl.*) Brasilien	3	—
Megaclinium falcatum *Ldl.* Sierra Leona	—	15
†Miltonia candida *Ldl.* Brasilien	8	—
— Clowesiana *Ldl.* Brasilien	6	—
† — spectabilis *Ldl.* Brasilien	5	—
Mormodes speciosum	5	—
Myanthus barbatus *Ldl.* Demer.	5	—
— sanguineus	5	—
— spinosus *Hook.* Brasilien	10	—
†Neottia speciosa *Jacq.* (Stenorrhynchus speciosus *Rich.*) Columbien	2	—
Octomeria graminifolia *R. Br.* Antillen	1	—
†Odontoglossum citrosmum *Ldl.* Mexico	2	20
† — grande *Ldl.* Guatem.	2	20
† — Insleayi *Lindl.* Mexico	5	—
† — pulchellum *Bat.* Guatem.	3	—
— — grandiflorum. Guatem.	4	—
— volubile *hort.* Venezuela	4	—
— Wageneri	—	—
Oncidium altissimum *Sw.* Jam.	1	15
— ampliatum majus *Ldl.* Guatemala	1½-3	—

	Rℓ.	ngr.
Oncidium Baueri *Ldl.* Panama .	1	10
— bicallosum *Lindl.* (bicornutum *Hook.* pubens *Lindl.* Miltoniastrum) Guatem. . .	3	—
— Boolhianum *Rchb. fil.* Ven.	10	—
— Caminisphorum *Rchb. f.* Venezuela	6	—
— carthagenense *Sw.* Westind.	1	10
— Cavendishianum *Bat.* (pachyphyllum *Hook.*) Mexico	3	—
— Cebolleta *Sw.* (juncifolium *Ldl.*) Columbien	1	—
† — ciliatum *Ldl.* Brasil. . .	4	—
† — divaricatum *Ldl.* Brasil. .	2	10
† — flexuosum *Sims.* Brasil. .	1	15
— Lanceanum *Ldl.* Guyana .	8	—
— — elegans	4	—
— luridum *Ldl.* Jamaika . .	4	—
— — guttatum (roseum) Jamaika	4	—
† — Papilio *Ldl.* Venezuela .	2-3	—
† — — var. major. *hort.* Venezuela	2-4	—
— pergamineum *Ldl.* Guatemala	5	—
† — Pinelianum *Rich.* (Batemannianum *Parm.*) Brasil. . .	2	—
† — sphacelatum *Ldl.* Mexico .	2	—
— unguiculatum *Ldl.* . . .	8	—
Ornithidium coccineum *Salisb.* Westindien	1	—
— Sophronitis *Rchb. fil.* Ven.	5	—
†Peristeria Barkerii *Bat.* (Acineta *Ldl.*) Mexico	3	—
— elata *Hook.* Columbia . .	2	—
— pendula *Hook.* Demerara .	3	—
Phalaenopsis amablis *Bl.* Philippin	35-50	—
† — grandiflora *Ldl.* Java . .	25-30	—
Pleione maculata *Ldl.* (Coelogyne maculata *Ldl.*) Ostindien .	—	—
— Wallichiana *Ldl.* (Coelogyne *Ldl.*) Bengalen	—	—
Ponera punctulata *Rchb. fil.* Ven.	1-2	—
Renanthera coccinea *Lour.* China	2-8	—
†Restrepia elegans *Karst.* (punctutulata *Ldl.* Merida . . .	3	—
† — vittata *Ldl.* Caracas. . .	2	—
Rodriguezia Barkeri *Hook.* (Gomeza) Brasilien	1	15
— macrostachya *Ldl.* Südam.	2	—
Saccolobium Blumei *Ldl.* . . .	12	—
†Sarcanthus teretifolius *Ldl.* China	2	—
Schomburgkia crispa *Ldl.* Demer.	3	—
— marginata *Ldl.* Surinam .	7	—

	Rℓ.	ngr.
Schomburgkia tibicinis *Ldl.* Mexico	5	—
† — undulata. Venezuela .	3-7	—
Scuticaria Stelii *Ldl.* (Maxillaria) Guyana	10	—
†Sobralia decora *Bat.* Guatem. .	4	—
— Galleotiana *Rich.* et *Galleoti* Neu-Granada	5	—
† — Liliastrum *Ldl.* Guyana .	2-5	—
† — macrantha *Ldl.* Mexico . .	2-4	—
— sessilis *Ldl.* Demerara . .	5	—
† — spec. de Moritz. Caracas .	6	—
Sophronitis grandiflora *Ldl.* Bras.	8	—
— isopetala *Hffg.* Brasilien .	4	—
†Stanhopea aurea *Lodd.* (Wardi *Lodd.* var.) Caracas . . .	3	—
† — Bucephalus *Ldl.* Ecuador .	4	—
† — Cavendishii *Ldl.* (Devoniensis *Ldl.*) Peru	3	—
† — eburnea *Ldl.* Südamerika .	1-2	—
† — grandiflora *Ldl.* Trinidad .	1	—
† — graveolens *Ldl.* Guatemala	3	—
† — guttulata *Ldl.* Guatemala .	3	—
† — insignis *Frost.* Brasilien .	1	—
† — — major. Brasilien . .	2	—
† — — speciosa Brasilien .	1	15
† — — punctatissima Bras.	2	—
† — Jenischiana *Rchb. fil.* . .	7	—
† — Martiana *Ldl.* Mexico . .	5	—
† — oculata *Ldl.* Mexico . . .	1-2	—
† — — Barkeriana	4	—
† — — hypochilio violaceo-purpureo	3	—
† — — pallida	1-2	—
† — — punctatissima . . .	3	—
† — pardina	6	—
† — quadricornis *Ldl.* Columbia	5	—
† — Ruckeri *Ldl.* Mexico. . .	3	—
† — tigrina *Bat.* Mexico . . .	2-4	—
† — — latimaculata *hort. V. Houtte* Mexico	3	—
† — — nigro-purpurea . .	5	—
† — — superba *h. Belg.* Mex.	3	—
† — saccata *Bat.* Guatem. . .	2	—
† — Wardii *Lodd.* Caracas . .	1-3	—
Thunia alba *Rchb. fil.* (Phajus *Ldl.*) Ostindien	2	—
Trichopilia albida *Wendl.* Venez.	4	—
— candida	5	—
— coccinea *Warsz.* (marginata *Henfrey*) Columbien . . .	8	—
— tortilis *Ldl.* Mexico . . .	1	15
Trigonidium ringens	5	—
Uropedium Lindeni *Ldl.* Col. .	20-30	—

Durchgewurzelte Originalpflanzen.

	Thl.	ngr.
Vanda coerulea *Griff.* Silhet	20	—
— concolor *Blume*	—	—
— teres *Ldl.* Ostindien	6	—
Vanilla guianensis *Splitg.* Guyana	1	—
† — planifolia *Andr.* Mex.	½-1	—
Warrea cyanea *Ldl.* Caracas	2	15
Xylobium squalens *Ldl.* Brasilien	1	—
†Zygopetalum crinitum *Lodd.* Bras.	1	10
† — — coeruleum. Brasilien	3	—
†Zygopetalum intermedium *Lodd.* Brasil.	1	20
† — Makayi *Hook.* Brasilien	1	20
† — — striatum	2-5	—
† — maxillare *Lodd.* Brasilien	3	—
† — — majus	5	—
† — stenochilum *Lodd.* Brasilien	2	—
† — velutinum *Hffg.* Brasilien	3	—

Palmae, Cycadeae, Pandaneae et Cyclantheae.

Selbst wer sie nicht gesehen, diese Königinnen der Pflanzenwelt, der hat vom Ruhme ihrer Schönheit und Nutzbarkeit — wenigstens gelesen. Sie sind in ihrem Vaterlande das Zeichen der Freude — des Sieges — des Friedens — aber auch die Universalquelle alles Nützlichen, denn sie liefern oft ganzen Volksstämmen Kleidung, Wohnung, Speise, Trank, Fahrzeuge, Waffen, kurz Alles, was sie zu ihrer Existenz bedürfen, und bilden somit den würdigsten Vorläufer zur nächsten Gruppe. Bei der verschiedensten Benennung, welche für gleiche Arten in verschiedenen Gärten gebraucht wird, legte ich bei deren Bearbeitung den Index Palmarum von Wendland zu Grunde, wonach die Namen der Gärten angeführt werden, in welchen der vorgestellte Name unter einem anderen geführt wird.

	Höhe Fuss	Wedelzahl	Preis Thl.
Acrocomia sclerocarpa *Mart.* (Geonoma Pohleana *h. v. Houtte.*)	7	4	40
Arenga saccharifera *La Bill.* (Borassus Gomutus *Lour.* Gomutus *Spr.* Saguerus Rumphii *Roxb.*)	5¼	4	30
Astrocaryum Ayrii *Mart.* (Toxophoenix aculeatissima *Schott.*)	7	10	30
— species nova e Surinam	1½	2	20
Attalea excelsa *Mart.* (Cocos longifolia *h. Parm.* C. Urucuru *h. Lind.*)	2½	6	10
— furnifera *Mart.*	1½	4	10
— speciosa *Mart.*	2½	6	10
Schöne Sämlinge von 1-1½' hoch 6 Thl.			
Bactris minax *Miq.*	2¼	4	20
— spinosa *Mart.*	2	4	10
Kräftige schöne Sämlinge von 1-1½' hoch 3-5 Thl.			
Brahea dulcis *Mart.* (Corypha frigida *h. Lodd.*)	3	7	30
Kleiner 10-20 Thl.			
Borassus flabelliformis *L.*	1	3	15
Kleiner 10 Thl.			
Calamus latispinus *hort.* (Daemonorhops *hort. Amst.*)	2	5	20
— micranthus *h. Bog.*	2½	5	15
Kleiner 5-10 Thl.			
— niger *Willd.* (C. asperrimus *h. Brux. h. Geert.* montanus *h. Makoy.* Daemonorh. asperrimus *h. Berol.* D. melanochaetes *Bl. h. Deck. h. Lugd.-Bat. h. Jonghe h. Lodd.* D. niger *h. Glym.* D. viminea *W. hort. Amst.* Plectocomia elongata *hort. Paris.*)	1½	5	15
— Rotang *L.*	2	6	20
Kleinere 10 Thl.			
Carludovica humilis *h. Berol.*	1½	4	4
In allen Grössen von 1-3 Thl.			
— latifolia *Ruiz* et *Pav.*	3	9	10
Kleiner 2 Thl.			
— palmata *Rz.* et *Pav.*	5	5	6
Kleinere ½-1 Thl.			

	Höhe Fuss	Wedelzahl	Preis Mk.
Carludovica Plumieri *Kth.* (palmaefolia *h. Lodd.* plicata *h. Ber.*)	2	5	5
Kleinere von 2-3 Mk.			
— spec. Meridor	3	5	5
Kleinere 2 Mk.			
— — Venezuela	4½	4	50
Kleinere 2 Mk.			
Caryota appendiculata	3	4	20
— Cumingii *Lodd.* (C. urens *h. Berol.*)	3	3	25
— furfuracea *Bl.* (C. sp.? *h. i. pav. Potsd.*)	5	4	40
— propinqua *Bl.*	1½	3	10
— sobolifera *Wall.* (Drymoploeus Zippelii *h, i. pav. Potsd. h. Makoy*)	7	4	40
— urens *L.*	2	4	10
Ceroxylon ferrugineum *hort.*	4	5	10
Chamaedorea desmoncoides *Herm. Wendl.* (elatior *h. Parm.* regia *hort.* repens *h. i. pav. Potsd.?* robusta *h. Lodd.* scandens *h. Berol. h. Makoy. h. Par.*)	7	7	15
Kleinere 6 Mk.			
— Ernesti-Augusti *H. Wendl.* (Morenia *Wendl.* Ch. latifrons *h. Aremb.* simplicifrons *h. Brux.* Geonoma latifrons *h. Makoy*)	3½	5	6
— geonomaeformis *Herm. Wendl.* (fenestrata *h. v. Houtt.* humilis *h. Ber.*)	2	4	5
— Karwinskiana *Herm. Wendl.* (elatior *h. Berol. h. i. pav. Potsd. h. Amst. h. Lugd.-Bat. h. Gand.*)	4	5	15
Kleinere 5-10 Mk.			
— Lindeniana *Herm. Wendl.* (concolor *h. Paris.* scandens *hort. Brux.*)	7	4	15
— lunata *Liebm.* (biloba *h. Hamb.* oblongata *h. Gand.* Schiedeana *h. Leod.*)	4½	5	12
Kleiner 6 Mk.			
— Martiana *Herm. Wendl.* (Ch. flexuosa *h. Lugd.-Bat.* Ch. Lindeniana *h. Leodiens.*)	3	4	10
— oblongata *Mrt.* (Morenia *Hrm. Wendl.* aurantiaca *h. Belg. et Gall.* Lindeniana *h. Brux.* scandens *h. Berol.*) . .	2	5	6
— Schiedeana *Mart.* (Kunthia xalapensis *Otto* et *Dietr,* gracilis *h. Leod.* speciosa *h. Berol.*)	8	5	10
Kleiner 5 Mk.			
— spec. Meridor *hort. Bessg.*	3	4	15
— — I.	2¼	4	10
— — II.	1½	3	10
Chamaerops humilis *L.* (conduplicata *h. Gand.* humilis macrocarpa? *h. Berol.* fructu elongato *h. ins. Pav.*) . . .	3½	5	20
Cocos butyracea *Mart.*	—	—	5
1' hohe kräftige Sämmlinge.			
— lapidea *Gaert.* (Diplothemium caudescens *h. Berol.*) . .	9	3	40
— nucifera *L.* (nucifera pumila *H. Herrenh.*) viel Vorrath.	2-3	4	10-20
Corypha Gebanga *Bl.* (C. macrophylla *h. Arenberg*)	1½	6	20
Kleiner 15 Mk.			
Cycas circinalis *L.* . . . . Stammhöhe	6½	viel	1000
— inermis *Lour.* . . . . „ „	3½	viel	200
In allen Stärken von 3-8 Zoll 4-10 Mk.			
— revoluta *Thbg.* (revoluta var. *h. Herrenh. h. Amstel.*) .	1/12-3	verschied.	1-150
In allen Stärken.			

	Höhe Fuss	Wedelzahl	Preis Thlr.
Cyclanthus cristatus *Kl.*	2½	6	10
In allen Grössen ½-6 Thlr.			
— Plumierii *Poit.* (angustifol. *h. Berol. h. Amstel. h. Lodd.*)	4½	9	10
Kleiner 2 Thlr.			
Desmoncus horridus *hort.*	1-1½	3-4	5-10
Viel Vorrath an Sämlingen.			
Encephalartos caffer *Lehm.* . . . . Stammhöhe	4½	viel	1200
Ein seltenes Prachtexemplar. Dessen Stamm einen Umfang von ziemlich 4′ hat.			
— horridus *Lehm.*	¾-1½	5-8	40-50
— longifolius *Lehm.* (E. longifol. var. angustifolius *Miq.* Promont. b. sp. *h. Amstel.* Zamia pungens *h. Par.?* longifol. var. *h. Amstel.*)	1¾	5	50
— tridentatus *Lehm.* (spiralis *h. Berol.*) . . . . sehr stark	1½	8	60
Freycinetia nitida	1½	viel	5
Iriartea praemorsa *Kl.* (Oenocarpus spec. *h. Lind.*)	½-1	2-3	4-6
Schöne Sämlinge.			
Licuale elegans *Bl.*	1½	5	10
— horrida *Bl.* (Rhapis javanica *h. ins Pav. h. mult. Bat.* et *Blg.*)	2½	5	20
Kleiner 15 Thlr.			
Livistonia chinensis *Mart.* (Latania *Jcq.* Latania borbonica *Lam.* Livist mauritiana *Wall.* Saribus chinensis *Bl.* Latania borb. *h. Decker. h. i. pav. Potsd. h. Leod. h. Makoy. h. Arenb. h. Paris. h. Kew. h. Lodd. h. Edinb.* Lat. chinens. *h. Berol. h. Brux.* Saribus subglobosus *hh. mult. Batav.* et *Belg.*)	1½-3	5-10	4-20
Junge sehr kräftige Pflanzen.			
— Mauritiana. Kräftige Sämlinge.	1	2-3	8
— olivaeformis *Mart.* (Saribus *Hasskr.* Chamaerops Biroo *h. Lugd.-Bat. h. i. pav. Potsd. h. Makoy. h. Brux. h. Maelen. h. Parm.* Latania borb. *h. Berol.* Saribus olivaeformis, rotundifolius et subglobosus *hh. mult. Batav.* et *Belg.*)	12	20	500
Eine sehr starke Prachtpflanze.			
Kleine 10-15 Thlr.			
Malortiea gracilis *Hrm. Wendl.* (Chamaedorea fenestralis *h. Parment.* Chamaerops fenestrata *h. Amstel.* Geonoma fenestrata *h. Makoy.*)	3½	8	30
Maximiliana regia *Mart.* (Elaeis guianensis *h. Berol.?*) . . .	6	7	25
Oenocarpus utilis *Kl.*	1-1½	3-5	8-10
Oreodoxa regia *Kth.*	1½	2-3	1-2
Von dieser schönen Palme besitze ich grossen Vorrath von kräftigen Sämlingen.			
Pandanus amaryllifolius *Rxb.* (P. moschatus *h. Berol.*) . . .	4	viel	8
Kleiner 2-4 Thlr.			
— gramineus (Freycinetia graminea *h. Amstel.*)	1½	"	3
Kleiner 1 Thlr.			
— javanicus fol. var.	3½	"	10
In allen Grössen vorräthig von 2-6 Thlr.			
— inermis *Roxb.*	1	"	—
— laevis *Rumph.*	¾	"	—
— pygmaeus *Thour.* (graminifolius *hh. Germ. Batav. Belg. Gall.* et *Angl.* Foullioya graminifolia *h. Par.* Freyc. graminifolia *h.* Freyc. leucacantha *h. Amstel.*)	1	"	1
— reflexus *Lodd.*	2½	"	40
— utilis *Bory* (spiralis *h. Amst.* odoratissimus *Th.*) . . .	6	"	40
Kleine Sämlinge	½	"	2-3

	Höhe Fuss	Wedelzahl	Preis ℳ.
Pandanus viridis	2	viel	—
Phoenix dactylifera *L.* (dactylifera microcarpa *h. i. pav. Potsd.*)	5¼	9	20
Kleiner 6 ℳ.	4	7	10
— farinifera *Rxb.* (leonensis *h. Lodd.* pygmaea *h. Berol.* Elate sylvestris *h. Paris?*)	5	12	35
Kleine 4-6 ℳ.	3½	10	30
— reclinata *Jcq.* (farinifera *h. Lodd.* leonensis *h. Berol.*	7	11	50
paludosa *h. Ber. h. Brux.* pusilla *h. i. pav. Potsd.*	7	4	40
— sylvestris *Roxb.*	5¼	12	30
Phytelephas macrocarpa *Ruiz* et *Pav.*	3	5	30
Plectocomia elongata *Mart.* (Calamus maximus *Reinw. h. Lodd.* Zalacca assamica *h. Decker. h. Makoy*)	2	2	15
Rhapis flabelliformis *Ait.*	5	16	10
In allen Grössen von 1-8 ℳ.			
Sabal Adansonii *Guerns.* (Corypha minor *Murr. h. i. pav. Potsd.* C. pumila *Walt.* Sabal pumila *Pers. h. Houtt.*)	3½	5	20
Kleiner 6-10 ℳ.			
— — major (S. Adansoni *h. Mak. h. Maelen.* S. Palmetto *h. Brux.*)	2½	4	15
— havannensis *Lodd.* (S. picta *h. Amst.* Chamaer. excelsa *h. Paris*)	4½	12	40
— umbraculifera *Mart.* (Corypha *Jcq. h. Berol.* S. Blackbourniana *h. i. pav. Potsd.*)	5	5	60
Seaforthia costata *Mart.* (Pinanga costata *Pl. h. Ultraject.*)	2	2	40
Stachyophorbe Deckeriana *Kl.*	2	4	10
Auch kleinere 5 ℳ.			
Syagrus botryophora *Mart.* (Cocos *Mart. h. Amstel. h. Lodd.* Attalea grandis *h. Parment.* Cocos fernambucana *h. Makoy. h. Houtt.?*)	18	3	50
— campestris (Cocos *Lodd. h. Lodd.* Diplothemium argent. *h. i. pav. Potsd.*)	4	5	30
Thrinax radiata *Lodd.* (argentea *h. Ber.* elegans *h. Lodd.* gracilis *h. ins Pav.* parviflora *h. Brux.* Mauritia flexuosa *h. Berol.*	1¾	12	20
Trithrinax mauritiaeformis *hort.*	—	—	—
Wallichia caryotoides *Roxb.* (Harina *Ham.*)	2	3	15
Kleinere 10 ℳ.			
— porphyrocarpa *Mart.* (Caryota humilis *Reinw.* Orania *Bl.* Orania regalis *Bl.* Wallichia Oranii *Bl. h. Berol. h. Amst. h. Makoy. h. Brux.* Orania porph. *h. i. pav. Potsd.* O. reg. *h. Berol. h. Amstel. h. Gand. h. Paris.*)	2	5	20
Auch kleiner 10 ℳ.			
Zamia integrifolia *Ait.*	1½	—	5
— muricata *Willd.* (spinosa *h. Parm.?*)	2½	—	15
Im Palmhause befinden sich noch zwei Prachtstämme von Aletris fragrans (dichte mehrtheilige Blätterkrone) . . à	11	—	20

Pflanzen, welche zu officinellen u. technischen Zwecken verwendet werden, sowie tropische Fruchtbäume.

Das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden ist der Wahlspruch der Zeit. Dass er auch in der Wahl seiner Lieblinge des Pflanzenreichs anwendbar, bestätigt die nachstehende Gruppe, und es wird nicht mehr allein Vergnügungs- und

Luxussache sein, die Kinder der Tropenwelt zu pflegen, wenn man gleichzeitig aus dieser Abtheilung wählt, die des Lehrreichen so Vieles bietet.

Bemerkung. Alle Pflanzen mit vorgesetztem **k** gehören ins Kalthaus, während das hinten stehende **k** — wie überall — Knollengewächs bedeutet.

	Rℓ.	ngr.
Abroma augustum *L.* (Cacaomalve)	—	15
Adansonia digitata *L.* (Affenbrodbaum, Baobab.)	—	—
Agathophyllum aromaticum *W.* (officinell)	1	—
Amomum Cardamomum *L.* (Karmom)	—	5
Amyris sylvatica *Jacq.* (Waldbalsammyrthe)	1	—
Anona Humboldii (Flaschenbaum)	6	—
— muricata *L.*	—	15
— palustris	5	—
— squamosa *L.*	1	—

(Sämmtliche Anona liefern essbare Früchte.)

	Rℓ.	ngr.
Aralia papyrifera (Papierpflanze der Chinesen)	3	—
Artocarpus incisa *L. fil.* (Brodbaum) Samenpflanzen . .	4-6	—
— integrifolia *L.*	1	—
— Locucha	1	—
— rigida *Blume*	5	—
Bambusa arundinacea *Retz.* (Bambusrohr)	1	—
— aurea *hort.*	1	—
— nigra *Lodd.*	1	—
Batatas paniculata (Batate) . .	—	10
Bixa Orellana *L.* (Orleanbaum) .	—	10-20
Bombax Ceiba *L.* (Westindische Seidenpflanze)	1/3-1	—
Brucea antidysenterica *Mill.* (ferruginea *L'Her.*) (falsche Angustura)	2	—
Caesalpinia brasiliensis *Sw.* (Brasilienholz)	1	—
Canella alba *Murr.* (Wintera Canella *L.*) (Weisser Zimmet- oder Canellbaum) . . .	6	—
Capparis ferruginea *L.* (Eine Sorte Kappernstrauch)	—	10
— flexuosa *Bl.* (cynophallophora *Mill.*)	—	20
kCassia fistula *L.* (officinell) . .	—	—
— occidendalis *L.* (officinell) .	—	—
Cedrela febrifuga *Bl.* (officinell) .	10	—
— odorata *L.* (Bastardceder) .	—	—
kCeratonia Siliqua *L.* (Johannisbrodbaum)	—	5
Chloranthus erectus *Wall.* . . .	—	5

Wird nebst Jasmin von den Chinesen zum Parfümiren des Thees verwendet.

	Rℓ.	ngr.
Chrysophyllum argenteum *Jacq.* (liefert essbare Früchte) . .	1	—
Cinnamomum brevifolium *Miq.* (maruba *Sieb.*)	—	—
— javanicum *Bl.*	1	—
— sericeum *Sieb.*	—	—
Cinchona alba *hort. Amst.* (Cascarilla Muzonensis *Wedell?*) (offic.)	—	15
Coffea arabica *L.* (Mokka *hort.*) (Kaffeebaum)	1/3-1	—

Hiervon besitze ich ausgezeichnet kräftige Samenpflanzen, die zum ersteren Preis notirt werden.

	Rℓ.	ngr.
— bengalensis	6	—
— mauritiana *Lam.*	1	—
kConvolvulus Batatas *L.* (Ipomaea *L.*) Batate oder süsse Kartoffel, eine schätzbare Knollenpflanze, welche die beste Empfehlung verdient, da sie in Deutschland sich sehr gut cultiviren lässt.	—	3
12 Stück	1	—
Cookia punctata *Sam.* (Frucht essbar, aromatisch)	2	—
Crescentia Cujete *L.*	1	—
— macrophylla *h.* (beide officinell)	2	—
Curcuma fusca (Gelbwurz.) . **k**	—	10
— longa *L.* . . . . **k**	—	10
— Zedoaria *Rosc.* (Amomum Zerumbet. *Kön.* Zittwerwurzel) . . . . **k**	—	10
kDioscorea Batatas *Dcsne.* . . .	—	5

Sie wird als Ersatzmittel der Kartoffeln empfohlen; ich baute von Knöllchen, in der Grösse von Kirschkernen, schon ansehnliche Knollen im Freien.

	Rℓ.	ngr.
Dracaena Draco *L.* (Drachenblutbaum)	—	—
k Drymis Winteri *Forst.* (Gewürzrinde)	1	—
Durio Zibethinus *L.* (essbare Früchte)	10	—
Eugenia Jambos *L.* (Jambusenbaum)	1/2-1	—
— malaccensis *Presl.* (Früchte essbar, liefert auch Möbelholz auf den Sandwichinseln)	1	—
Ficus elastica *Rxb.* (Gummibaum)	1/3-10	—
Galactodendron utile *H. B. K.* .	2-4	—

Dieser Kuh- oder besser Milchbaum ist einer der merkwürdigsten Nutzbäume Südamerikas, denn wie der Name an-

Rß. ngr.

deutet, liefert derselbe, gleich unseren Kühen, trinkbare Milch; und in der That, die Indianer benutzen ihn in dieser Eigenschaft, sie zapfen den Baum an und holen sich täglich die nöthigen Portionen Milch. Die Pflanze ist aber so selten, dass sie fast aus allen Catalogen verschwunden ist.

Garcinia Mangostana *L.* (Mangostane) . . . . 6 —

Guajacum arboreum *H. B. Kth.* (Guajakholz) . . . . . . 2 —

— officinale *L.* . . . . 5 —

Hernandsia sonora *L.* (officinell.) 1 —

Hibiscus Abelmoschus *L.* (Bisam-Eibisch, Moschuskörner) . — 5

— esculentus *S.* (geniessbarer Eibisch) . . . . — 5

Hura crepitans *L.* (sehr stark) . 1-2 —

Sandbüchsenbaum, sehr geschätzt von den Homöopathen als ein vorzügliches offic. Mittel und lasse ich auch gern Tropfen in chemischreinem Spiritus aufgefangen ab.

Hymenaea Courbaril *L.* (Heuschrekkenbaum) Columb. . . . 5 —

Liefert das Anime-Gummi.

Ilex paraguayensis *Lam.* var. angustifolia (Paraguaythee) . — 10-20

k Illicium anisatum *L.* (Sternanis). — 10

— floridanum *L.* . . . . . . — 15

— religiosum *Sieb.* et *Zucc.* . — 15

Inocarpus edulis *L. fil.* (Frucht essbar) . . . . 5 —

Kämpferia Galanga *L.* (Galgantwurzel) . . . . k — 10-20

Lagetta Lintearia *Lam.* (Spitzenbaum) . . . . 1 —

kLaurus Camphora *L.* (Camphora officinarum *Bauh.*) (Kampferbaum) . . . . — 15

k — Cassia *Roxb.* (Cinnamomum albiflorum *N. E.*) (Zimmetcassie). . . . . ⅓-1 —

— Cinnamomum *N. E.* (Cinnamomum zeylanicum *Blume.* C. verum *Sw.*) (Aechter Zimmet) stark . . . . . . 2 —

k — nobilis *L.* (Lorbeerbaum) . — 10-20

Limonia spectabilis (Limonie) . ⅓-1 —

Lucuma deliciosa *Plch.* et *Lind.* . — —

Mammea americana *L.* (Mommey) 2-5 —

Kräftige Samenpflanzen.

Mangifera indica *L.* (domestica *G.*) (Mangobaum) Kräftige Samenpflanzen. . . . . . 2-4 —

Maranta arundinacea *L.* (l'Arrowroot) . . . . — 20

Melicocca bijuga *L.* (Honigbeere) 2-4 —

Micania Guaco *hort.* non *Humb.* (Guako) . . . . r — 10

Wird neuerdings als ausgezeichnetes Präservativ gegen die Cholera empfohlen.

*Musa Cavendishii *Hook.*, *Paxt.* (Banane, Pisang. Paradiesfeige) . . . . ½-6 —

— Castilonii *hort.* . . . . . 4 —

— Dacca *Mak.* . . . . . . ½-6 —

— guatemalensis *hort.* . . . 3 —

— rosacea *Jacq.* . . . . . . 1-3 —

* — zebrina *H. van Houtte* . . 1-4 —

Myginda uragoga *Jacq.* . . . . 2 —

Myristica Horsfieldii *hort.* non *Sp.* — 10

Myrtus Pimenta *L.* (Eugenia *D. C.*) Nelkenpfeffer . . . . . ½-1 —

Ochroma gigantea (Bleichwolle) . 1 —

Persea gratissima *Gaert.* (Laurus Persea *L.*) Avogadobaum . 3 —

— macrocarpa . . . . — —

Piper Betel *L* (Betelpfeffer) . . 1 —

— nigrum *L.* (schwarzer Pf.) — 10-20

Pogostemon Patschouli *Pelod.* (beliebtes Parfüm) . . . . — 5

kPrunus Laurocerasus *L.* (Kirschlorbeer) . . . . — 5

Psidium Cattleyanum *Sab.* (Guajavabaum) . . . . . k — 10

— ferrugineum *Presl.* . . . — 10

— montanum *Sw.* . . . . . . — 10

— obovatum *Mart.* . . . . . — 10

Quassia amara *L.* (Bitterholz) . 4 —

Roxburghia officinalis *hort.* . . 4 —

Saccharum officinarum *L.* (Zuckerrohr) . . . . ½-2 —

— violaceum *Juss.* . . . . . 1 —

Wachsen ausgezeichnet im Wasser.

Sapindus Saponaria *L.* (Seifenbaum) . . . . 1-2 —

Sapota Achras *Mill.* (Achras Sapota *L.*) Breiapfel . . . . 3 —

Simaba Cedron *Planch.* (Cedronsamen; officinell) . . . . . 12 —

Smilax Sarsaparilla *L.* (Sarsaparille) — 20

Spondias Mombin *L.* (S. purpurea *L.*) Mombinpflaume . . . 1-3 —

Sterkulia Balanghas *L.* (Samen essbar) . . . . 3 —

Strychnos Curare *Cat. Lind.* (Wurara Giftbaum) . . . r⅔-1 —

Wird neuerdings wieder als die am stärksten wirkende Giftpflanze erwähnt. Die darüber gelesene Beschreibung stimmt mit meiner Pflanze überein.

	Thl.	ngr.
Swietenia Mahagony *L.* (Mahagonyb.)	10	—
Tamarindus indica *L.* (Tamarinde)	$^{1}/_{2}$-1	—
Theobroma Cacao *L.* (Cacaobaum)	5-8	—
Ist in kräftigen Stecklingen abgebbar.		
— montana *hort. belg.* (Bergcacao)	—	—
kThea assamica *hort. Angl.* (Assam Thee)	1	10

		Thl.	ngr.
kThea viridis *L.* (grüner Thee)		—	15
Turnera ulmifolia *L.*		1	—
Vanilla planifolia *Andr.* (Vanille)		$^{1}/_{2}$-1	—
Zingiber Cassumunar *Roxb.* (Ingwer)	k	—	10
— officinale *Rosc.*	k	—	10

Plantae aquaticae.

Durch die Victoria regia wurden wir aufmerksam gemacht, mit welchem Unrecht wir unsere Bassins, Teiche und Seen vernachlässigt, und um welchen Genuss wir uns bisher durch Hintansetzung der so köstlichen Wasserpflanzen gebracht! In der neuesten Zeit hat man sich bemüht, diese Unterlassung wieder gut zu machen und davon die herrlichsten Erfolge geerntet. Herrn Inspector C. Bouché des berliner botanischen Gartens gebührt aber vor Allem der Ruhm, zuerst erkannt zu haben, dass es einer Kreuzung der so selten blühenden Nymphaea rubra bedürfe, um nicht nur reichlich sondern auch brillant blühende Bastarde zu erzeugen. Seiner unendlichen Umsicht verdanken wir die nachstehenden Resultate, die ich so glücklich bin, zuerst dem Handel zu übergeben. — Es ist ein Farbenspiel vom zartesten Rosa bis zum feurigsten Purpur — so feurig, dass wie ich mich selbst überzeugt — das Auge geblendet wird.

	Thl.	ngr.
Aponogeton distachys *Ait.*	—	20
†Arum div. spec. v. Aroideae	—	—
†Caladium et Colocasia desgl.	—	—
†Carex variegata	—	10
†Ceratopteris thalictroides *Brogn.*	—	10
Cyperus alternifolius *L.*	—	10
— pungens *h. Berol.* (textilis *Thbg.*)	$^{1}/_{2}$-1	—
Euryale ferox *Salisb*	2	—
— — 1 Samenkorn	—	10
Hydrochlaeis Plumieri (Limnocharis *Rich.*)	—	20
Iris Pseudacorus *L.*	—	5
Limnocharis Humboldtii *Rich.*	—	5-15
Nelumbium Count of Thun *h. Tetschen*	5	—
Nuphar-luteum *Sm.*	—	5
Nymphaea alba *L.*	—	5
— amazonum *Mart.*	1	—
— biradiata *Sommerauer* stark	—	10-20
— blanda *Mayr.* (glandulifera *Kl.*)	1	—
— cyanea *Rxb.*	—	10
— gigantea *Hook.*	3	—
— guineensis *Schum.* (micrantha *hort.*)	1	15
— hybr. Inspector Bouché (Bouchéana *Bch.*)	2	—

Blassrosa, die inneren Petalen weiss, die Staubfäden gelb. Dies war der erste glückliche Vorläufer der Bouché'schen Züchtung!

	Thl.	ngr.
— — A. Borsig, *C. Bouché*, hellrosa	2	—

	Thl.
Nymphaea hybr. Adele *C. B.*, purpur mit orangenen Staubfäden	2
— — Caspariana, *C. B.*, purpur mit rothbraunen Stbfd.	2
— — Dr. Klotzsch, *C. B.*, hellpurpur mit rothbraunen Stbfd.	1
— — Elisabeth, *C. B.*, blassrosa sehr grossblumig mit gelben Stbfd.	2
— — Friederike, *C. B.*, rosa mit ocherfarbigen Stbfd.	2
— — General-Director Lenné, *C. B.*, zart rosa; im Innern fast weiss mit gelben Staubfäden.	2
— — Gustav Fintelmann. *C. B.*, dunkelpurpur mit braunen Stbfd.	2
— — Louis Mathieu, *C. B.*, rosa mit bläulichem Anflug und orangenen Stbfd.	2
— — Van Houtte, *C. B.*, rosa mit bläulichem Anflug und ocherfarbenen Stbfd.	2
— — Professor A. Braun, *C. B.*, blassrosa sehr breite Petalen u. gelbe Stbfd.	1
— — — C. Koch, *C. B.*, hellpurpur.	1
— — Theodor Jannoch, *C. B.*, rosa, sehr grossblumig	2
— — Theodor Nietner, *C. B.*, purpur mit bläulichem Anflug und orangenen Stbfd.	2
— — Wendland, *C. B.*, hellpurpur mit ocherfarbenen Stbfd.	2

	ℛℓ.	ngr.
Nymphaea Kosteletzkyi *Palliardi*	—	10
— Lotus *L.* (thermalis *Wk.*)	1	—
— — var. major. *Lehm.* (N. dentata *Planch.* non *Thonn.*, N. Ortgiesii *Planch.*)	1	—
— odorata *Ait.*	—	10
— — grandiflora	—	10
— Ortgiesiana rubra *Planch.* starke Knollen	½-1	—
— poecila *Lehm.* cyanea *hort.*	—	10
— rubra *Roxb.*	1	—
— scutifolia *D. C.* (capensis)	—	15
— semiaperta *Klinggr.*	—	20
— stellata *W.*	—	10
— versicolor *Roxb.*	—	15
Ouvirandra fenestralis *Poiret.*	30	—

Eine köstliche Einführung aus Madagascar! die besonders durch den originellen Netzbau ihrer Blätter zu einer Erscheinung wird, wie sie unter den Pflanzen bisher noch nicht bekannt war. Man hat ihre Schönheit bestritten; doch glaube ich bestimmt, dass nur der an ihrer Schönheit zweifeln kann, der noch keine kräftige Pflanze sah. Die bei ausgewachsenen Pflanzen 9 Zoll grossen Blätter stehen in symmetrischer Ordnung, alle einzelnen Blatttheile lassen ein Meisterwerk symmetrischer Zeichnung erkennen, und das lebhafte schöne Grün macht einen wohlthuenden Eindruck.

	ℛℓ.	ngr.
†Papyrus antiquorum *Lk.* (Cyperus Papyrus *L.*)	1	10
†Philodendron s. Aroideae	—	—
Pistia occidentalis *Bl.* (stratiotes *hort.* Zala asiatica *L.*)	—	5-10
†Pontederia cordata *L.*	—	10
† — crassipes *Mart.* (Eichhornia speciosa *Kth.*)	—	10
†Pothos v. Aroideae	—	—
†Saururus cernuus *L.*	—	5-10
†Thalia dealbata *L.* v. Scitamineae	—	10-20
Vallisneria spiralis *L.* fem.	—	5
Victoria regia *Ldl.*	2-4	—
Selbstgebauter frischer Samen à K.	—	10

Die mit † bezeichneten dürfen nur bis an den Rand ins Wasser gestellt werden.

Scitamineen und Musaceen.

An Reichthum der Blattformen, des Colorits, der Eleganz, stehen sie den Aroideen kaum nach, an Originalität und Schönheit der Blüthen übertreffen sie jene noch, und ich hoffe, der bessere Ueberblick, den ich durch die Ausscheidung der ganzen Familie über dieselbe verschaffte, wird den vielen Freunden derselben willkommen sein.

		ℛℓ.	ngr.
Alpinia Aluchas *Rosc.*	k	—	20
— humilis *hort.*	k	—	15
— nutans *Rosc.*	k	—	15
Amomum Cardamomum	k	—	5-10
Calathea flavescens *Ldl.*		—	10
— rotundifolia *hort.* (Phrynium *hort.* Maranta cordata *hort.*)		—	20
Canna Achiras *Lindl.*	k	—	20
— coccinea *Ait.* (crocea *Roem.* et *Schult.* speciosa major *Hegetsw.*)	k	—	10
— discolor *Lindl.*	k	—	20
— elegans *hort.?*	k	—	15
— flavescens *Lk.* (orientalis var. flava *Rosc.* indica var. flava *Roxb.*)	k	—	15
— indica *L.*	k	—	10
— lutea *Rosc.*	k	—	10
— macrophylla *hort.*	k	—	20
— nepalensis *hort. Par.*	k	—	10
— Rolleana *Bouché*	k	—	10
— Roscoeana *H. Berol.*	k	—	10
— spec. e Havannah	k	—	10
— staminea *hort.*	k	—	20
Canna violacea *hort. Berol.*	k	—	20
— Warscewiczii *Otto* et *Dietr.*	k	—	10
Costus speciosus *Sm.* (arabicus *L.*)	k	—	15
— spiralis *Rosc.*	k	—	15
Curcuma Amada *Roxb.*	k	—	20
— fusca		—	10
— longa *L.*		—	10
— Roscoeana *Wall.*	k	2	—
Elettaria Cardamomum *White* et *Mont.* (Alpinia Cardam. *Rxb.*)		—	10
Globba humilis *hort.*		—	10
Hedychium coccineum *Sm.*		—	10
— coronarium *Koen.*		—	10
— flavescens *Carey.*		—	15
— Gardnerianum *Wall.*		—	10
Heliconia angustifolia *Hook.*		⅓-1	—
— Bihai *Swt.*		—	10
— buccinata *Roxb.* (indica *Lam.* Phrynium *hort.*)		—	10
— discolor *h. Berol.*		—	10
— leucogramma *hort.*		2	—
— psittacina *L.*		—	10
— pulverulenta *Ldl.* (farinosa *Raddi*		—	15

	Rt.	ngr.
Heliconia spec. Mirador	—	—
Kaempferia Galanga *L.*	—	10-20
— longa *Jacq.* (rotunda *L.* rotundif. *hort.* versicolor *Salisb.*)	—	20
Maranta albo lineata *Linden*	1-2	—
— arundinacea *L.*	—	20
— bicolor *Ker.*	—	5
— cannaefolia *h. Amstel.*	1	—
— eximia *V. Houtt.*	—	10
— glumacea *V. Htt.*	—	10
— gracilis *Rudg.*	—	10
— lutea *Jacq.*	—	10
— metallica *Pl. et Lind.*	2	—
— regalis *hort.*	3	—
— roseo-lineata *Linden*	1-3	—
— sanguinea *hort.* (Phrynium *Hook.* Stromanthe *Loud.*)	½-1	—
— Sellowii *hort.*	—	5
— species e Venezuela	1	—
— variegata *Lodd.*	1	—
— vittata *h. Belg.* (Phrynium pumilum)	—	20
— Warscewiczii *Kl.* (Phryn.)	1-2	—
— zebrina *Sms.* (Calathea *Ldl.*)	⅓-1	—
Musa Castilonii *hort.*	4	—
— Cavendishii *Hook.*	½-6	—
— Dacca *Mak.*	½-6	—
Musa Guatemalensis *hort.*	3	—
— rosacea *Jacq.*	1-3	—
— zebrina *h. v. Htte.*	1-4	—
Myrosma cannaefolia *L. fil.*	—	10
— comosa (Mar. truncata *hort.*)	—	10
Phrynium leptostachyum	—	10
— marantinum	1-2	—
— micans *Klotzsch.*	—	10

Auf so kleiner Fläche — denn es ist ein wahres Zwerg-Phrynium — wird man ein so nettes buntes Colorit selten finden; zu zierlichen Decorationen kann es nichts Empfehlenswertheres geben!

	Rt.	ngr.
— setosum *Roxb.*	—	5
Strelitzia Andersonii *hort.*	—	—
— augusta *Thnb.* (Heliconia alba *L.*)	10-15	—

Eine sehr grosse Pflanze mit 2 Fuss hohem Stamm, 60 Rt.

	Rt.	ngr.
— cannaefolia	—	—
— humilis *Lk.*	3	—
— Reginae *Ait.*	2	—
— spathulata *hort.*	—	—
Thalia dealbata *Rosc.* (Maranta *Fras.* Heliconia *Lodd.* Peronia stricta *D. C.*)	—	10-20
Urania speciosa *Schrb.* (Ravenala madagascariensis *Sonner.*)	10	—
Zingiber Cassumunar *Roxb.* k	—	10
— officinale *Rosc.* k	—	10

Kalthauspflanzen.

	Rt.	ngr.
Abutilon Alphonse Karr *hort.*	—	10
— Bedfordianum *h. angl.* f	—	7-10
— marmoratum *hort.* (Hibiscus *Ch. Lem.*) f	—	10
— parviflorum *H.*	—	5
— striatum *Ldl.* f	—	5-20
— — Van Houttei f	—	10
— Souvenir d'Arragon *hort.*	—	10
— — de Cauchy *hort.*	—	10
— spec. e Brasil.	—	10
— venosum *Ch. Lem.* f	—	5-20

Im Sommer decoriren die Abutilon köstlich im Freien, im Winter erfreuen die herrlichen Glöckchen. Nächst den bekannten A. striatum und venosum sind es vorzüglich die Gartenhybriden Alphonse Karr, Souv. d'Arragon und Souv. de Cauchy, welche sowohl in Grösse der Blumen als Zartheit der Farben alle anderen übertreffen.

	Rt.	ngr.
Acacia brevifolia *Lodd.*	—	5-10
Acacia Cunninghami	—	20
— dealbata *Lk.*	—	10
— decipiens *R. Br.*	—	15
— Farnesiana *W.*	—	10
— inegala (Mimosa virgata)	4	—
— lophantha *W.*	—	5-10
— paradoxa *D. C.*	—	5-15
— pulchella *R. Br.* var. major	—	10
— — racemosa	1	—
Agapanthus umbellatus *L'Her.* f	—	5
Agathosma mollis *Bartl. Wendl.*	—	5
*Agave americana *L.* stark	2	—
— — fol. var.	—	15
— havannensis *hort.*	—	20
— lurida *Ker.*	—	20
Akebia quinata *Decsn.*	1	—

Sehr schöner Schlingstrauch, auch für das Freie recht passend.

	Rt.	ngr.
Anomatheca cruenta *Ldl.*	—	5

Rß. ngr.

Antholyza aethiopica *L.* . . . . — 10
Eine brillante scharlachroth blühende Irideae.

Aristea cyanea *Ait.* . . . . . . — 10
Blüht sehr dankbar fast den ganzen Sommer im schönsten Smalteblau!

Astelia Banksii *R. Br.* . . . . . — 10
†Arundinaria falcata *N. E.* . . . —7-15
Banksia australis *R. Br.* . . . . — 20
— ericaefolia *L. fil.* . . . . . — 20
— paludosa *R. Br.* . . . . . — 20
Baueria humilis *Swt.* . . . . . — 10
Beaufortia decussata *R. Br.* . . . — 5
Benthamia fragifera *Ldl.* . . . . — 5
Berberis Darwinii . . . . 1 —
— Neubertii . . . . 5 —
Bignonia capensis *hort.* . . . . . — 15
— jasminoides *Cunn.* . . r — 5
— pandorana *Andr.* . . . . r — 5
Billardiera longiflora *Labill.* (Sollya heterophylla *Lindl.*) . . r — 5
An Drahtgittern gezogen gewährt sie durch ihr feines Laub und durch die grossen herrlichen blauen Beeren einen eigenthümlichen Reiz.

Boronia alata *Sm* . . . . — 10
— Drummondii *hort.* . . . . — 20
— tetrandra *La Bill.* . . . . — 20
Blühen im Frühjahr sehr dankbar und verbreiten einen köstlichen Wohlgeruch.

Bouvardia angustifolia *H. B. K.* . — 10
— hirtella *H. B. K.* . . . . . — 10
— Houtteana *Schldl.* . . . . . — 15
— hybrida Hogarth *Hend.* . . 1 —
— — Laura *Hend.* . . . 1 —
— — Oriana *Hend.* . . . 1 —
— — Rosalinda *Hend.* . . 1 —
Diese ganz neuen in England gezüchteten Hybriden empfehlen sich durch besondern Blüthenreichthum und Farbenpracht. Ueberhaupt ist die ganze Gattung als Gruppenpflanze zu empfehlen. Im Frühjahr ins Freie gepflanzt sind sie den ganzen Sommer über mit schönen weissen gelblichen fleischfarbenen und scharlachrothen Blüthendolden geschmückt und blühen oft im Winter noch im Warmhause.

— Jacquini *H. B.*, (Houstonia coccinea *Andr.*) . . . . . — 5
— leiantha *Benth.* . . . . . — 5
— longiflora *H. B. K.* . . . . — 15
Brachysema latifolium *R. Br.* . — 15
— undulatum *Ker.* . . . . . . — 5
Brunia abrotanoides *L.* . . . . . — 5
Buddlea Lindleyana *hort.* . . e — 5
— mexicana . . . . — —
— Neemda *Buchan.* . . . . . — —
— quercifolia . . . . . e — 5

Rß. ngr.

Bystropogon rugosum *Moritz.* . — 10
Calceolaria rugosa Arlequin . f — 10
— — aurea grandifl. *Krtzch.* f — 10
— — Candidat . . . f — 10
— — Fantast . . . . f — 10
— — Jacob Rinz . . f — 10
— — Montecuculi *Hend.* f 1 —
— — Thusnelda . . . f — 10
— — Vulkan . . . . f — 10
Zeitig auf ein warm gelegenes mit nahrhafter Erde versehenes Beet gepflanzt, lohnen sie bis spät in den Herbst durch dankbares Blühen in den verschiedensten Nüancen vom leuchtenden Gelb bis zu Bronce und Purpur.

Calothamnus quadrifida *RB.* . . — 10
Calyptraria haemantha *Pl.* et *Lind.* 2 —
Nach der mir vorliegenden Abbildung eine der prächtigsten Kalthauspflanzen.

Canna vide Scitamineae . . . — —
Cantua dependens *Pers.* . . f — 10
— splendens *hort.* . . . . . . — 5
Wenn es gelingt, sie frühzeitig zur Blüthe zu bringen, so sind sie unschätzbare Acquisitionen.

Cassia bicapsularis *L.* . . . . . 1 —
— species nova . . . . . . 5 —
— tomentosa *L.* (multiglandulosa *Jacq.*) 1 15
Casuarina australis . . . . . 1 —
— stricta *Ait.* . . . . 1 —
— tenuissima *Sbr.* . . . . . 1 —
— torulosa *Ait.* . . . . . . 1 —
Ceanothus azureus *Desf.* . . . — 15
— Lobbianus *hort.* . . . . . 1 —
Cereus nycticallus *Lk.* et *Otto* . — 5
Cestrum aurantiacum *Lindl.* . f — 5
— laurifolium *L'Her.* . . f — 5
— pendulinum *Jacq.* . . f — 5
— salignum *hort.* . . . . . f — 10
Blühen im Herbst und Winter sehr dankbar.

Chironia floribunda *Paxt.* . . f — 5
Chorizema varium *hort.* . . . — 10
Chrysocephalum arenarium *F. Müll.* — 10
Cinnamomum Reinwardtii *h. Belg.* 1 —
Cissus antarctica *Vent.* . . . . . — 10
— variegata *hort.* . . . . . — 5
Cistus vaginatus *Ait.* . . . . . — 7
Citrus Aurantium *L.* . . . . . — 10
— sinensis . . . . 1/3-1 —
— vulgaris *Risso* fol. var. . — 15
— — myrtifolia . . . . . — 10
— — salicifolia . . . . . — 15
Clianthus magnificus *Cunn.* . . . — 10
Uebertrifft an Grösse und Farbenpracht unseren alten Liebling, den puniceus.

Rℓ. ngr.

Clianthus puniceus *Sol.* . . . . . — 5

Coleonema pulchrum *Hook.* . . . — 15

— alba *Bartl.* et *Wendl.* (Diosma *Thbg.*) . . . . . . — 5

Correa alba *Andr.* . . . . . . — 5

— Grevillii *hort.* . . . . . . — 15

— rufa *Gärt. fil.* . . . . . . — 10

Crassula coccinea *L.* . . . . . . — 5

— dentata. . . . . — 5

Zu alt und bekannt mit ihren feurigen lange anstehenden Blumenbüschen, um einer Anpreisung zu bedürfen.

Cuphea Danielsii *hort.* . . . . f — 5

— eminens *Planch* et *Lind.* . — 5

— floribunda *Lehm.* . . . . f — 5

— platycentra *hort.* non *Benth.* (ignea *D. C.*) . . . . . f — 5-10

Unsere alten C., so kleinblumig sie auch sind, imponiren sie dennoch schon durch ihre Blüthenfülle

Cyclamen africanum *hort.* (macrophyllum *hort.*) . . . . k 1 —

— aleppicum *Fischer* (persicum fl. albo *hort.*) . . . . k — 10

— Atkinsonii . . . . 2 —

— coum *Mill.* . . . . . . k — 10

— europaeum *L.* (aestivum *Rchb.* hungaricum *hort.* litorale *Sadl.* officinale *Wender.* Clusii *W. Lehm.*) . . . k — 5

— hederaefolium *Ait.* (europaeum *Mill. Lem.* autumnale *Boos.* neapolitanum *Tenor.* *h. Neapol.* graecum *Lk.* ficariaefolium *Rchb.*) . . k — 10

Cytisus albidus. *D. C.* . . . . . — 5

— Attleyanus *hort.* . . . . . — 10

Unzählige goldene Trauben bedecken ihn im zeitigen Frühjahr; daher in jedem Garten willkommen.

— racemosus *Mornock* . . . . — 10

Daphne Cneorum *L.* fol. var. . — 10

— Dauphini *hort.* . . . . . . — 5-15

— Fortunei *Ldl.* . . . . . . 1 —

— odorata *Thbg.* . . . . . . — 10

— — fol. var. . . . . — 10

— Van Houttei (*Planch.?*) . . 1 —

Schon der köstliche Duft der Blumen, leichteste Cultur und zeitiges Blühen genügen zur Empfehlung aller Daphnen.

Datura arborea *hort.* . . . . . f $^1/_3$-3 —

— cornigera *Hook.* β flore pleno (Brugmansia Knightii fl. pl. *hort.*) — 15

Kaum weiss ich die Frage zu beantworten, warum diese köstlichen Pflanzen so wenig zu treffen sind, denn wo sie blühen, und sie thun es am besten im freien Lande, mit jedem Boden vorlieb nehmend, da können sie unmöglich ungesehen bleiben, ständen sie auch im äussersten Winkel, denn ihre langen grossen blendend weissen Blumen leuchten unendlich weit! Dabei sind sie so hart, dass selbst, während der Blüthe ausgehoben, sie noch lange fortfahren, das Haus zu zieren, uud zugleich so bescheiden, dass sie nach dem Blühen mit jedem nur irgend trockenen frostfreien Plätzchen vorlieb nehmen.

Dillenia scandens *W.* . . . . . r — 5-10

Dioclea glycinoides *h. Belg.* (Kennedya splendens *hort.*) . r — 10

Diosma ciliata *Berg.* . . . . . . — 5

— rubra *L.* . . . . — 5

Diplacus glutinosus *Nutt.* var. grandiflorus . . . . — 10

Blüht schon als junger Steckling eben so schön als andauernd.

— puniceus *Nutt.* . . . . . . — 5

Dracaena nutans *hort.* . . . . . 1 —

Dryandra nivea *R. Br.* . . . . . 3 —

Echeveria bracteolata *Lk. Kl. O.* — 5

— caespitosa *D. C.* . . . . . — 10

— campanulata *Kze.* . . . . . — 10

— coccinea *D. C.* . . . . . — 5

— grandifolia *Haw.* . . . . . — 5

— pumila *V. Htte.* (secunda *Ldl.*) — 5

— retusa *Ldl.* (fulgens *V. Htte.*) — 10-15

— rosea *Ldl.* . . . . — 5

Besonders jung sehr gesucht als Nipptischpflanzen, wozu sie ganz vorzüglich passen.

Edwardsia grandiflora *Salisb.* . . — 10

Epacris grandiflora *Sm.* (longifl. *Cav.*) — 20

— intermedia . . . . — 20

— paludosa *R. Br.* . . . . . — 10

— Willmoreana . . . . . . — 20

Erica herbacea *L.* . . . . — 5

— gracilis *Wendl.* var. autumnalis . . . . — 5

— mediterranea *L.* . . . . . — 5

Erythrina crista galli *L.* . . . f — 10

— spec. (*Wagener*) . . . . f 1 —

— — e Columbia . . . . . — 20

Escallonia macrantha *Hook.* et *Arn.* — 10

— rubra *Pers.* . . . . — 10

Blühen schon sehr jung mit schönen rothen Dolden.

Eucalyptus robusta *Sm.* . . . . — 15

Eucomis punctata *Ait.* . . . . z 1 —

Eugenia australis *Wendl.* . . . $^1/_6$-1 —

— Ugni *Hook* et *Arn.* . . . . — 15

Ist als eine der vorzüglichsten Kalthauspflanzen sehr gerühmt und erzeugt sehr feinschmeckende, an das Arom der Ananas und Erdbeeren erinnernde Früchte.

	Thlr.	ngr.
Eupatorium glaucum *hort.*	—	5
— rugosum *Schrad.* (Schraderia *D. C.*)	—	5
— sinense	—	5
Blühen sehr dankbar im Winter!		
— spec. Mirador	—	5
Fabiana imbricata *R. P.*	—	5
Ficus Lichtensteinii *Lk.*	—	10
Sehr zu empfehlende Kalthauspflanze!		
Fontanesia phillyreoides *Lab.*	—	15
Fourcroya tuberosa *Ait.*	2	—
— species	10	—
Garrya Mac Fadyana *hort.?*	—	10
Gazania rigens *R. Br.*	—	5
Genista linifolia *L.*	—	10
Gladiolus gandavensis *hort. Belg.*	—	5
Glycine labialis *L.* (anonychia *Walp.* debilis *Ait.* filiformis *Wall.?* pallens *Grah.* parvifl. *Lam.* pentandra *Roxb.* Bujaria anonychia *E. Mey.* Teramnus labialis et parviflorus *Spgl.*	1	—
Gnidia virescens *Wickstr.*	—	5
Grevillea Bauerii *R. Br.*	—	10
— robusta *Cunn.*	—	—
— rosmarinifolia *Cunngh.*	—	5-10
Habrothamnus Bonduxii *hort.*	—	10
— corymbosus *Endl.*	—	5
— elegans *Ad. Brogn.*	—	5
— — β fol. var. *hort.* (hybr.)	—	10
— fasciculatus *Endl.* (Cestrum roseum *H. B. K.*)	—	5
— Hügelii *hort*	—	5
— scabra *hort.* (hybr.)	—	5
— Zephyrinae *hort.* (hybr.)	—	10
Zum Auspflanzen ist nichts empfehlenswerther als Habrothamnus. Vorzüglich empfehlenswerth sind H. Bonduxii, scabra und Zephyrinae.		
Hakea lasiocarpa *RBr.*	1	—
— crassifolia *hort.*	1	—
— salisburioides	1	—
Heimia myrtifolia *Cham. Schldl.*	—	5-20
Helichrysum felinum *Loss.*	—	10
Heliotropium Anna Turrel. f	—	5
— Gem. f	—	5
— grandiflorum *Schrk.* (corymbosum *R.* et *P.*) f	—	5
— lilacinum f	—	5
— Napoleon III. f	—	5
— Premice f	—	5
— splendidum f	—	5

	Thlr.	ngr.
Heliotropium Triomphe de Faubourg f	—	5
— —, de Liège f	—	5
— Voltaireanum f	—	5
Es genügt wohl zu sagen, dass die Damen nichts dem Vanillegeruch vorziehen; daher die grosse Vorliebe für Heliotropium. Die neuen Varietäten verbinden schönen Blüthenschmuck mit dem köstlichsten Vanillenarom.		
Hypericum monogynum *L.*	—	5
Indigofera Dosua *Hamilt.*	—	15
Jasminum grandiflorum	—	10
— heterophyllum *Wall.* (Jacksonia lucida *H. Ten.*)	—	10
— odoratissimum *L.*	—	5
— triumphans *hort.* r	—	5
Jovellana punctata *R. B.* (Calceolaria violacea *Cav.*)	—	5-10
Kennedya Baumanniana *Ch. Lem.* r	—	10
— monophylla *Vent.* r	—	5
— purpurea *hort.* (ovata *Ker.*)	—	10
— rubicunda *Vent.* (Glycine *Curt.*) r	—	10
Laurus glauca *Thbg.*	—	20
Lechenaultia formosa *RBr.* stark	—	10
Leptodactylon californicum	—	20
Leptospermum acerosum *h. Berol.*	—	5
— attenuatum *Sm.*	—	5
— lanigerum *Ait.*	—	5
— multiflorum *Cav.*	—	5
— scoparium *Forst.*	—	5
Leucadendron obliqum *RBr.*	—	5
Leucophyta Brownii *Cass.*	—	10
Limonia australis *Cnngh.*	1/3-1	—
Liparia sphaerica *L.*	—	15
Lomatia ilicifolia *RBr.*	1	—
Lopezia longiflora *hort.*	—	5
— miniata *D. C.*	—	5
— — fl. alba	—	5
Vorzüglich für den Winterflor.		
Lysimachia Lechenaultii *hort.*	—	10
Magnolia fuscata *Andr.*	—	10
— pumila *Andr.*	1	—
Mahernia incisa *Jacq.*	—	10
Mahonia Ehrenbergii	2	—
— pallida	2	—
M. Ehrenbergii und pallida sind zwei sehr empfehlenswerthe Neuheiten.		
— Fortunei f	1	—
Melaleuca armillaris *Sm.* (alba *h.*)	—	5
— decussata *R. Br.*	—	5
— hypericifolia *Sm.*	—	5
— linarifolia *Sm.*	—	10

ℛℓ. ngr.

Melaleuca lycopodioides *Wendl.* . . — 10
— pulchella *R. Br.* . . . . . . — 5
— splendens *hort.* . . . . . . — 10
Ist die köstlichste aller Melaleucen, die sich vor den übrigen durch Blumenpracht, jene aber, als gute Bouquetpflanzen auszeichnen.
— thymifolia *Sm* . . . . . . — 5
— viminea *Lab* . . . . — 5
Menispermum laurifolium *Roxb.* . — 5
Metrosideros lanceolata *Sm.* . . . — 5-20
— semperflorens *Lodd.* . . . 1/6-4 —
Mitraria coccinea *Cav.* . . . . . — 5-10
Fast aus jedem Blattwinkel hängen die kleinen feurigen Glöckchen herab, so dass sie eben so reich als imposant blüht.
Mühlenbeckia complexa *Meissn.* r — 5
Myrtus bullata *Salisb.* . . . . . — 10-20
Schon das sonderbar braune Colorit der Blätter, mehr aber noch die eigenthümliche Form der Blätter machen sie zu einer der originellsten Pflanzen.
— communis *L.* . . . . — 5
— — annulata hybrida . . — 5-20
— — flore pleno . . . . . — 5
— — fol. variegatis . . . . — 7
— robusta . . . . 1 —
Neja gracilis *D. Don.* . . . . . . — 5
Nerium Oleander *L.* var. atropurpureum . . . . — 10
— — — cupreum . . . — 10
— — — Fondeolumneanum . . . . — 10
— — — macrophyllum . — 10
— — — purpureum carneum . . . . — 10
— — — rubrum fl. pl. — 10
— — — splendens giganteum . . . . — 10
Nicotiana glauca *Grah.* . . . f — 10
Olea linifolia . . . . — 5
— undulata *Jacq.* . . . . . — 10
Pachyphytum bracteosum *Lk. K. O.* — 10
Passerina filiformis *L.* . . . . . — 5
Petunia vd. Sortimentspflanzen.
Phygelius capensis . . . . . . — 10
Aehnelt sehr den Pentstemon, erfreut aber viel länger als diese mit seinen scharlachnen Blumen.
Phylica ericoides *L.* . . . . . . — 5
Phlomis ferruginea *Ten.* . . . . — 5
Phormium tenax *L.* . . . . . . 1/3-1 —
Bekannt als neuseeländischer Hanf; ist die Pflanze nicht genug zu empfehlen, im Sommer auf Gruppen als Einzelpflanze macht sie mit ihren langen schwertförmigen Blättern und ihrem gigantischen Wuchse einen sehr decorativen Effect.

ℛℓ. ngr.

Pimelea decussata *R. Br.* . . . . — 10
— Hendersoniana *Hook* . . . — 20
Pittosporum Mayi *h. Belg.* . . — 10
— Tobira *Ait.* . . . . 1/6-2 —
Plumbago Larpentae *Lindl.* . . . — 5
Polygala myrtifolia *Linn.* . . . . — 10
Prostanthera grandiflora *h. Belg.* — 10
Pultenaea Brownii *Benth.* . . . . — 10
— subumbellata *Hook.* . . . — 5
— stricta *Sims.* . . . . . . — 10
Punica Granatum *L.* . . . . . . — 5
— — — — fl. albo pl. — 10
Rhodoleia Championi *Hook.* . . 1 —
Royena lucida *L.* . . . . — 10
Sanseviera carnea *Andr.* (Sanseviella *Rchb.*) . . . . — 5
Serissa foetida *Commers.* . . . . — 5
Wer Noth um blühende Myrte hat, der cultivire diese niedliche Serissa, und sie wird ihm oft mit ihren weissen dicht gefüllten Blumen aus der Verlegenheit helfen.
Sibthorpia europaea *L.* . . . . . . — 5
Eine wahre Nipptischampelpflanze.
Siphocampylus bicolor *G. Don.* . — 5
— canus *h. Belg.* (Tupa crassicaulis *Hk.*) . . . . — 10
Skimmia japonica *Thbg.* . . . 1 —
Sophora tomentosa *L.* . . . . . 1 —
Soulangea thymifolia *Brngt.* . — 10
Sparmannia africana *L.* . . . . — 10
Statice arborea *Brous.* . . . . . — 10
— brassicaefolia . . . . . . — 10
— macrophylla *W.* . . . . . — 10
— Reinwardtii *h. Belg.* . . . — 5
— spathulata *Desf.* . . . . . — 10
— suffruticosa *L.* . . . . — 10
Die drei ersten St. sind prachtvolle Erscheinungen. Die feine leichte Tracht und Massen von kleinen Blüthen haben ihnen gerechtes Ansehen verschafft. Um so mehr sollten sie jetzt cultivirt werden, da sich die Blüthen sehr leicht trocknen lassen und zu den jetzt in Aufnahme gekommenen unverwelklichen Bouquets ein gewiss schätzbareres Material liefern als die grellen Immortellen.
Stauntonia latifolia *Wall.* (Holboellia *Dcsn.*) . . . . . r — 10
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.* — 10
— Grayana *Ldl.* . . . . . . — 20
Tecoma capreolata . . . . . . — 10
Tropaeolum brachyceras *Hook.* . — 10
— Etoile de Marseille . . . — 5
— Fintelmannii . . . . . . — 5
— Lobbianum *h. Veitch.* . r — 5
— Lobbii tricolor . . . . . — 5

		Thlr.	ngr.
Tropaeolum pelargoniiflorum		—	5
— pentaphyllum *Lam.*	k r	—	10
— Scheuerianum		—	3
— — coccineum		—	3
— Schulzii		—	5
— Zipserii multiflorum		—	5

Wer irgend mit Aufmerksamkeit ihre Eigenheiten belauscht, wird reichen Lohn finden im feinsten Laub und dem zierlichsten Blumenflor: nur gönne man den knolligen Arten ihre Ruhe.

		Thlr.	ngr.
Ulex europaeus *L.*		—	5
Umbilicus pendulinus *D. C.* (Cotyledon umbilicus *L.*)		1	—

Eigenthümliche Blattpflanze.

		Thlr.	ngr.
Veronica amabilis (*hybr.*)	f	—	10
— Andersoni (*hybr.*)	f	—	5
— decussata *Ait.* var. Devoniana	f	1	—

Ganz neue in England gezüchtete Hybride von grosser Schönheit.

		Thlr.	ngr.
— elegans (*hybr.*)	f	—	5
— formosa *R. Br.*	f	—	5
— Fortierii (*hybr.*)	f	—	5
— lilacina compacta (*hybr.*)	f	—	5
— — superba (*hybr.*)	f	—	5
— Mildensis (*hybr.*)	f	—	10
Veronica salicifolia *Forst.* (Lindleyana *hort.*)	f	—	5-10
— Salterii (*hybr.*)	f	—	5
— speciosa *Cunningh.*	f	—	5
— splendida (*hybr.*)	f	—	10
— superba „	f	—	7
— Thibautii „	f	—	10
— Verschaffeltii „	f	—	10
— violacea purpurea „	f	—	5

Dankbare Gattung fürs freie Land. Vorzüglich dankbar blühen die neuen Hybriden.

		Thlr.	ngr.
Viburnum japonicum *Spr.*		—	10
— macrocephalum *Forst.*		1	—

Die Grösse der Dolden übertrifft alles Dagewesene in dieser Gattung.

		Thlr.	ngr.
— plicatum *Thbg.*		1	—
— Tinus *L.*		1/6-1	—
— — foliis variegatis		—	10
Weinmannia caripensis *Lam.*		2	—

Die netten vielgetheilten Blättchen erscheinen wie künstlich ausgeschnitten.

		Thlr.	ngr.
Witsenia corymbosa *Sm.*		1	—
Xanthosia rotundifolia *D. C.*		—	5
Yucca draconis *L.* fol. var.		6	—
— recurva *Salisb.*		—	—
Zieria lanceolata *R. Br.*		—	10
— macrophylla *Bonpl.*		—	10

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die nachstehenden Sortimente enthalten, den Forderungen der Zeit angemessen, das Beste und Neueste. Jährlich werden die als undankbar oder geringer blühenden Varietäten ausrangirt, so dass wie bei den Tropen, auch der Freund der Caphauspflanzen eine reiche Auswahl findet. Die durch glückliche Vermehrung begünstigte Preiserniedrigung wird, hoffe ich, gerechte Anerkennung finden.

I. Azalea.

Die Preise beziehen sich auf buschige Pflanzen — frisch veredelte oder vorjährige Stecklinge werden mit 50 % Abschlag notirt.

Varietäten von A. indica L.

I. Aeltere.

	ngr.
1. Adolphi fl. pleno *v. Houtte*	10
2. alba	5
3. — flore pleno	10
4. — insignis *Rinz.*	8
5. — magna *de Fraser*	10
6. — striata *Liebig*	10
7. — triflora *Knight*	10
8. Alexander *Verschaffelt*	10
9. amaranthina *Makoy*	10
10. amoena *Liebig*	8
11. Anaïs	10
12. Ariadne *Liebig*	10
13. augustissima *Knight*	10
14. aurantiaca elegans *Knight*	10
15. — superba	8
16. Aurora *Knight*	10
17. barbata *Knight*	10
18. Baron von Hügel *Liebig*	10
132. Beali	15
19. Beauté d'Europe *Demarcq*	15
20. blanda *Knight*	10
21. Calypso *Knight*	10
22. carnea floribunda grandiflora	10

		ngr.
23.	carnosa *Knight*	10
24.	cerentola *Knight*	10
25.	Cliveana	5
26.	coccinea elegans	5
27.	— grandiflora	5
28.	color di lacca *Knight*	10
29.	Comte de Flandre	10
30.	Crimson	10
31.	cuprea splendens *Rinz*	10
32.	— superba	10
33.	Danielsiana	5
34.	— superba *Rinz*	10
35.	Dawsonii *Knight*	10
36.	decora *Knight*	10
37.	delicata *Ivery*	10
38.	— *Van Houtte*	10
39.	Diana *Knight*	10
40.	Duc de Brabant *V. Houtte*	10
41.	elata	10
42.	— plena	10
43.	electa *Liebig*	10
44.	elegans	10
150.	Eulalia van Geert *Geert*	15
45.	expansa *Smith*	8
46.	exquisita *Knight*	10
47.	flammea *Liebig*	10
48.	Flora *Knight*	10
49.	formosa *Ivery*	10
50.	— *Liebig*	10
51.	formosissima	10
52.	Frazeri	5
53.	Friedrich August *Liebig*	8
54.	fulgens *Knight*	5
55.	Gabriele *Liebig*	10
56.	Gledstanesii	8
57.	Glory of Sunninghill	10
58.	grandidissima	5
144.	Herzog Adolph v. Nassau *Mrdn.*	½-1 *Rℓ.*
145.	Hrzgin. Adelheid v. — *Mrdn.*	½-1 „
146.	— Pauline v. — *Mrdn.*	½-1 „
59.	Hibbertii	5
60.	Hookeri superba	5
61.	illustris nova *Versch.* extra	10
62.	Isabella *Liebig*	10
63.	Königin Marie *Liebig*	8
64.	lactea floribunda *Liebig*	8
65.	lateritia	10
66.	ledifolia fimbriata	5
67.	liliiflora	5
68.	Louis Napoléon	10
69.	macrantha purpurea	10
70.	manifica *Knight*	10
71.	magniflora *Knight*	8

		ngr.
72.	Mars	8
73.	Melbournei *Knight*	10
74.	Mignonne *Liebig*	8
75.	Millneri	5
76.	mirabilis *Knight*	10
77.	munda	5
78.	mundula *Knight*	10
79.	neriiflora rubra	5
80.	nivea flore pleno *Mardner*	10
81.	notabilis *Liebig*	10
82.	ornata *Liebig*	10
83.	picta	5
84.	Prima Donna *Knight*	10
85.	Prince Albert *Knight*	10
86.	— Camille de Rohan *V. Houtte*	10
87.	— de Joinville *V. Houtte*	10
88.	— Leopold *V. Houtte*	8
89.	Prinz Rohan *Liebig*	10
90.	princeps	8
147.	Prinzessin Mathilde v. Anh-Dess. *Mrdn.*	½-1 *Rℓ.*
148.	— Friedrich v. Anh.-D. *Mrdn.*	½-1 „
149.	— Hilda v. — *Mrdn.*	½-1 „
91.	purpurea magnifica *Knight*	10
92.	— superba	10
93.	Queen perfection	10
94.	refulgens *Knight.*	10
95.	regina	5
96.	Reine des Belges	10
97.	— de Portugal	8
98.	— Louise *V. Houtte*	10
99.	rosea pavetta	10
100.	— punctata	10
101.	rubra	5
102.	Salopensis *Knight*	10
103.	Selima *Liebig*	10
104.	semi-double pink	8
105.	symmetry *Lee*	10
106.	Smiths bright pink	5
107.	— coccinea	5
108.	— fine large pink	5
109.	— pink	5
110.	— scarlett pink	5
111.	— speciosa	5
112.	splendida *Knight*	5
113.	striata formosissima *V. Houtte*	8
114.	superba venusta	5
115.	Susanna *Liebig*	8
116.	Stanleyana *Davies*	10
117.	Thisbe *Liebig*	10
118.	Toinette *Delmotte*	10
119.	tricolor (nec plus ultra)	10
120.	variabilis	5

		ngr.
121.	variegata	8
122.	venusta *Liebig*	8
123.	versicolor *V. Houtte*	10
124.	vittata Fortunei *Fortune*	10
125.	— punctata *Fortune*	10
126.	— rosea	10
127.	Victor Jacquemont *V. Houtte*	8
128.	Azalea amoena *Ldl.* et *Hook.*	10
129.	— crispiflora *Hook.*	10-30

Wenn sie nur irgend der mir vorliegenden Abbildung gleicht, so ist sie mit ihren gekräuselten Blumen die prachtvollste aller Azaleen.

130.	— sinensis *Lodd.* var. lutea	15
131.	— — *Lodd.* var. versicolor	15

Die folgenden Abtheilungen sind alle in Herbstveredlung vorräthig.

II. Neuere.

à Stück 10 Ngr.

152. Abd el Kader.
153. Boeckmannii.
154. Charlotte Corday.
155. Diamant.
156. Elvira.
157. Eugenia.
158. Felicitas.
159. Franklinii.
160. Franz Joseph.
161. Friedrich II.
162. Goethe; ausgezeichnet!
163. Hammonia.
164. Henriette Sonntag.
165. Jeanne d'Arc.
166. Jenny Lind.
167. Libussa.
168. Lisbeth.
169. Maria Stuart.
170. Meda.
171. multiflora alba.
172. — rubra.
173. Natalia.
174. Oberon.
175. Olympia.
176. Pavonia.
177. picturata.
178. Radetzkii.
151. Reginae *Mrdn.*
179. Sophia.
180. Sophie Schröder.
181. Teutonia.

III. Neueste von Liebig.

à Stück 20 Ngr.

Der Name Liebig hat als Azaleen-Züchter einen so guten Klang, dass ich glaube meinen geehrten Geschäftsfreunden durch Bewerbungen um dessen neueste Züchtungen einen besseren Dienst zu erweisen, als durch die immer viel gerühmten ausländischen Neuheiten, die doch oft so höchst mittelmässig sind.

182. Admiral.
183. Amalia.
184. Amelia.
185. Blanchard.
186. Catharine.
187. Coelestine.
188. F. Dreisse.
189. Gloriette.
190. Lüdicke.
191. Ida.
192. Malwina.
193. Rudolph.
194. Therese.
195. Victorina.

IV. Neueste englische.

à Stück 15 Ngr.

196. Admiration.
197. alba ilustrata.
198. brillante *Scheuermann.*
199. carminata.
200. correcta.
201. Criterion *Ivery.*
202. Duke of Devonshire.
203. — — Wellington
204. Estranea.
205. Iveryana.
206. narcissiflora *S.* et *N.*
207. Stanleyana *Davies.*
208. Trotteriana.
209. Vesta.

V. Allerneueste erst in den Handel gekommene, welche an Schönheit und Blüthenreichthum alle früheren übertreffen sollen.

à Stück 2 Thlr.

211. Bernhard Andrea *Mrdn.*
212. Friedrich Breul *Mrdn.*
213. John Metzger *Mrdn.*
214. Marie von Schönberg *Mrdn.*
215. Meda *Mrdn.*
216. Modèle *Miellez.*

Azalea pontica L.

à Stück 15 Ngr.

132. aestivalis ornata.
133. aurantiaca.
134. calendula.
135. coccinea major.
136. incarnata.
137. jasminoides.
138. lateritia striata.
139. pontica.
140. — variabilis.
141. tricolor.
142. — grandiflora.
143. viscocephala.

II. Camellia japonica L. var.

Abbreviaturen: w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — rch. reich-, und gg. gutgefüllt — anmbl. anemonblüthig — kglb. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — gr. gross — mt. mit — rglm. regelmässig — grbl. grossblumig —

h. hoch — gest. gestreift — gefl. gefleckt — o. oben — Sp. Spitzen. — Besonders schöne sind mit †, die schönsten und prachtvollsten von allen mit * bezeichnet.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen von ½ Fuss, die der zweiten für solche von 1 Fuss und darüber.

471. * Prinzessin von Preussen.

Durch diese Neuheit ist ein wahrer Komet am Neuheitshimmel der Camellien erstiegen, da giebt es keine Tugend, die sie nicht besitzen soll, — ja nach den Beschreibungen aller Garten-Organe und nach der mir vorliegenden Abbildung, muss man sie für ein Wunderkind erklären, denn sie verspricht nichts weniger — als Blumen, von reinstem Weiss, innen mit einem gelben Stern, deren Petalen in **sieben spiralförmigen Parthien** geordnet sind.

Herbstveredlungen à 4 Thlr.

		ngr.	ngr.
1.	Abbate Bianchi, *B. Lechi*; (Emilie Bandiera) roth, eine weisse Linie in jedem Blatt, dachziegelförmig	10	20
2.	†Abbate Franzini, *P. Besson*; dichtgefüllt dachzglf. dkl. carmin, mit bläulicher Bordüre	10	20
3.	Adelaide, dkl. weinroth dichtgefüllt, regelm. dachziegelförmig	30	—
4.	admirabilis, (Maria Luigia di Parma) hscharl. w. gefl pomponblüthig	10	20
5.	*Adrien Lebrun, (Graulhieri) krschrs. dachziegelförmig	10	—
6.	Agnesiae, rosa zglf., Form der imbricata	10	—
7.	alba, reinweiss dachziegelförmig	7	10
367.	— briantata *h. Tetsch.* weiss, dachziegelförmig	—	20
8.	— Casoretti, (alba prima) reinweiss mit gelben Schattirungen	10	—
9.	— fenestrata, (alba nova plena) reinweiss dachziegelförmig	10	20
10.	— grandiflora, weiss kugelblüthig dicht gefüllt	10	20
11.	— illustrata, (Waltonensis, Shirvings Seedling) rnw. zglf. gg.	10	15
12.	— Londonensis, (allnuts alba, candida superba) rw. gedrückt kglblth.	10	15
13.	Alexandre le grand.	10	20
14.	Alexina *Hugh Low* et *Co.*; rothw. carm. gefl. gestr. grbl. regelmässig	10	20
15.	Allnut superba, dunkelscharlach, regelmässig	5	10
16.	*Alsina d'Italie, rosa weiss gefleckt u. getuscht, dachziegelförmig	15	—
17.	althaeiflora, (Thunbergiana) zinnob. scharl. anemonblumig	5	10
18.	*amabilis, *Smith*; (d'Amerique, de New-York) lbhdklrs. inn. hell	10	20
416.	Amalia Croff *Croff*	15	—
20.	Amalthea, lachsfarbig sehr gross	10	—
21.	Amely de Baye	5	10
22.	*americana *Dunlop*; rs. fast w. carmin gestr. u. punktirt	10	20
23.	*anemonaeflora striata, dunkelkirschroth weiss gefleckt	10	—
439.	Annette Franchetti *Mielley* lilacarmin fein weiss gestreift dunkelrothen Anflug, ausgez. zglf. sehr reich blühend und gross, ganz neu!	30	—
24.	Annibal, dunkelkirschroth kugelblüthig	10	—
368.	Antoinette Bisi	—	20
25.	Apollinea, rosa reichgefüllt dachziegelförmig	10	—
369.	*Archiduca Fernando, kirschroth mit weissem Band, schattirt	80	—
26.	*Archiduchessa Augusta, *Gaetano di Vizo Corsi.*, (Puccini) dklweinrt. m. w. Randstrf. ins blaue spielend Rand dachzglf. shalförm.	10	20
27.	*Archiduchesse Marie, *van Houtte*; herrl. dklkrschrt. vollk. zglf. in d. Mitte eines jeden Blumenbl. mit breiten w. rgestr. Bändern durchzogen	15	—
28.	Archinto, carmoisin schattirt, dachziegelförmig	10	—
29.	ardens superba, reinweiss, gutgefüllt	5	—
414.	Auguste Delfosse, rosa scharlach, mit lichten Rändchen und w. Streifen zglf. extra!	30	60
30.	†Augustina superba, rosa oben weiss marmorirt, dachziegelförmig	10	—
31.	Aulica, *Loddiges*; zartrs. m. w. Rändchen und dkl. Adern	20	—
32.	Ayez, *Casoretti*; rosa grossblumig reichgefüllt	10	—

		ngr.	ngr.
33.	Baltimoreana, *Feasti*; weiss mit rosa Streifen u. Puncten, sehr gross	10	—
370.	Baraffi	30	—
34.	Barni d'Italie, (non Carswelliana) ponceau weissbandstreifig dchzglf.	10	—
35.	Baronne d'Udekem, *Jacob Makoy*; lachsfarbig m. w. Mittelstr.	10	20
36.	Bazzoni d'Italie, corallroth, unregelmässig gefüllt	10	20
37.	Bella di Firenze, *Ces. Franchetti*	20	—
38.	†Beali rosea *Hugh. Low* et *Co.*, lachsrosa, Centifolienartig	10	—
371.	Belle della Petrega	30	—
19.	— — Pistoja	30	—
39.	†Belliformis, *Mariani*; dachziegelförmig, mennigeroth	20	30
40.	Bellini major, zinnoberroth, rosenförmig gut gefüllt	10	20
41.	Benneyi, *Smith*; rosacarm. unregelm. gestr. ziegelförmig	10	—
42.	Bergama, gelbrosa mit weissen Mittelstr. u. w. geränd. Blättern	10	—
43.	Bérénice, *Mariani*; rosa carm. oft weiss gestr. ziegelf.	10	—
44.	Bettegno, carmin mit weiss gestreift, reich gefüllt	10	—
45.	bicolor	10	—
46.	Bijou de la Garza, *G. Ugoni*; (Gioja de la Garza), rsw. u. carm. bestrahlt	10	—
47.	†Bittiniana (d'Italie), carmrs. innen feine weisse Streifen, ziegelf.	15	—
48.	Blackbourniana, dunkelcarmin fast anemonblüthig	10	15
49.	Bostonia, grösstentheils dunkelroth, regelm. dachziegelförmig	10	—
50.	*Brillante, *Casoretti*; (Briantina), weiss sehr gross ziegelf.	10	—
51.	*Brocki, kirschroth weiss gestreift ziegelförmig	10	—
52.	Brooklyniana, carminroth innen hell	20	—
372.	Brownii vera	—	20
54.	Bruceana, dunkelkirschroth päonienförmig	10	—
55.	Buckliana	10	—
56.	Buff, leibfarbig regelmässig gefüllt dachziegelförmig	—	10
57.	*de la Reine, *J. G. Varenbergh*; w. Grd. m. lcht. Lackglz. zglf.	10	20
58.	*Camillo Brozzoni, *Cam. Brozzoni*; Form d. Duchesse d'Orleans, Pet. d. Peripherie kirschroth die anderen weiss	20	—
5I.	*Campo Molendini, *Berlèse*; carmin mit weissen Streifen, sternf. in d. Mitte etwas gewirrt	30	—
60.	candidissima, schneeweiss dachziegelförmig	5	10
373.	Caragnini	20	—
62.	Carl XII.	10	—
63.	Carbonari, glühend dklcarm. reiche neue Färbung, voll rund pompf.	10	—
64.	*Carolinae, weiss kugelblüthig	7	10
374.	Carolina Linguiana	30	—
65.	Caroline Smith, *Boll.*; shrgr. lebhaft rosa mit weissen Mittelstreifen	10	—
66.	*Carswelliana (Lord Kur), nouv. hllcarm. jed. Pet. mit w. Mstr.	10	—
417.	— — alba	20	—
67.	caryophylloides, *Hugh Low* et *Co.*; w. lebhaft mit carmin geflammt und gestreift, vollkommen dachziegelförmig	10	—
61.	†Catharina Longhi, dunkelcarmin, grosse Form	10	—
68.	Cavendishii	10	—
69.	Celsiana, dklkirschroth, grossblättrig, regelmässig gefüllt	5	10
375.	centifolia rosea, zartrosa dachziegelförmig	—	20
376.	Cerito d'Italie, weiss mit rosa gestreift, dachziegelförmig	—	15
70.	*Chandleri, reich dklscharl. oft weiss gefleckt	10	—
71.	Charlemont, lebhaft rosa, kugelblüthig	5	15
72.	Cliveana, tiefrosa fast anemonblüthig, sehr gross	10	—
73.	Clowesiana, (Marrochetti, Fanny Elsler) weiss m. wenig rs. Streifen	10	—
377.	Clymene	—	20

		ngr.	ngr.
74	Cocki vera, (Triomphe de Gand) dklrt. anemf. shr. gr. gutgefüllt . .	10	—
75.	Coelestine, bläulichrs. aussen zglf. innen kglbth.	10	20
76.	Colombo, rosa dachziegelförmig	10	—
77.	Colvilli, paeonfm. carmin punkt. gestrft. sehr gross	5	10
78.	*Commerzienrath Lihau, *Geitner*; diese schöne Camellie ist untadelhaft, ihre Farbe ist vom schönsten feurigen reinen Rosa und es ist kein Blättchen, welches ausser den ceriserothen Aederchen den weissen Mittelstreifen nicht durchscheinen liesse. Die sich öffnenden Knospen zeigen rein weisse Spitzen	20	60
79.	Commensa, *Makoy*; dunkel carmin gross regelmässig	10	—
80.	composita, lebhaft rosa dachziegelförmig	15	—
81.	Comte Carraccioli de Italie, rosa grossblum. w. gestreift reglm. voll .	10	—
378.	— de Neipperg, rosa weiss gefleckt dachziegelförmig	—	20
82.	— de Paris, *van Geersdaele*; wsrs. mit dklrs Str. regelm. . . .	10	20
83.	* — de Spaur, weinrosa schalförmig o. weisse Spitzen	20	—
379.	*Comtesse Carrini, w. m. rs. angehaucht m. rs. gestrft dchzglf. . .	—	20
85.	— de Castelbarco, dklcarm. gefl. o. m. w. Strahlen zglf. sehrgef.	20	—
86.	— de Hartig brennend roth, mit Streifen, regelmässig	15	—
87.	— Moncenigo	30	—
88.	— Ottolini, *Ces. Franchetti*	20	30
89.	†concinna, dunkelroth dachziegelförmig regelmässig	15	—
90.	conspicua, *Beck*; (Imperatrice. latifolia macrantha) rs. dklrt. gead. m. weissen Rändchen halbvoll	10	20
91.	*Coquetti, *Tourrès*; feurig scharlach mit weiss. Sp. und Streifen zglf.	20	30
93.	†cruciata, meist weiss gefleckt	10	20
380.	* — de Pronay zartrosa, jedes Blatt mit weissen Streifen	—	20
94.	curvatifolia	10	—
95.	Dahliaeflora, regelm. feurig roth	5	10
96.	†Daniel Webster, *Boll*; carmin fein weiss gestrichelt dachziegelförmig	15	—
97.	Darsii, dunkelroth oft weiss gefleckt, geballt kugelblüthig.	10	—
98.	†Daviesii, *Davies & Co.*; granatroth m. Büschen dicht gefüllt. zglf. .	10	—
99.	Decandollii, lichtrosa leicht gefüllt	5	10
100.	*decora, rosa purpur sehr gross gutgefüllt	—	20
381.	†decurrens rosea, rosa dachziegelförmig	—	20
382.	Delairii, dunkelrosa dachziegelförmig	—	15
101.	delicatissima, rosa mit carmin Streifen, paeonienförmig	5	10
103.	Devriana	20	—
104.	Diadème des fleurs	15	—
105.	†Diva Maria, rosa regelmässig	10	—
106.	Divonia d'Italie, blassrosa mit carmin regelmässig gestreift dachziegelf.	10	—
107.	Dobreii, hellcoquelicot, starkgefüllt kugelblüthig	20	—
108.	*Docteur Horner, *Verschaffelt*; prächtig rosa mit w. Mittelstr. zglf. .	10	20
109.	†Donkelaari, dunkelkirschroth weiss gefleckt fast leer aber schön . .	10	20
111.	Dorina Lechi, feurig carmin rosa weiss gefleckt und gest. regelmässig	25	—
112.	Dorsetti, (Rex Georgius Parthoniana); schmtzg. rs. lederfarb. anemf. sh. gr.	5	10
113.	*Duca Serbellino, *B. Lechi*; aurora rs. gr. u. breit, wie eine Centifolie	15	—
114.	Duc de Bretagne, *Drouard*; (Dux Aemoricanus) rs. w. gest. gg. herrlich dachziegelförmig	15	—
418.	Duc de Chartres	20	—
419.	— of Lankaster	30	—
115.	— de Litta, *Mar.*; rosa mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig	10	—
383.	Duchesse de Berry	20	30
384.	— de Nemours, weiss mit carmin gestreift, dachziegelförmig . .	—	15

		ngr.	ngr.
116.	Duchesse d'Orleans, (Duc d'Orl., Reine de Cam., nobilissima nova, Regina, Reine d'Angleterre, Queen Victoria), fleischf. carm. punct. gestr. zglf.	10	20
117.	† — of Nordhumberland, *Lee & Co.*; w. rs. gefl. und glb. dachzglf.	15	—
118.	†Dryade hellrosa mit weissen Mittelstreifen ziegelförmig	15	—
119.	ebufnea, weiss oft mit rothen Flecken, gross und kugelblüthig gutgef.	10	—
120.	Eclipse, *Press*; (Pressi, Regina Gallicarum), röthl. w. gestrich. kglbl.	10	15
385.	Editha	—	20
121.	elata Chandleri, weiss paeonienblüthig	15	—
122.	*elegans, violettroth innen weiss gestrich. grosse Büsche, sehr gross .	7	10
123.	*Elphinstoni, dunkelkirschroth regelmässig gefüllt	10	15
124.	Emilia Campioni; *Abbate Bianchi*; carminroth in bleichroth übergehend mit breiten weissroth geaderten Mittelstreifen	15	—
125.	† — Gavazzi d'Italie, rosa gefleckt und gestreift dachziegelförmig .	10	20
126.	† — grandiflora, rosa mit wenig weissen Flecken, kugelblüthig . .	10	20
127.	— Taverna, scharlach mit weissem Centrum dachzglf. gutgefüllt .	10	20
421.	Empereur Alexandre *Sloane*	20	—
128.	† — de Russie, roth, Mitte weiss gestr. dachziegelförmig	20	—
130.	*Enrico Bettoni, *B. Lechi*; crms. m. e. Krz. gewirrt. Blth. eigenth. Form	10	20
131.	Estheri, *Smith*; blassfleischfb. m. rs. Fleck. u. Punct kglbl. shrgr. gg.	10	20
132.	excelsa, (Rollissoni) weiss unregelmässig	10	—
133.	eximia, corallcarmin ziegelförmig	10	15
386.	Fabio Messimo	—	20
134.	fastuosa, aus Italien, dunkelrosa sehr grossblumig dachziegelförmig .	10	—
135.	Faustino Lechi, zrtrs. w. getuscht dkl. o. lchtroth. gestr. u. gefl. klbl.	10	—
136.	†Feasti, weiss rosa gestreift, sehr gross dachziegelförmig	10	—
137.	felicitas, lebhaft rosa pomponförmig	10	—
138.	*fimbriata alba, reinweiss mit gefranzten Blättern	10	30
422.	Fleur pennoni	20	—
139.	florida, (anemonaefl. micans, Princeps) kirschroth doppelt anembl. . .	5	10
140.	Floy's Virginia, kirschrosa fein gef. dachziegelförmig sehr grossblumig	10	30
387.	Florentina vera, weiss dachziegelförmig	—	20
142.	†formosa (angulans, Anglarsi), rs. carm. mit zinnob. gedrängt monströs	10	—
143.	— Youngii, roth, regelmässige Blüthen	10	—
144.	Forsteri	10	—
145.	Francofurtensis (Wellingtonii, dark fulgens), bräunl. carm. fast zglf. .	5	10
146.	*Fra Arnoldo di Brescia, *B. Lechi*; grosse Blumen atlasrosafarbig mit weissen rosa marmorirten Bändern	30	—
147.	Fréderic le grand (Floy, grand Fréd), rosa carmin sehr grossblumig .	10	—
148.	†Frezzolini, *Mariani*; lebhaft rosa dachziegelförmig	10	—
149.	*fulgens, zinnober carmin pomponblüthig	10	15
150.	— nova, lebhaft roth, jedes Blatt mit weissen Linien, ziegelf. .	15	—
151.	Garibaldi, *B. Lechi*; rosa dunkel geadert, innere Petala gestreift . .	15	—
152.	*Garveyi (*Garviana*); blass rosa m. carmin gefleckt u. punctirt kglblth.	15	—
437.	Géneral Drouot, *Lecomte*	20	—
153.	— Lafayette, *Boll*; rosa mit w. Mttlstrf. auf jedem Blatt regelmässig mit umgeschlagenen lichten Rändern	10	20
154.	Ghittiana	10	—
155.	Ghittiniana (?)	10	—
156.	Gloria de la Isole Borrome, *Rovelli frères*; inn. rs. rthgefl. u. w. gestr. zglf.	10	—
157.	*— del Verbano *Rovelli frères*; carmrs. m. w. Mittelstr. regelm. zglf.	30	—
158.	gloriosa	5	10
423.	Gohlia	20	—
159.	*Governativa aus Italien, dunkelscharlach dachziegelförmig	10	20

		ngr.	ngr.
160.	†Gozzi aus Italien, zartrosa hell gerändert schöngeformt ziegelförmig	10	—
161.	Graf Wartemberg	5	10
162.	grande Duchesse d'Etruria, weiss rosa dunkelrosagestr. paeonienbl.	10	20
163.	*grandidissima superba, dunkelscharlach roth regelmässig gefüllt	7	10
164.	grandis, *Hugh Low & Co.*; hellkirschroth dunkelroth gestreift, äussere Petala dachziegelförmig weiss gebändert Bl. 4" gross	15	—
166.	Grand Sultan, brillant hochscharlach sehr gr. w. gemusch. vollk. zglf.	20	—
167.	*Gretry, *Defresne*, carmin dachziegelförmig	20	—
424.	Guillaume	20	—
168.	Guillaume Tell, *Boll.*; auss. lebh. rs. inn. zrtr. jed. Bl. mit w. Rand	20	—
169.	Gussonia	10	15
170.	†Guthriana, *Hugh Low & Co.*; dunkelcarmin dachziegelförmig	10	—
171.	*Halleyi, *Halley*; blutroth mit weissen Mittelstreifen	15	—
172.	Hannah Moore, dunkel carmoisin mit breiten weissen Flecken	10	—
173.	*Harlequin, *C. Borghi*;	30	60
174.	Helene	10	15
175.	†Hendersonii, (Lombardii, pictorum rosea) rs. oft m. w. Fleck. dachzglf.	10	—
176.	†Henri Favre, lachsroth, in der Mitte heller, schalenförmig	10	20
177.	*heptangularis, licht kirschroth dachziegelförmig	7	10
178.	*heteropetala rubra, schattirt halb pompon dachziegelförmig	10	—
180.	Hosackii, *Floy*	10	—
181.	ignescens	5	10
182.	Il Cygno, weiss durchscheinend geadert mit gelblichen Mittelstreifen	10	—
183.	*Il 22 Marzo, *M. Burdin*; krschrth. w. gerand. u. w. Mttlstr. rosenförmig	20	—
184.	†imbricata, *Dunlop*; (imbr. tricolor. tric. Youngs) rglm. rs. carm. o. w. Fl.	10	—
185.	†Imperatrice de Russie	10	—
186.	incarnata (Lady Humesblush, Ruff lutescens, Maidenblush, flavescens), geröthet weiss dachziegelförmig	5	10
187.	*Innocenza, reinweiss gross dachziegelförmig	10	—
425.	Innominata	30	—
188.	Insubria aus Italien, (l'Insubria) rs. w. gest. mittlgrs. zglf. gutgef.	10	20
189.	†Jacksonii, *Verschaffelt*; lebh. dkscharlach m. w. Mttlstr. sch. gew. zglf.	20	20
388.	Jarba, rosa mit weiss bandirt grossblumig dachziegelförmig	30	—
190.	Jardin d'hiver, *Jardin d'hiver*; dunkelroth Mitte rosa gross dachziegelf.	15	—
191.	Jaune de la Chine, *Fortune*;	30	—
194.	†Juliana, (Calypso, Tweediana superba, Climax, Comte Rambaldi (weiss rosa wenig gestreift	10	—
195.	Jupiter, *Smith*; carmin mit regelmässigen weissen Randstreifen dchzglf.	30	—
196.	*Jussieui, Jussiana; carmin rosa regelmässig	10	—
389.	*Justinia, lebhaft rosa ziemlich grossblumig dachziegelförmig	—	20
197.	King, (spectabilis maculata, Clusii, Linkii,) weiss sahnfarbig schimmernd, mit rosa Strichen und Punkten	10	—
390.	King of the Camellias	40	—
198.	Kissi	7	10
199.	Lady Eleonora Campbell, hellscharlach leichtgefüllt	7	10
200.	† — Hill, weiss carmin gefleckt und gestreift kugelblüthig	10	—
201.	*Landrethii, Jacksonii; lieblich rosa regelmässig	15	—
202.	latifolia macrantha, hellrosa pomponblüthig	15	—
203.	La Previdenza, lebh. roth, jedes Blatt mit weissen Mittelstr. zglf.	30	—
204.	*Leana superba, cocc. magna, Palmers Beali, Sieboldtii), lachsfarb. innen rosa oft weiss, aussen dunkelroth	25	—
205.	Lechiana nova aus Italien, hellweinfarbig dachziegelförmig gr. Bl.	10	—
206.	*Leda, aus Italien, weiss scharlach gestreift	10	20

		ngr.	ngr.
207.	Leonardi, leicht rosa lachsfarbig anemonblüthig	10	—
208.	Leopoldine d'Italie (Princesse Leopoldine), röthlichweiss roth gestreift und punctirt, fast regelmässig	10	—
209.	Lefèbvriana, dunkelcarminrosa fast ziegelförmig, Mitte gewirrt	15	—
210.	Lippoldi	10	—
212.	Lord Peel, *Alex. Verschfft.*; hellkirschrothe Mitte mit w. Rand zglf.	15	20
213.	Lovely rose	10	—
214.	†Lowii, *Hugh Low & Co.*; neu lachsrs. m. w. Mttstr. regelm. zglf.	10	20
391.	lutea Casoretti	40	—
392.	Lysantha, weiss röthlich mit roth gestreift kugelförmig	—	20
215.	Mackoyi (Low's Macesto); dunkelroth in rosa schimmernd	10	30
216.	maculata superba, weiss rosa gestreift kugelblüthig	15	—
415.	*Madame Picouline, dkl. kirschrth. flach rosenblüthig extra schön	60	—
217.	Madonna, weiss mit carmin gestreift dachziegelförmig	10	—
218.	Magdalena, hellroth, mit weissen Streifen und Bändern rosenförmig	10	20
394.	*magnifica rubra, carm. m. w. gelicht. u. hochrt. schatt. Bl. gekerbt zglf.	—	20
219.	magnificent, *C. Borghi*	10	70
393.	Manasse	—	20
221.	Manzoni	10	—
222.	Marchioness of Exeter, *Priaulx*; grsstr. zartrosa ziegelförmig	10	20
223.	Marguerite Lechi, *B. Lechi*	30	—
225.	*Marianne Trivulgia, *M. Trivulgio*; w. m. carm. gestr. u. gefl. zglf. gg.	10	20
226.	*Maria Theresia, gelblich rs. m. dkl. carm. Punkt u. Fl. gewölbt zglf.	20	—
438.	Maometto, *Croff.*; braunroth, zglf.	40	—
227.	*Mathotiana, *Mathot.*; schönste und grösste regelmässige dachziegelförmige Blume, scharlach mit rosa Reflex	25	—
440.	— alba, *Miellez*; schneeweisse grosse sehr elegante Blume von der schönsten Dachziegelform, sehr reichbl., ganz neu	30	—
426.	Mazarelli	15	—
228.	Mazeppa *Mariani*; reich kirschroth, sehr gross, dachziegelförmig	30	—
229.	*Mazuchelli, hellcarmin, mit weissen Streifen, dachziegelförmig	10	20
230.	Medica, fein carmin scharlach pomponblüthig oft regelmässig	10	15
232.	*Meneghini, carmin, regelmässig weiss gestreift	15	—
233.	mexicana nova, *C. Borghi*	30	—
234.	*miniata, *Hugh Low & Co.*; scharlach mit w. Herz rosa u. dachziegelf.	10	20
235.	*minuta, *Hugh Low & Co.*; bläulichrosa, oft gestreift dachziegelförmig	10	—
236.	†Mirenda rosea, rosa dachziegelförmig	20	—
427.	Mistress Uboldi	20	—
237.	*Monarch, *Halley*; dunkel lachsfarbig, weiss panaschirt, kugelblüthig	20	—
238.	Monetti, metallglänz. carmin dkl. Linien fast regelmässig, ziegelförmig	20	—
239.	*Monteroni vera, gelblich weiss rosa gestreift, dachziegelf. sehr gross	20	—
240.	*Mrs. Abby Wilder, *Marschall Wilder*; w. selten rosa Str. reglm. zglf.	10	20
241.	Murrayana vera, carmin scharlach dachziegelförmig sehr gross	10	—
242.	myrtifolia alba, *Herbert*; (Schachkönigin, albicans, Princesse Royale) dunkel kl. rosa spitzblätterige Blume dachziegelförmig	10	—
243.	Napoleon, *Defresne*; carmin dachziegelförmig	15	—
244.	Nassiana, hellcarmin, mit weissen Streifen, dachziegelförmig	10	20
429.	Neobaracensis	20	—
246.	*Nerone, *Paillet*; hochscharlach, ins bläuliche spielende Rändchen	15	—
248.	*nitida, *Chandler*; hellscharlach mit weissen Randstreifen dachziegelf.	15	—
249.	†Normanni, *Ambr. Verschaffelt*; $3^1/_2$" gross, ausgez. schön rosa zglf. Blume, nach dem Rande heller, oft weiss schattirt	20	40
250.	†nymphaefolia, lebhaft kirschroth in rosa, dachziegelformig	15	—

		ngr.	ngr.
251.	ochroleuca, weiss mit gelbem Schimmer, fast zglf. st. und gutgefüllt	10	—
252.	Onore de Pippiana, *Ridolfi*; weiss mit carmin gestreift dachziegelförm.	20	—
395.	* — della Torre, schönstes rosa, jedes Blatt weiss bandirt	30	—
253.	*optima, *Hugh Low et Co.*; lebh. rosa m. carm. Strf. gr. zglf	30	—
254.	*Orphio, (Orfeo), carmin helle Mittelstreifen regelmässig	10	20
396.	Othello, roth mit weiss bandirt grossblumig ranunkelblüthig	—	20
255.	Oxoniensis (mutabilis maculata amplipetalà), flattrig zart hllrs grsblttr. lg.	10	—
256.	†Parini, *Casoretti*; w. m. glb. Schimmer, selten rth. Strf. paeonf.	7	10
257.	Parmentieri grandiflora, *Smith*; rosa ins kirschrothe rglm. gef.	5	10
397.	*parvula, lebh. rosa inn. zartrosa kleinbl. extra zu Bouquets	50	—
258.	*Paul und Virginie, *Grüneberg*; weiss rosa	20	—
259.	*Pawlikowsky, *Grüneberg*; schön rosa dachziegelförmig	10	—
260.	†Pensylvanica (Longstreathii), lebhaft roth mit rosa Sch. und breiten weissen Mittelstreifen dachziegelförmig	20	—
261.	Percevalii, *Hippert*; dunkelroth, unregelmässig	10	—
262.	*peregrina, weiss carmin gestreift wie eine Nelke	15	—
263.	*perfecta, *Chalmer*; bald hell, bald dkl. gestr. w. gef. zglf.	10	20
264.	Perfection, *Cunningham*	10	—
265.	† — *Palmer*; (Palmer's Belay, Palm. Cavendishii, Palm. Seedling, Theophiliana striatiflora) carmin schön dachziegelförmig	10	—
398.	†Piccioli, lebhaft rosa zuweilen weiss gefleckt dachziegelförmig	40	—
267.	picta grandiflora, *Comte Caraccioli*; wssl. rs. dklrt. u. krschrt. gestr.	10	—
268.	pictorum coccinea, *Jamma*; dklscharl. zglf. grossbl.	10	20
269.	†Pio IX., *Milan*; carm. nach d. Mitte rosa u. w. auslauf. sternf.	10	—
270.	Pisani d'Italie, weiss, rosa od. carm. getuscht u. lin. sehr gef. zglf.	20	—
399.	*Pitonessa, lebhaft rosa kirschroth zuweilen weiss gefleckt	40	—
271.	Pius IX., *Mariani*; dklrs. i. d. Mtt. m. w. Streifchen, zglf. etwas spitzblttr.	25	—
272.	*platypetala, durchscheinend röthlich weiss, rothgestreift flach paeonf.	7	10
273.	pomponia, weiss, paeonienblumig, grossblättrig	7	10
430.	Powathan	20	—
275.	†praeclara, lebhaft rosa, dachziegelförmig	10	—
276.	*Pratti, *Buis*; hellrosa, jedes Blatt m. w. Mittelstrich, gr. gg. ziegelf.	10	20
277.	†Preston's Eclipse, rosa, kugelblumig, schön	10	20
278.	princeps	7	10
279.	*Prince Albert, *Chandler* and *Sons*; (Albertus) hllrs. carm. punct. kglbl.	10	—
400.	— of Wales, lebhaft carm. weiss durchsichtig, dachziegelförmig	—	20
280.	*Princesse Bachiochi, *J. Boffi*; dklzglrt. m. w. Mittelstrich zglf. rglm.	10	20
281.	* — Charlotte, w. u. rosa ins gelbl. spielende Bl. Bau extra	30	—
431.	— Marianne	20	—
282.	— Marie, *V. Houtte*; lachsrosa mit weissen Mittelstreifen	10	15
283.	— Mathilde, *Spini*; rosa oft weiss gestreift regelm.	20	—
432.	— Rapigliosa	20	—
284.	*Princess Royal, *Hugh Low et Co.*; dklrosa. aussen zglf. inn. gewirrt.	10	—
285.	Principe di Salerno, *Gullino*; rein weiss, zglf. gr.	20	30
286.	— Doria, *B. Lechi*, dunkelblutroth, prachtvoll.	20	—
288.	Pronayana	10	—
289.	†pulchella, hochrosa kugelblüthig gutgefüllt	10	—
290.	punctata (Gray's invincible, Imperialis splendida) rs. gstr. punct. paeonf.	7	10
291.	Queen of Danemark, *Hugh Low et Co.*; leucht. kirschrth. rw. gestr. spärl. zart rosa mit weisser Bordüre	30	—
292.	*Queen of England, zrtrs. rglm. w. Strf. auf jed. Bltt. zglf.	10	—
293.	† — — — *Fiedler*; (Queen of great Britain) rosa jedes Blatt mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig	10	20

		ngr.	ngr.
294.	*Queen Victoria, *Priestley*; dunkelroth mit weissen Mittelstreifen . .	10	—
401.	Radeschio.	20	—
295.	*radiata, (Marchese Ridolfi); rosa mit dunkeln Adern, ziegelförmig. .	20	—
296.	*Rappalino aus Italien, lbh. rosacarm. in jed. Blatt w. Mttlstr. zglf. .	30	—
297.	Ravesiana (Futtung, speciosa, Bozeana, Parksii vera, Palmer's striped, Waratah, Palm. carnea), dkl. corallr. monst. anmblt. grossbl.	10	—
402.	Rex d'Italie lhh. dklrs. mit w. gestr. dachziegelförmig	20	—
298.	Reevesiana (Angresciae Reevesiana, amoena, Rossi vera, Reyndersii rosaefl.) dpp. anmbl. hllscharl. dklrs. zglf. halb gef. gr. Blüthen. . . .	10	—
299.	Reine des fleurs, *Donkelaer*; dklcarminroth oft mit w. band.	10	—
403.	— des Vierges, zartrosa gelblich ranunkelblüthig	20	—
433.	— Louise	20	—
404.	Richardsonii.	20	—
300.	*Ristorii aus Italien, dklfleischrosa mit breiten w. Bänd. u. Streifen.	30	—
301.	Robertsoni, leuchtend dunkelscharlach rglm. u. gross.	10	—
302.	Roi Leopold, *Defresne*.	15	20
303.	Rollinsoniana, rosa.	10	—
304.	Romaniensis, *Mariani*; w. m. glbl. Sch. u. rth. Strf. u. Fl. zglf. u. gr.	10	20
305.	†rosea perfecta nova, prächtig rosa	15	—
306.	— plena, rosaroth regelmässig gebaut, gutgefüllt	5	10
307.	Rose de la Chine	15	—
308.	†Rothschildiana, *Hugh Low* et *Co.*; gr. gg. fleischf. m. weissen Streifen dachziegelförmig	15	—
309.	rubescens, *Hugh Low* et *Co.*; lachsr.w. linirt, rund Bltt. rglm. . . .	10	—
310.	rubra plena, dunkelroth, regelmässig gefüllt	5	10
405.	rutilans	20	—
311.	*Saccoi aus Italien (color di lacca), blassrosa m. breiten w. Str. dchzglf.	10	20
312.	* — nova (Alfida, Alcina Augustina superba etc.), rosa dachziegelf.	15	—
313.	Samailoff, blutrth. braun gead. m. w. Mittelstr.	10	—
406.	*Sarah Trost, lebhaft rosa gefleckt innen gelblich	60	—
314.	Schiavone (Zavoni, il Roberti), rs. mit w. Mittelstr. zglf.	10	20
315.	*sericea striata, schönrosa mit regelm. w. Mittelstr. dchzglf.	20	—
316.	*Serra, ganz blassrosa dunkel gestreift u. punktirt kugelbl.	20	—
317.	Sherwoodii, *Sherwood*; lbh. kirschroth w. gestr. zglf.	15	—
318.	Soulangiana plenissima, d'Italie, carmin rosa regelmässig.	15	—
434.	Sovereign. *Low*.	15	—
320.	spiralis nova, Ital., carmin scharlach mit weissen Streifen, dachziegelf.	10	—
321.	splendens	10	15
322.	Spofforthiana vera, weiss fein carmin gestreift	15	—
323.	squamosa, carmin mit kleinen Schattirungen, oft weiss eingefasst . .	10	20
324.	Strombio, aus Italien, weinroth grossblumig, gutgefüllt	10	—
325.	Suglio (Sorvii), scharl. ins rosa, zglf. (einen Stern bildend).	15	—
326.	sulcata (Belle Irène), w. gr. Bl. mit w. Mittelstr. zglf.	10	15
327.	Sweetii, zartrosa roth punctirt und gestreift kugelblüthig	10	—
328.	†symmetrica, neu rosa zglf. Musterblume.	10	—
329.	Teutonia, *Grüneberg*; (Victoria and Albert), oft rosa, oft weiss, oft gestreift an derselben Pflanze, dachziegelförmig.	10	20
330.	Theresa Marchesa d'Ambra, aussen rosa innen dunkelrosa oft geadert zglf.	30	—
331.	Theresiana.	10	—
332.	Thomasini (Thomasii d'Italie), weinrosa oft weiss gefleckt dachziegelf.	15	—
333.	Thompson superba, zinnober carmin Rand dicht pomponblth. . . .	15	—
407.	Tisiphone, feurig kirschroth regelmässig dachziegelförmig	20	—
334.	*Torinelli d'Italie, prächtig rosa, eine Centifolie	25	—

No.	Sorte	ngr.	ngr.
335.	*Traversi plenissima (mut. Traversi), rscarm. weissl. geränd. gebänd. dachziegelförmig	10	20
336.	tricolor, Grund weiss, breit carmin gefleckt halbgefüllt	10	15
435.	Triomphe de la ville de Ciani	15	—
338.	* — de Milan. weiss lebhaft roth gestreift gross	10	—
337.	*triumphans (triumphans de Gand), sehr gr. h. brillantroth rs. kglbl.	10	15
339.	Tsubacki	10	15
408.	Uhlande, weiss zuweilen rosa gefleckt innen gelblich	60	—
340.	Vandesiana carnea, dunkellachsfarbig sehr regelmässig dachziegelförm.	10	15
341.	— superba, hochkirschroth brennend regelmässig gefüllt	5	10
342.	Van Houttei	10	—
343.	variegata plena, lichtrosa mit weissem Fleck, leicht gefüllt	5	10
344.	— superba	10	—
345.	†Venera, lebhaft carmin, oft weisse Streifen, dachziegelförmig . . .	10	—
346.	venosa (Theresiana, Pompon gris., paeniflora ,aurea), weisslich rosafarbig, mit rothen Adern durchzogen	10	20
409.	Venturi (Lechi)	20	—
347.	Verger, zartrosa, dachziegelförmig, Mitte gewirrt	15	—
348.	†Verschaffeltiana, *Alex. Verschaffelt*; lbh. rs. m. w. Mittlstr. rgl. sch. zglf.	15	—
349.	Vexillo di Flora, rosa dachziegelförmig sehr gross	10	20
410.	— Lombardo, lebhaft rosa grossblumig dachziegelförmig	—	20
350.	*Victoria Antwerpensis, milchw. m. dklrt. leicht gestrich. fast zglf. .	10	20
351.	— Magnesii, rosa mit breiten weissen Mittelstreifen dachziegelf. .	20	30
352.	villageoise, röthlichweiss, mit roth punktirt	10	20
353.	*violacea superba (exuberans), schön carmin gutgefüllt kugelblüthig .	10	—
354.	Visiano d'Italie, feuerroth	15	—
411.	†vittata, lebhaft rosa weiss bandirt. extra Bau	—	20
355.	†Waadii, Amerika, milchweiss, fast dachziegelförmig	10	20
356.	*Wallichii, rosa mit weiss gefleckt, kugelblüthig	15	—
412.	Wappnitii, rahmweiss mit rosa gestr., regelm.	—	20
357.	Waratah, dunkelrosa, regelm.	5	10
358.	Welbanki, michweiss, unregelmässig geformt, grossblumig	7	10
359.	Weymourii, weiss mit röthlichem Anflug, anemonblüthig grossblumig	7	10
360.	Wilbrahami, hell rosa, fast paeonienförmig kugelblüthig gutgefüllt .	7	10
361.	Wilderi (Marshall Wilder), herrlich zartrosa regelmässig ziegelförmig .	10	20
413.	†William IV., glänzend dunkelroth, schön dachziegelförmig	—	20
362.	†Woodsii, schön rosa, sehr gross gutgefüllt	7	20
363.	*Youngs reed, schön weiss, sehr grossblumig, regelmässig dachziegelf.	10	15
364.	*Zephyr (il Zeffiro), sehr schön carmin dachziegelförmig	10	—
365.	Camellia reticulata *Lindl.*; rosafarbig halbgefüllt grossblumig	10	—
366.	— Sasanqua *Thbg.* (maliflora *hort.*) rosa gg. kleinbl. paeonförmig .	10	20

III. Chrysanthemum indicum Thbg. var.

Starke Stecklinge à 2½ Ngr., starke Büsche à 5 Ngr.

1. alveoliflorum *Lebois.*
2. Aramis *Lebois.*
3. Astrubal.
4. Attala *Lebois*
5. Augustinus.
6. Avocat Tardif *Ferrand.*
7. Belle d'août.
8. Berryer *Ferr.*
9. Colibri *Ferr.*
10. Comte de Chambord *Ferr.*
11. Daglide.
12. Dame blanche *Lebois.*
13. Déjanire.
14. Etoile du matin *Ferr.*
15. Française.
16. General Carrelet *Ferr.*
17. Horatius.
18. Jason *Lebois.*
19. Julie Langlade.
20. La Laponne *Bonam.*
21. La Liliputienne *B.*
22. Lartey.
23. Le Nain Bebé *Bonn.*

24. Louis Chaix *Ferr.*
25. Madame Chauvière.
26. — Heine.
27. — Julie de Lory *Lebois.*
28. — Schmitt *Ferr.*
29. M. A. Pascal *Ferr.*
30. M. J. Philopal *Ferr.*
31. multiflora.
32. Nelly.
33. Orion.
34. Paquerette *Lebois.*
35. Perle d'automne.
36. Petit Poucet *B.*
37. Pompon d'or.
38. — toulousain.
39. Protée *Lebois.*
40. Regulus.
41. Rose de amour.
42. Rosine *Ferr.*
43. Souvenir de Claudine *Ferr.*
44. — Roquancourt.
45. Sidonie *Bonn.*
46. Trianon *Ferr.*
47. Triomphe de Bordeaux.
48. Vacite *Lebois.*
49. Zephir *Lebois.*

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum.

à 2 Ngr.

50. Andromeda.
51. Athensony.
52. Danais.
53. El Dorado.
54. Hendersonii.
55. Iris.
56. Précurieuse.
57. Pégase.
58. Requiem.
59. Zenobia.

IV. Coniferae.

Die mit f bezeichneten halten im Freien aus; die mit g verlangen Schutz im Winter; wo nichts steht gehören sie fürs Kalthaus.

	Rt.	ngr.
Actinostrobus pyramidalis *Miq.* (Callitris *Sweet.*)	1	—
Araucaria Biddwillii *Hook.*	1	—
— brasiliensis *Rich.*	3	—
- Cunninghamii *R. Br.* stark	20	—
— imbricata *R.* et *P.*	$1/2$-10	—
Biota aurea (Thuja orientalis var. Sieboldii) f	—	15
— nepalensis *Endl.* (Thuja *Ldd.*) f	—*	15
— orientalis *Endl.* (Thuja *L.*) f	—	5-15
— — expansa *Endl.*	—	15
— — tartarica *Pinel.* f	—	15
Callitris quadrivalvis (Thuja articulata)	—	20
Cedrus africana *hort.* (argentea et elegans *hort.*) stark f	1	—
— Libanensis *Loud.* (Pinus Cedrus *L.*) f	1	—
Cephalotaxus drupacea *S.* et *Lucc.*	1	—
— umbraculifera *Sieb.* (Taxus Dovastinii *hort.*) f	—	20
— pedunculata *S.* et *Z.* (Podocarp. Harringtonii *hort.*	1	—
Chamaecyparis ericoides *Endl.*	—	15
Cryptomeria japonica *Don.* g	$1/3$-1	—
— Lobbii *h. Angl.*	$1/2$-2	—
Cunninghamia chinensis *R.Br.* (lanceolata *R. Br.* Belis jacutifolia *Salisb.*)	$1/2$-2	—
Cupressus australis *P.* (Callitris) stark	1	—
— Drummondii *hort.*	1	—
— funebris *Lindl.*	$1/6$-2	—
— horizontalis *Mill.* var. pendula (Thuja pendula *hort.*)	—	20
Cupressus Lindleyii *W.* (C. Lamberti *h.* macrocarpa *Hartweg*)	—	20
— sempervirens *L.* (fastigiata)	$1/6$-1	—
Dacrydium cupressinum *Sol.* (Thalamia cupressina *Spr.*) stark	1	—
— Franklini *Hook. fil.* (huonense *Cuningh.*)	—	20
Dammara orientalis *Lamb.* (alba *Rumph.*)	—	—
Fitzroya patagonica *Hook.*	$1/2$-1	—
Frenella australis *Mirb.* (Callitr.)	$1/2$-1	—
— Hügelii *hort.* stark	2	—
Juniperus communis *L.* f	—	5-10
— — β cracovica *Lodd.*	—	10
— canescens *hort.*	—	15
— excelsa *Bieb.* (Cedrus occidentali-foetidissima *Tourn.*) f	$1/3$-1	—
— — var. nana	1	—
— Gossaingthanea *hort.*	—	15
— interrupta *Wendl.*	—	15
— macrocarpa *Sibth.* (J. Wittmannii *hort.*)	—	15
— quaternata *Miq.* nova spec. (Cupressus funebris *hort.*)	1	—
— Sabina *L.* (Sabina cupressifolia *Ait.*) f	—	10
— Struthiana *hort.*	1	—
— Uhdeana *hort.* (Cupressus *Gord.*)	—	10
Pinus canariensis *Smith.* Schöne Samenpflanzen.	—	10-25
— Pinea *L.* f	—	10
Phyllocladus trichomanoides *Don.*	—	20
Podocarpus Biddwilli *Hoinbr.*	1	—
— canaliculata *hort. Bog.*	1	—

	ℛ𝓉.	ngr.
Podocarpus Corayana *Sieb.* (P. Koraiana)	1	—
— elongata *L'Her.* (Taxus capensis *Lam.* elongata *Thnb.*)	1	—
— laeta *Hoibr.*	1	—
— latifolia *Wall.*	1	—
— longifolia var. Mackii *Sieb.* (Makayi *hort.*)	1	—
— macrophylla *Don.* (longifolia *hort.*)	—	20
— mucronata *hort.*	—	20
— neriifolia *R. Br.* (macrophylla *Wall.*)	1	—
— nucifer *P.* (Taxus nucifera *Kaempf*)	—	20
— pungens *hort.* (Totara) stark	—	10
— spicata *R. Br.* (Dacrydium *Mai Cunn.*)	1	—
— spinulosus *R. Br.* (P. pungens *Cally*	1	—
Retinispora squarrosa *Sieb.* et *Zucc.* (Chamaecyp. *Endl.*	1	—
Salisburia adiantifolia *Sm.* (Ginkgo biloba *L.*)	—	10
Saxe-Gothaea conspicua *Lindl.*	$^1/_2$-1	—
Taxodium excelsum *hort.*	2	—
Taxus adpressa *hort.* (T. tardiva Cephalot. brevifol. *h.*) stark f	—	20
— baccata fol. var. *hort.* f	1	—
— — var. ericoides	1	—
— — — fastigiata *Lindl.* (T. hybernica *Hook.* pyramidalis *hort.*)	—	15
Thuja occidentalis *L.* f	$^1/_3$-4	—
— plicata *Don.* (Warreana *h.*)	—	15
Wellingtonia gigantea *Lindl.* (Sequoia gigantea *Endl.*) Samenpflanzen	2-4	—
Widdringtonia juniperoides *Endl.* (Pachylepis *Brogn.* Cupr. thujoides *hort.*)	—	20
— Wallichii *Endl.* (Taxodium Horsfalliae *hort.*	1	—

V. Fuchsia.

Species à 5 Ngr.

1. corymbiflora *RBr.*
89. Domyniana.
2. fulgens *Mor. Less.*
98 reflexa.
5. serratifolia *R. P.*
7. splendens *Zucc.*
8. syringaeflora *Ch. Lem.*

Hybriden. à 3 Ngr.

Kelch nnd Corolle roth und rosa.

39. admirable.
41. Albina.
42. Ambroise.
44. Atkinsonii.
46. Auguste Kares.
47. Beauty of Chelmsford.
48. — of Dalston.
49. — — Devonshire.
50. Bride.
10. Cassandra.
54. Duchesse of Lancaster.
55. Eclipse.
57. Elisabeth.
58. Emilie Miellez.
60. Faire Rosamunde.
62. flavescens.
4. fulgens Hartmanni.
63. Gay lad.
19. Géneral Changarnier.
69. Graf zur Lippe.
22. Great Britain.
24. Lady of the Lake (*Hend.*)
25. magnifica.
27. Mlle. Cardoville.
26. Miss Frey.
31. Nonpareil.
81. Perfection.
82. Pius IX.
84. Pourple perfection.
33. Princesse Alice.
34. Roi de Rome.
35. Rosa Gerlach.
36. serratifolia multiflora.
91. Tom.
92. Van Dyck.
94. Vauban.

mit weissem Kelch und Sepalen.

12. corymbiflora alba *Salt.*
14. Don Giovanni.
15. Dr. Jephson.
16. Duchesse of Montpensier.
64. General Negrier.
20. — Oudinot.
21. globosa alba grandiflora.
67. globosa perfecta.
23. Kossuth.
28. Minerva superba.
29. Napoleon.
30. Pearl of England.
87. Sir J. Paxton.
88. Souvenir de la Reine, extra.
37. Venus victrix.

mit violetter Corolle.

43. Aspasia.
13. delicata.
59. Emperor.
17. Fontaine.
66. Globe perfection.
72. inaccessible.
77. Mazeppa, extra.
99. microphylla.
80. Paragron.
83. Prémice.
86. Scarletina reflexa.
93. variegata superba (foliis varieg.)
95. Verrio.
96. Victor Hugo.

mit weisser Corolle à 5 Ngr.

105. Empress Eugénie.
116. Florence Nightingale.

101. Lady of the Lake.
103. Miss Story.
100. Queen Victoria.
104. Snowtrow.
102. Waternymph.

Gefüllte à 5 Ngr.

40. Agnes.
61. Fantôme.
109. violaeflora plena.

Neue à 7 Ngr.

111. Alma *Dender*.
6. Esmeralda *Milliez*.
115. Figaro.
117. Grand Sultan mit violetter Corolle.
18. leucantha *Wright*.
85. Mrs. Jules Bazille *Chv*.
108. Omer Pascha *Banks*.
106. Paul et Virginie.
110. Prince Albert *Banks*.
3. Prinzessin v. Preussen *Dend*.
45. pyramidalis multiflora *Dend*.
11. Queen of Hannover *Banks*.
107. Rafaëlo, gestreift.
30. refulgens *Gaynes*.
113. revoluta.
112. Urania *Dend*.
114. Venus de Medici.

Neueste von 1857. à 15 Ngr.

118. Albert Smith *Banks*.
119. Catharina Hayes *B*.
120. Coeur de Lion *B*.
121. Etoile du Nord *B*.
122. Little Bo-Peep *B*.
123. Souvenir de Chiswick *B*.
124. The Fair Oriana *B*.
125. Tristram Shandy *B*.

VI. Georginen, nach Farben eingetheilt.

Nachstehendes Sortiment unterlag einer so genauen Sichtung, dass — was sonst gebräuchlich — die Rangbezeichnung wegfällt. Alle hier aufgenommenen Georginen sind Rangblumen 1. Grades und kosten à Stück 5 *ngr.*

Deutsche Sonne S.

Der Name Sickmann hat unter den Georginenzüchtern gewiss einen guten Klang und wenn er selbst in seiner Ansprache an die Georginenfreunde sagt: „Das Glück ist mir in ungewöhnlicher Weise günstig gewesen“ oder „ich kann mich nicht entsinnen, eine gleich schöne Blume gesehen zu haben“ — so kann man dies wol für baare Münze hinnehmen; ich lasse daher auch wörtlich seine herausgegebene Beschreibung dieses Wunderkindes folgen.

„Reinstes schönstes leuchtendes Hellcitronengelb, wie es noch nicht vorhanden war, weit schöner und reiner als die so allgemein beliebte alte Sonne vom Elsterthal; wer diese gekannt hat, kann daher leicht den seit jener Zeit gemachten Fortschritt ermessen. Die edeln Eigenschaften dieser Georgine sind unübertroffen, z. B. die Reinheit und Eleganz der Farbe vom Aufblühen der Knospe bis zum Abfall des letzten Blattes; es stört sie darin weder Sonne, Regen noch kühle Witterung, was bei andern Blumen sehr häufig der Fall ist. Sie hat bis dato bei mir noch nicht eine einzige krüppelhafte Blume erzeugt und blüht vom kleinsten Steckling an bis zum grössten Strauche stets gut gefüllt und ohne Knopf. Je grösser die Blume wird, desto vollkommener bildet sich ihr reines schönes Centrum zu der neuen köstlichen Rosenform. Dabei bildet sie ohne Hülfe einen herrlichen, nicht zu blattreichen, aufrechten, 4 Fuss hohen Strauch, worauf sich die grossen Blumen dem Gesicht aufs angenehmste präsentiren.“

Kräftige Pflanzen werden Ende Mai zu 5 Thlr. abgegeben.

Rein weiss.

168. alba multiflora, *Sickmann*.
1. Hebe, *Deegen*; reinstes weiss, vollkommen kugelförmig.
2. Kant, *D.*; übertrifft alle bis jetzt bekannten weissen.
4. Ulrike, Gräfin von Klebelsberg, *D.*

Weiss und bandirt.

5. Amalie Winter, *D.*; mit Purpur übertuscht.
169. Falk, *D.*; weiss mit violetten Rändern und Spitzen.
8. Fantasie, *Rinz*; weiss mit gelbrothem Rand.
171. Fräulein Demidoff, *Deegen*; milchw. mit rosa Anhauch, Rosenform, Prachtbl.
10. Gellert, *D.*; milchweiss mit feinen blauen Spitzen, Prachtblume.
11. Gräfin von Brandhof, *D.*; weiss mit bläulichen Spitzen.
12. Juno, *Girl.*; aussen carminfarbig.
13. Madame Dresser, *D.*; mit carmin Rand und weissen Spitzen.

14. Madame v. Geert, *Sickmann*; mit dunkel lilla rosa.
15. — Stritter, mit blasslilla Spitzen.
174. Marchionesse of Cornwallis; weiss mit rosa getuscht.
16. Meyerbeer, *D.*; blass hautfarben.
17. Miss Vysi, *Turner*; weiss mit violettblauen Spitzen.
18. Monseigneur Picy; mit rosa Schein.
176. Princesse Alice; milchweiss mit gelbem Schein.
19. — Radziville, *Gaine*; milchweiss, mit violett carmin Spitzen.
21. Psyche, *Voisinon*; weiss mit rosa.
22. Staar, *Bragge*; milchweiss, mit rosapurpur geflammt.
23. striata multiflora, *S.*; w. hellviolettband. u. gestrichelt, die schönste bunte.

Gelb.

7. Citronenvogel, *S.*; feurig rein citronengelb, schönste Liliput.
24. Cleopatra, *Attwell*; rein schwefelgelb.
25. Duchesse of St. Alban; hellcitrongelb.
26. Ferdinand I., *D.*; leuchtend citrongelb.
27. Klopstock, *D.*; prachtvoll citrongelb extra.
28. Königin von Elsterthal, *S.*; köstlich schwefelgelb.
29. Première de Voisenon; dunkel isabellfarbig.
30. Sophie Boffinet; goldfarbig.
31. Therese, Freifrau v. Villa Secca, *S.*; schönstes schwefelgelb.
32. Anacreon, *Dubras*; goldgelb mit roth umtuschten Spitzen.

Gelb mit bunter Färbung.

33. Bunter Arras, *S.*; blassgelb mit hell und dkl. carm. Rand und Spitzen.
34. Brillante vom Elsterthal, *S.*; goldfarbig mit scharfem Rand und Spitzen.
35. Charlemagne, *Dufresne*; goldfarbig mit bräunlich scharlach.
36. Deutsche Blondine, *S.*; blassschwefelgelb, nach aussen atlasweiss.
179. Deutsche Glorie, gelb mit weissen Spitzen.
37. Deutscher Phidias, *S.*; blassgelb mit blutroth, rosa und scharlach.
38. Erbgrossherzog von Oldenburg, *Bretschneider*; brillant schwefelgelb, bisweilen mit rother Knospe.
39. Florence Dombay, *Salter*; goldgelb mit weissen Spitzen.
40. General Sir Robert Sale, *Smith*; blassgelb mit purpurnen Spitzen.
43. Hufeland, *D.*; ocher, mit achatrothen Spitzen prächtig.
44. Isis, *Truelle*; mattgelb mit weissen Spitzen und bräunlicher Einfassung.
180. Jean Paul *D.* blassgelb mit schön carmoisinrothen Rändern.
45. Liebliche vom Elsterthal, *D.*; hellschwefelgelb mit weissen Spitzen.
46. Luna, *Dewoty*; canariengelb mit weissen Spitzen.
47. Madame de Puiseguir, *Lenorme*; dottergelb mit violetten Spitzen.
48. Musaeus, *D.*; prächtig goldgelb mit rothgeflammten Spitzen.
49. Oeillet de Bizare, *Deelen*; dunkel nanquinfarbig blutroth u. breitgestreift.
50. — de Bohème, *van Geert*; hell lederg. m. rs. Anfl. u. kirschrth. Str. u. Flamm.
51. Pythagoras, *Santin*; goldfarbig mit carmoisin geflammt.
52. Pompey, *Tassart*; goldfarbig auf carmoisin gestr., die schönste bunte, extra.
53. Schelling, *D.*; bernsteinfarbig mit rosa weissen Spitzen.
182. Stern von Meidling; schwefelgelb mit dunkelen Knospen.

Braune und braun mit Abzeichnungen.

181. Adonis; dunkel chamois mit braun und weissen Spitzen.
54. Asmodeus, *Davies*; braunviolett.
55. Bathonica, *Drummond*; dunkelbraun violett.
183. Bauduin; bräunlich blutroth.
114. Bischof Athemar von Boy, *Reichard*; dunkelsammetschwarzbraun.

56. Deutsche Kunst, *S.*; goldbr. mit lilla carm. prachtv. gez. n. Färbung.
57. — Marmorrose; prächtig dunkelamaranth, auf schwarzbraunem Grunde, abwechselnd mit carmin marmorirt und geflammt.
58. Deutscher Ordensstern, *S.*; amaranthbraun mit glänzend w. Spitzen, Prachtblume und ganz constant.
184. Feuerbach, *Dg.*; schwarzbraun mit purpur Lichtstellen grossblumig.
60. General Faucher, *Rose*; röthlich rostfarben mit achat Rändern.
61. Hauptmann Schmidt, schwarzbraun mit purpurcarmin.
218. Klein, *D.*; schwarzbraun.
64. Obergärtner Stelling, *D.*; schwarzbraun mit purpur Rand.
66. Pluton, *Paris*; schwarzbraun.
67. Rival Phidias, *Batteur*; braunroth mit goldgelb gestreift.
68. Roi de Pontes, *Batteur*; schwarzbraun mit weissen Spitzen.
186. Sussex Hero, *Mitsch*; sammetartig schwarz mit carmoisin Rand.
69. Toussaint Louverture, *Fauvels*; fast schwarz extra.

Blut- und granatrothe.

71. Beständige von Köstritz, *D.*; blutroth mit reinweissen Spitzen.
187. Etendard cramoisi, *Salter*; blutroth mit carmoisin Schein.
72. Fräulein Mönch; purpurlilla.
73. General Negrier, *Rose*; achatroth mit purpur Glanz.
74. Joseph Beck; dunkel kirschroth.
76. Nelke, *S.*; blutroth gelb gestreift und gestrichelt.
77. Non plus ultra, *Gayne*; hellblutroth mit weissen Strichen.
78. Pfarrfrau von Gablenz, *Kretzschmar*; blutroth mit Mittelstreifen u. Spitzen.

Purpur- und carmoisinrothe.

79. A. Keilholz; dunkel carmoisin.
80. Artevelde, *Paris*; purpurcarmoisin mit kirschroth und weissen Spitzen.
81. Alexander v. Humboldt, *Pracht*; dunkel purp. viol. m. veilchbl. Schn., prcht.
82. Beewing, *Drummond*; carmoisin.
85. Edle von Meidling, *Dewoty*; amaranthpurpur, grosse Prachtblume.
86. Forget me not, *Girling*; dunkelcarmin mit reinweissen Spitzen.
87. Freund Winter, *S.*; schwarz kirschroth mit purp. violett gez. und gefleckt.
90. Langer Peter von Itzehoe; dunkel mordoré carmoisin, prächtig.
188. Maximilian Nisson, *S.*; carmoisin mit hellen Spitzen.
91. Parthenope, *Rinz*; rothviolett carmoisin, prächtig.
92. Seiderhelm, *D.*; bräunlich purpur mit silberlilla Spitzen.
100. Stern vom Osterlande, *S.*; dunkelpurpurviolett mit weissen Spitzen.
93. Triumph v. Köstritz, *S.*; carm. auf dunkelgrau orange mit goldfarb. Spitzen.
94. Schiller, *D.*; schön violett mit reichen weissen Spitzen, Prachtblume.
95. Wunder von Tattendorf, *Girand*; carmin mit lichtem Rand.

Violett-veilchenblau und lilla.

96. Amalie, Herzogin von Ratibor; *S.*; violett carmin auf dunkelem Grunde.
192. Bourbonrose; zart lilla mit carmin.
193. Criterion, *Zehler*; violett mit weissen Spitzen, Prachtblume.
98. Dasinsky, *Paris*; lillagrau unten amaranth.
99. Deutsche Perle; köstlich silberlilla mit weissem Rand.
100. Edle vom Elsterthal, *S.*; prächtig lilla mit weissen Spitzen.
194. Friedrich von Schiller, *D.*; violett mit rein weissen Spitzen.
101. Fürst von Thurn und Taxis, *S.*; prächtig rein lilla.
102. Geheimnissvolle, *S.*; dunkel amaranth violett mit kirschroth u. schwarzbraun. gestreift u. gestrichelt, interessante Färbung.
195. Hagedorn, *Funkes*; schön lilla Prachtblume.

104. Hofgärtner Bettzig, *S.*; prächtig dunkel lilla.
105. Jules James, *Méax*; köstlich violett mit heller Rückseite.
107. Lord Mayor, *Edward*; violett mit purpur Flecken.
108. Magnificent, *Keynes*; violett mit rosa.
196. Oberst v. d. Tann *S.*; prächtig dunkelviolett m. glänzd. schwarz purp. überz.
109. Oeillet Pantagruell; violettrosa mit carmoisin bordirt und gestreift.
110. Pauline Voldauer, *Dewoty*; schön Veilchenblau.
111. Pestalozzi, *D.*; lilla rosa auf orange Grund und feinen gelben Spitzen.

Aurora-, orange-, lachs-, ziegel- und isabellfarbig.

197. Belisaria; chamois mit rother Rückseite.
115. Deutscher Feuerstern, *S.*; leuchtend hellzinnober.
116. Deutsche Goldrose; *S.*; prächtig leuchtend orange mit goldbraunem Rande.
117. — Liebe, S.; blass isabellfarbig auf fleischf. Grunde mit carm. Sp. extra.
118. Deutscher Held, *S.*; prächtig orangescharlach.
119. Die Leuchtende, feurig orangescharlach.
198. Duc of Wellington, *Durmont*; brillant orange, extra schön.
120. Du petit Thouars, *Miellez*; ochergelb mit violetten Spitzen.
122. Fürstin Trautmannsdorf, *Girard*; lachsroth mit graurosa.
123. Gestreifte v. Elsterthal, *S.*; dunkelnanquinorange m. scharlach bandirt u. gestr.
124. incomparabilis, *Smith*; grau ocher mit blaulilla Rückseite.
125. Lady Paxton, *Turville*; bernsteinorange mit weissen Spitzen.
126. Louis van Houtte, *D.*; hell nanquin mit incarnat.
200. Marie Wenk, feurig lachsroth, prachtvoll.
127. Mignon, *Paris*; aurora mit orange, Prachtblume.
128. Morgenröthe, *S.*; cochenille in lachsrosa übergehend.
201. Pfarrer Winghofer. *S.*; dunkelrostfarbig, und lachsroth mit blasspaille Spitzen.
130. Triomphe de Meaux, *Quetier*; orange mit lachsroth.
202. Uhland, *D.*; ocher mit schwach rosa geflammten Spitzen.
131. Zschokke, *D.*; grauroth mit weissem Mittelstreif und Spitzen.

Mennigroth und scharlach.

132. Baron Rothschild, *Werker*; leuchtend scharlach ausgezeichnet.
133. Box, *Drummond*; dunkelscharlach.
204. Deutsches Feuer, *Sickm.*; glänzend scharlach prachtvoll.
135. Diaconus Martini; carmoisinscharlach.
136. Freund Carl Dosterschild; scharlachzinnober.
137. Glanz vom Elsterthal, *S.*; leuchtend scharlachzinnober, Prachtblume.
138. Glühende Kohle, *S.*; lebhaft scharlach in orange übergehend.
139. Grossfürst Michael Nicolajewitsch, *S.*; dunkelcochenillen scharlach, Prachtbl.
206. Koblukow, *Bretschneider*; scharlach mit Zinnoberglanz.
141. Leuchtende von Köstritz, *S.*; hell scharlach abwechselnd gelblich weisse Sp.
142. Leuchtkugel von Köstritz, *S.*; leuchtend scharlach prächtig.
209. Modell von Köstritz, *S.*; köstlich dunkelscharlach.
144. Poulidetto, *Millet*; hellscharlach auf dunkelgoldgelb, m. w. Sp. prächtige Färbg.
145. Prunk v. Elsterthal, zinnoberrother Rand mit weiss und dunkelblau Spitzen.

Carmin-, rosa- und pfirsichroth.

147. Arabella; blassrosa mit violetten Spitzen.
148. Basquine, *Poulet*, brauncarmin bandirt mit weissen Spitzen.
149. Conseiller Massard; sammetrosa mit weissen Spitzen.
152. Favorite, *Batteur*; centifolienrosa mit silbernem Schein.
153. Freiherr v. Biedenfeld; schönst. carmrs. auf cochen. Gr., dopp. gef. Prachtbl.
154. Friedrich Rückert, *D.*; carm. gerändert mit weissen Sp., seltene bunte Färbg.
155. Fürstin Lieven, *S.*; zart pfirsichroth lilla mit rosa Spitzen prachtvoll.

156. Heinrich Behrens, *S.*; prachtvoll carmin mit cochenille.
157. Himmel, *D.*; achat carmin, aussen orange mit rosa weissen Spitzen.
158. Hofgärtner Bosse; carmin violett doppeltgefüllt.
159. La Rosière, *Batteur*; rosa mit roth gestreift sehr gross und schön.
160. Majorenne, *Mardner*; rosa im Herz weiss.
162. Mstr. Clay; dunkel carmin mit weissen Spitzen.
163. Pius IX., *Batteur*; zartrosa mit weiss schattirt.
165. Rosenmädchen, *S.*; blass carmin.

Liliputen. à 7 Ngr.

42. Amaranthröschen; hellamaranthroth.
7. Citronenvogel, schönstes citrongelb.
151. Deutsche Liliputrose; blassrosa mit fein carmin Spitzchen.
41. Deutsches Zauberröschen *S.*; dklpfirsichr. u. hellviolett m. schwarzbraun bandirt.
150. Feenschmuck, *D.*; silberlilla mit weissen Spitzen.
212. Kleine Citronenzelle, *Sickm.*; prächtig citronengelb.
3. Kleiner Philipp; dunkelpurpurviolett.
9. Kleine Sennerinn; hellrosa mit hellen Spitzen.
214. Kleine Zigeunerin, *S.*; ganz dunkelbraun violett.
216. Liliputrose, blassrosa, mit weissen carmin Spitzen.
167. Pfirsichröschen, *S.*; dunkelpfirsichroth.
215. Queen of the East, *Barnor*; schön lilla.
217. Treuröschen, *S.*; zart rosa mit dunkeln Spitzen.

Neue Georginen. à 7 Ngr.

63. Arndt, *Degen*; feurig scharlach mit weissen Spitzen.
65. Anna Schemel, *S.*; strohgelb mit carmin Rand extra
70. Auguste Schulze, *S.*; milchweiss mit rosa Schein.
75. Castelli, *D.*; prächtig scharlach carmin.
83. Claudius, *D.*; hellrosa mit dunkelrosa geflammt und weissem Saum.
173. Fräulein Lippschütz.
88. Freund Kircher, *S.*; lachsrs. auf hellg. Gr. m. hell u. dklcarm. gestr. u. band. extr.
139. Grossfürst Michael Nicolajew; dunkelscharlach.
89. Gruss von Lancut, *S.*; hellscharlach nach innen goldgelb mit paille Einfassung.
106. Josephine Flamand; goldorange mit rothen Rändern.
121. Karschim, *D.*, rosa mit dunkeln Spitzen
59. King bloadet; dunkelbraunroth.
62. Madame Zehler.
210. Neuer Planet; blassscharlachcarmoisin mit goldgelbem Rand vielbl.
129. Pfarrer Kronenberger, *S.*, rosa chamois.
146. Perle v. Daadem, *Berlings*; prächtig scharlachzinnober.
164. Prinzessin Marie von Dessau, *S.*; hellrosa mit dunkelcarmoisin Spitzen.
140. Ritter v. Morosoff, *S.*; dunkelcarmoisin mit gelben Saum und rothen Streifen.
143. Thekla Steinbart, *S.*; milchweiss mit violetten Spitzen und weissem Saum.

Neueste bewährte Georginen. à 10 Ngr.

213. Gärtnerbraut, *S.*; Grund weiss rosa m. sammtig. dunkelcarmin Sp. prächtig.
218. Gruss an Wien, *S.*; blasslilla weiss m. dunkeln getuschten Sp. u. dunklem Centrum; schönste Rosenform.
219. Gutsbesitzer Mack, *S.*; hellscharlach carmoisin mit weissen Spitzen.
280. Meisterstück, *S.*; schwarzbraun mit lichten Rändern prachtvoll.
221. Mollière, *de Rossignier*; scharlach mit weissen Spitzen.
222. Napoléon III, *S.*; orange zinnober, schönste Form, Lilipute.
223. Kleiner David, *S.*; lachsrosa mit weissen Spitzen.

224. Kleine Emilie, *Mardn.* strohgelb mit rothen Spitzen.
225. Kleine Rosenbraut, *S.*; blassrosa mit dunklem Rand.
226. Liebesblick, *S.*; goldig isabella mit dunkelcarmoisin Spitzen, extra.
227. Liliputkönigin, *S.*; blaulilla mit violetten Spitzen.

VII. Pelargonien.

I. Englische grossblumige, ältere.

à 7½ Ngr.

1. Adèle *Foster.*
57. Alione *Bendl.*
2. Anathe *Foster.*
3. Apollo.
4. Arabella *Gain* et *Garth.*
5. Archibishop of Canterbury *Master.*
6. augustissimum.
7. — fastuosum.
8. Camilla *Willson.*
10. Clarissa *Garth.*
11. Constellation *Garth.*
59. Derbight.
13. Elanissa.
61. Eliza superba *Foster.*
14. Enchantress *Foster.*
15. Fair maid of Devonshire *Veitch.*
64. Flash. *Garth.*
65. floridum.
16. Fräulein Bachmann.
17. Freiherr von Finke.
18. Friedrich Wilhelm IV.
19. Gem of the West *Nairn.*
20. Hamlet *Lyne.*
66. Hariarthianum.
21. Ivanhoe *Willson.*
22. King of Saxonia *h.Angl.*
23. — — France.
24. Lady Nikesdale.
67. Lifeguardsman *Foster.*
25. Magog. *Foster.*
26. Master Piece *Gaines.*
68. Mathilde *Foster.*
69. Medora *Foster.*
70. Mogarth.
27. Mogul *Gaines.*
28. Nabob *Foster.*
29. Namelus *Garth.*
71. Oberon *Hodges.*
30. Orange perfection *Gain.*
72. Paterot.
81. Perfection *Garth.*
32. Premier *Garth.*
33. Pride of Surrey *Gain.*
34. Princesse Royal.
73. Priory King *Baskelt.*
35. pungens.
74. Rameau *h. Par.*
36. Rosetta *Foster.*
75. Selima *Foster.*
76. Talisman *Demay.*
37. Tamburini.
38. The Cid. *Foster.*
39. Van Amburgh *Wills.*
78. velutinum elegans.
40. Victoria *Garth.*
79. Vulcain *Foster.*
80. Wildfire.
81. Zamzumium.

II. Neue grossblumige.

à 10 Ngr.

82. Aspasia *Gaines.*
83. Beatrice *Hoyle.*
85. Berne *Trimmer.*
86. Chamaeleon.
89. Dr. Andry *Chauv.*
130. exquisitum.
131. Gendry.
91. Generalissimo *Hoyle.*
96. Louis van Houtte *Trim.*
97. Mochanna *Hoyle.*
98. Nectar Cup. *Hoyle.*
99. occellatum *Hoyle.*
133. Orion.
134. Painter improved.
135. Pericles.
137. Queen of the Virgin.
100. Reuoron.
139. Seduisant.

III. Neueste engl. grossblumige.

à 15 Ngr.

141. Christine *Finke.*
142. General Ochsenbein *Hüsser.*
143. Heinrich *Finke.*
146. Nestor *F.*

IV. Neue grossblumige, fünffleckige (Diadematum).

à 20 Ngr.

Alle Petalen sind gefleckt, in Form, Farbe und Haltung unübertrefflich. Dabei ausserordentlich reich blühend, sind sie nicht genug zu empfehlen.

121. Adèle Odier *Odier.*
103. Auguste Milliez *Od.*
148. Céline.
126. Elise Milliez *Od.*
149. Etoile de jardin *Od.*
150. Eugènie Duval *Od.*
127. Géneral Eugène Cavaignac *Od.*
152. Gustave Odier *Od.*
109. Jacques Duval *Od.*
153. Mad. de Lamoricière *Od.*
128. — James. Odier *Od.*
154. — Leselle.
112. Non such *Hoyle.*
156. Salomon.
157. Suzette.
129. Zaria *Hoyle.*

V. Neueste grossblumige fünffleckige.

Von Miellez in den Handel gegeben und nach den Abbildungen zu urtheilen lassen sie sowohl in Farbenpracht als der Form nichts zu wünschen übrig.

à Stück 2 Thlr.

123. Jeanne d'Arc. *Miell.*
124. Leonidas *Miell.*
155. multimaculatum *Miell.*
151. Noemi *Miell.*

VI. Fancy-Varietäten ältere. à 10 Ngr.

42. Belle Africaine.
43. Lélia.
44. Mazeppa superba *Font.*
45. Mulatto.

46. Prima Donna *Henders.*
47. Queen Victoria *Sheph.*
48. Splenii.
49. Vesta *Foster* et *Wills.*
50. Ytolinski *Chand.*

VII. Neue Varietäten.

à 10 Ngr.

102. Atalante.
125. Aurora *Chnd.*
159. Enfant d'Abel.
161. Gärtnerstolz *Krtzmr.*
111. Lady Flora *Hasting.*
122. Madame Falk.
164. Mlle Fanny Hünewadel.
167. multiflora.
168. Ruhm v. Seefeld *Hüss.*
119. Sidonie *Od.*
120. Triomphe de la tour *Odier.*
169. Urania.

VIII. Neuestes Fancy.

Von Miellez dieses Jahr in den Handel gegeben à Stck 2 Thlr.

130. Roi des fantaisies. Grosse runde Blume, die obern Petalen lebhaft carmin rosa mit weissem Saum, die untern P. lilla rosa mit weisslicher Mitte, sehr reich blühend.

IX. Curiosity.

à 10 Ngr.

172. Copenhagen.
173. Curiosity.
174. Don Quixote.
175. excellent.
191. tricolorum.

X. Scarlet, ältere.

à 5 Ngr.

176. Charles Domage.
177. Cheiri chek.
51. Firebal.
62. Goliath.
63. Miss Arndt.
54. Queen Victoria.
178. Reidii.
179. rubens Domage.
55. superbum *Foster.*

180. Triomphe de Paris.
56. zonale fol. varieg.

XI. Neue à 7 Ngr.

181. Amél. d'Albancourt *Bab.*
182. Boule de feu.
183. — — neige *Malet.*
184. Gloire de Plantier *B.*
185. Lucia rosea perfecta *Hüsser.*
186. Master Piece.
187. Mr. Louis Chaix *Ferr.*
188. Vesta *Krtzr.*

XII. Neueste Scarlet.

Erst in den Handel gegeben, meist buntblättige Sorten à 1 Thlr.

189. Culford Beauty *Hend.*
190. Lady Dorothy Neville *Hend.*
192. Mrs. Lennox *Hend.*
193. Goliath *D.*
194. Guttenberg *D.*
191. quercifolium superbum *Hend.*

VIII. Petunien. à 5 Ngr.

Carl Hossfeld *Kratzsch.*
Dr. Andry.
— E. Regel.
Don Pedro *Rinz.*
Duc d'Oporto *Rinz.*
Freund Schüle.
Friedrich Gogel.
imperialis, const. gef. blüh.
Ketzelii.
Königin von Dänemark.
Mad. Eug. Lemischez *Rendtl.*
— Loyre.
Oberlehrer Eisenbrand.
Protée *Rendtl.*
striata formosissima.
souvenir *Rinz.*
Thüringens Glory *Krtzsch.*
Vulcan.
W. Müller *Krtzsch.*
Wilhelm Pfitzer.

IX. Rhododendron.

	Thl.	ngr.
61. arboreum *Sm.* argenteum coccineum	—	15
1. — belle Leopoldine	—	15
62. — Ben Johnsonii	—	15
2. — Burggravianum	—	15
63. — Cunninghamii	—	15
3. — Deleanum	—	15
64. — foetidum	—	15
4. — glabrum	—	15
5. — grandidissimum	—	15
65. — jubatum	—	15
66. — Knights Seedling	—	15
67. — magnificum	—	15
6. — magniflorum	—	15
71. arboreum *Sm.* pictum fl. aureo	—	15
70. — Princeps	—	15
69. — punctatum superbum	—	15
72. — Rollissonii	—	15
73. — Smithii novum	—	15
74. — — speciosum	—	15
75. — Smiths Seedling	—	15
7. — speciosum *Smith*	—	15
76. — venustum majus	—	15
77. — verum	—	15
8. — Waeberi *h. Dresd.*	—	15
9. — Wilmoutii	—	15
10. — Wiltonii	—	15
78. Catawbiense *Mchx.*	—	15

		Rℓ.	ngr.
11.	Catawbiense *Mchx.* Duc de Brabant *V. Htte.*	2-3	—
12.	— étendard de Flandre	1-2	—
13.	— fastuosum fl. pl. *V. Htte.*	1/2-1	—
79.	caucasicum	—	15
14.	cinnamomeum *Ldl.*	1/2-1	—
15.	Gibsoni *Hortul.*	1/3-2/3	—
16.	hybridum (maximum)	1/3-4	—
17.	— Cartonianum *Ldl.*	—	10
18.	— enneandrum *D. C.*	—	10
19.	hybr. (v. Azalea sinens.) aureum *Smith*	1	—
20.	— (v. Azalea) carneum elegantissimum *hort.*	1	—
21.	— (— —) Norbitonense	1	—
22.	— (— —) Yellowish	1	—
23.	javanicum *Bennet* (Vireya *Bl.*)	1	—
24.	nepalense	—	15
25.	ponticum *L.*	1/6-2	—
80.	— eximium album	—	15
81.	— hybridum	—	15
52.	— Lowii	—	15
26.	— Vervaeneanum fl. pl. *Vervaene*	1/2-1	—
27.	Rollissoni	—	15
28.	zeylanicum	—	15

Rhodod. vom Sikkim-Himalaya.

Die Preise der ersten Reihe gelten für starke, die der zweiten für 1jährig veredelte.

		Rℓ.	Rℓ.
29.	aeruginosum *Hook. fil.*	2	1
30.	Alpine Red	4	2
31.	Alpine Shrubby	4	2
32.	aromaticum *Hook. fil.*	4	2
33.	barbatum *Wall.*	2	1
34.	calyculatum *Hook. fil.*	2	1
35.	campylocarpum *Hook. fil.*	2	1
36.	ciliatum *Hook. fil.* (lilacinum)	2	1
37.	cinnabarinum *Hook. fil.*	2	1
38.	cordatum *Hook. fil.*	4	2
39.	Dalhousiae *Hook. fil.*	—	—
40.	Edgworthii *Hook. fil.*	2	1
41.	Falconerii *Hook. fil.*	4	—
42.	fulgens *Hook fil.*	2	1
43.	glaucum *Hook fil.*	2	1
44.	lancifolium *Hook fil.*	2	1
45.	niveum *Hook fil.*	2	1
47.	Thompsonii *Hook fil.*	2	1
48.	Wallichii *Hook fil.*	2	1
49.	Wightii *Hook fil.*	4	2
50.	spec. very fine scarlet	2	1

Neueste Einführungen. Rhodod. von Assam und Bhotan.

Sie zeichnen sich schon durch Eleganz der Blätter vorzüglich aus.

51.	Boothii *Nutt.*	4	3
53.	calophyllum *Nutt.*	4	2
54.	eximium *Nutt.*	4	2
55.	Jenkinsii *Nutt.*	—	—
56.	Kendrickii *Nutt*	4	2
57.	Keysii *Nutt*	4	2
58.	longifolium *Nutt.*	5	2
59.	Nuttalli *Booth.*	5	3
60.	Windsori *Nutt.*	4	2

X. Rosen.

Zur besseren Uebersicht ordnete ich die einzelnen Abtheilungen alphabetisch.

Rosa Thea Isabella Grey.

Auch unter den Rosen giebt es Wunderkinder; die vorstehende gehört dazu. Nicht nur dass sie rein goldgelb (nicht wie ihre Schwestern stroh-, citronen- oder canariengelb) blüht — sondern dass sie bei einem verschwenderischen Blüthenreichthum weder gegen Regen noch Sonnenschein empfindlich ist, sind an gelben Rosen noch nicht gekannte Tugenden. Sie hat auch ihre Doppelgänger, unter den Namen *Miss Grey*, *Miss Julia*, *Mary* oder *Jane Grey*. Die Engländer, mehr noch deren Garten-Organe, die doch sonst bei Florblumen etwas verwöhnt sind — sind voll des Ruhmes über sie!

Ich erlasse ältere à 2 Rℓ., junge Veredlung à 1 Rℓ.

R. Ayrshira (arvensis, capreolata). Kletterrosen.

		ngr.
384.	Banksiaeflora	10
385.	Leopoldine	10
1.	plena	5
392.	Queen of the Prairies	10

R. Banksia.

		ngr.
2.	lutea plena	5

R. Bourbonica.

429.	Accidalie	10
13.	Duc d'Isly	10

		ngr.
427.	George Cuvier	10
404.	Grillon	10
14.	Hermosa	6
351.	Lewson Gower	10
15.	Madame Soldini	6
16.	Pierre de St. Cyr	3
225.	Pourpre fafait	10
17.	Princesse de Croy	3
352.	Souvenir de Desire	10
212.	— de Malmaison	10
426.	Talmer	10
353.	Triomphe de la Duchère	10

R. bracteata.

3.	Leonidas	4

R. centifolia.

9.	Louis Napoleon	5
5.	panachée *Vibert*	5

R. centifolia muscosa.

377.	Quatre saisons	10
354.	Ferrugineuse de Luxemburg	10
355.	Hermann Kegel	10
344.	Jenny Lind (Reine des Mousseuses)	20
345.	L'Ainéi	20
423.	Mad. Salet (Remontirt)	20
346.	Nuits de Young	20
420.	Oscar Leclerc (remontirt)	20
356.	Pompon mousseux	10
381.	unique de provence	10
357.	Zoë	10

R. Lawrenceana.

18.	kermesina	3
19.	— plena	3
20.	Ruhm de Lawrenceana	3
21.	varietas nana	3

R. lutea (capucines).

4.	jeune de Perse	10

R. microphylla.

22.	bicolor nouvelle	3
23.	de Luxembourg	3
24.	purpurea de Luxembourg	3

R. multiflora.

25.	bicolor	3
26.	noisettina	6
27.	purpurea	5

R. Noisettiana.

		ngr.
28.	à grandes fleurs violette.	3
398.	Aimé Vibert	10
29.	à odeur très suave	3
30.	Adelaïde d'Orleans	3
31.	Aimé Heine	3
32.	amabilis	3
33.	Azetta.	4
34.	Bougainville	3
35.	Carbonari	3
36.	Camellia purpurea	3
354.	Caroline Marniesse	10
37.	changeante	5
38.	Charles X.	6
39.	Chaurinaus superbe	6
40.	Cherari	3
41.	Circe	5
42.	communis plena	3
43.	d'Anjou	3
44.	Desprez	3
45.	Duc de Broglie	6
46.	Duchèsse de Champagne	3
47.	Fellenberg	6
48.	Isabelle d'Orleans	6
49.	Isle de Bourbon	3
356.	Jacques Amyot	10
50.	La cherie	6
51.	Lafayette	5
52.	Lée	6
357.	Madame Desprez	10
53.	Marianne	5
54.	media	4
55.	mignonne	6
56.	nymphe Echo	3
57.	Puseau	4
58.	Roi de Cramoisi	3
59.	rosea	4
60.	Rotanger	5
61.	Smiths Yellow	10
62.	spectabilis	3
63.	Thelaïne	3
64.	Theodor Körner	6
358.	Vicomtesse d'Avesnes	10
65.	victorieuse	5

R. perpetuelles et Portlands.

232.	Adele Mauzé	10
233.	Amande Patenotte	10
234.	Armide	12
235.	Belle americaine	12
236.	Blanche Vibert *Vibert*	12
237.	Comte de Derby *Vibert*	10
238.	Couronne de Béranger	8
348.	Crillon *Vibert*	10
239.	du Roi striée	8

		ngr.
240.	Duchesse de Rohan	12
241.	Julie de Krüdner *Laffey*	12
242.	— de la Roche *Vibert*	12
243.	Lady Seymour	10
244.	Lawrence de Montmorency	10
245.	Léonide Leory *Vibert*	10
246.	Louise Puget	10
247.	— Bordillon *Vibert*	10
248.	Madame Aimée	10
249.	— Trudeau *Boll.*	12
259.	Mogador (Rose du Roi pourpre)	10
251.	Odeska *Vibert*	10
252.	Olivier de Serre *Vibert*	12
253.	Petite Négresse *Vibert*	12
254.	ponctuée	10
255.	Prince de Galles	10
256.	Rosalba *Vibert*	10
257.	Sappho *Vibert*	10
258.	Sydonie *Vibert*	10

R. pimpinellifolia.

10.	lutea plena	10

R. provincialis.

389.	Belle Elise	10
11.	Narcisse Salvandy *Parment.*	10
349.	splendens	10
12.	tricolor de Flandre *v. Htt.*	15

R. remontantes.

		ngr.
359.	Admiral Cecile	10
259.	Angelina	12
387.	Angeline Grangère	10
260.	André Chènière *Robert*	15
261.	Antigone *Vibert*	12
262.	anomale	12
263.	Auguste Mie *Laffey*	20
264.	Augustine Mouchelet	10
265	Aurelia	15
266.	Baronne Halley de Claparède *Port.*	12
267.	Baron Prévost	10
401.	Belle Boule	15
360.	Bertha de Sansal	10
268.	Blanche Lamoroux	10
361.	— Vibert	10
400.	Bourbon rose	15
269.	Bouton de fleurs	12
363.	Capitaine Reynard	10
362.	Caradori	10
270.	Caroline de Sansal *Desprez*	15
271.	Casimir de Lavigne *Vibert*	15
272.	Charles Boissier	15
273.	Chenie de Chateaubriand *Oudin*	10
380.	Chereaux	10
274.	Claire Duchatel	10
275.	Clémence Isaure *Robert*	20
364.	Collardeau	10
388.	Colonel foèpè	10
276.	Comte Bobrynski *Marest*	12
277.	— de Bourmont *Oger*	20
278.	— d'Eu	12
279.	— de Devonshire	12
280.	— de Montalivet	12
412.	— Odard	15
365.	— Odwet	10
281.	— de Paris	12
282.	Comtesse de Duchatel	10
366.	Coquette de Bordeaux	10
379.	— — Maidon	10
283-	Coupe de Hebé	15
402.	d'Assas	15
284.	Delphine Hay *Vibert*	20
285.	Desgaches *Lacharme*	15
286.	Docteur Arnal *Roeser*	12
287.	— Marjolin	10
288.	Duc d'Aumale	10
289.	Duchesse de Nemours	10
290.	— — Southerland	10
368.	Duplessis Mornay	10
367.	Du Roi	10
291.	Edouard Jesse	10
292.	— Leczinski	12
293.	Elise Miellez	15
294.	— Mosser	12
295.	Ernestine de Brabant	10
416.	Felicité de Rigeaux *S.*	15
296.	Géant des batailles *Guillet*	12
297.	General Allardt	10
298.	— Délaage *Robert*	20
299.	— Morangiez *Portemer*	10
378.	Genie Chateaubriand	10
300.	George Lecamus *Laffey*	12
301.	Gloire d'Angers *Boyan*	12
415.	— de France	15
302.	— de Rosanienne	12
383.	grand conquerant	10
303.	Guilbert Slater *Vibert*	12
304.	Guillot	12
409.	Henriette Laval	15
305.	Henri IV. *Vibert*	12
369.	Imodia	10
413.	Imperatrice Josephine	—
306.	Joasine Banet *Vibert*	20
307.	Jacques Lafitte *Vibert*	20
308.	Lady Elphinstone	10
309.	— Fordwick	10

	ngr
386. la gigantesque	10
310. Lane	10
411. La superbe	15
421. Léon Haymann	15
311. Louis Bonaparte	10
370. Louise Bordillon	10
312. — Peronny *Lacharme*	15
313. Ludovic Letanel *Ducher*	15
314. Madame Andry *Verdier*	15
347. — Campbell d'Islay (Triomphe de Valenciennes)	20
315. — Cornet	12
316. — Fremion *Margottin*	15
371. — Humblot	10
317. — Laffey	12
318. — Lamoriciere *Port.*	12
319. - Peupin *Verdier*	12
382. — Trudeau	10
328. Marquise Bocella	10
321. Merope	12
322. Mistress Elliot	10
323. Montaigne I. *Vibert*	12
324. — II.	15
372. Noémi	10
373. Pelagie magnifica	10
374. Paul Fontaine	10
325. perpetuelle mousseuse	15
326. Pie IX. *Vibert*	12
327. Princesse Hélène	10
328. Prince Albert	10
329. Pourpre Royal *Laffey*	10
375. Prudence Roeser	10
330. Rachel	10
331. Reine Mathilde *Oger*	12
332. Rivers	10
333. Robin Hood	15
334. Roussard *Vibert*	12
335. Rose de la Reine *Laffey*	10
336. Rosine Margottin *Margottin*	15
407. Sidonie	15
337. Tasso	10
386. Thetis	10
338. Tite-Live *Vibert*	12
376. Triomphe de Paris	10
339. Trojan	10
340. vaillante bergère	10
341. William Griffith *Portemer*	15
342. — Jesse	10
343. Yolande d'Arragon	10

R. semperflorens (bengalensis).

	ngr
66. Admiral de Rigny	5
67. Alfonsonia	3
68. Archiduc Charles	6
69. belle de Dames	3
70. — — Monza	3
71. — Isidore	5
72. Bernard de Montholon	5
73. Bischonia	6
74. Bison d'Angers	3
75. Bouquet à fleur rouge	4
76. Calvertia purpurea	3
77. Calypso	3
78. camelliaeflora	3
79. camellia alba	5
80. — Flora nova	3
81. César Cardet	6
82. Cheremite de Soigne	3
83. comble de gloire	4
84. Comptoniana	3
85. Cupido	6
86. Darius	3
87. Deton	4
88. Duc de Berry	3
89. Duchesse de Parma	6
90. — de Kent	5
91. Eugène Beauharnais	6
92. Fabvier	3
93. Fackirli	6
94. Fénélon de Luxembourg	5
95. fulgens	3
96. gloire d'Auteuil	3
97. — de Daniel	4
98. — — Guérin	4
99. — — Peley	5
100. grande Hercule	4
101. — vallée	3
355. Hudsonica plena	10
102. la croix	3
103. la superbe	6
104. lychnidiflora	3
105. Marquise of Cornwallis	4
106. Miranda	5
107. Mstr. Bosanquet	6
108. Molinieri	3
109. nouvelle de Marseille	4
110. Osiris	4
111. paeoniaeflora	6
112. Paluvienne	3
113. Penelope Luxembourg	6
114. Prinz Wilhelm	6
115, purpurea	5
116. ranunculoides purpurea	5
117. splendens	6
118. tenella	6
119. très double	6

ngr.

120. Turenes 6
121. victoire d'Aumy 3

Rosa Thea.

122. à odeur de muscate 3
123. abricotée 6
124. Aegina 4
125. Aetna 3
126. africana 4
127. alba 5
128. — imperialis 5
129. Archiduchesse de Palatina . . 3
130. — Therèse Isabelle 5
131. Barbot 6
132. belle Archinto 3
387. — Chinoise 10
133. — Ferronier 5
134. — Helene 3
135. — Levaillère 3
136. Bergmann 5
137. Besnier 6
138. Bigottine 3
139. Bougère 6
140. Bourbon 6
141. Buret 4
142. Camellia centifolia 6
143. Caroline 5
144. Catharina II. 5
145. — Maria 5
146. Charles Raibaud 6
147. Chrysocome 6
148. coccinea de Cels 6
149. Collwill's Crimson 6
150. Corinna I. 5
151. — II. 5
152. Delphine Gaudot 6
153. de soeur 6
154. Devoniensis 6
155. Diana de Bollwiller 5
156. Douceur de Henri IV. 5
157. du bonheur 3
158. Dubreil 5
159. Duc de Grammont 5
160. Duchesse de Lavalliere 6
161. D'Yebles 5
162. Egine 3
163. Emilie 5
164. Fiancé d'Abydos 5
165. Flon 10
166. Gamma 6
167. globosa 3
168. Gloire de Hardy I. 5
169. — — — II. 5

ngr.

170. glorieuse 4
171. Goubault 5
172. Governativa 5
173. gracilis 5
174. grande Monarche 6
175. Haddington 5
176. Hamon 6
177. hortensis 10
178. Hymenée 5
179. jaune panachée 5
180. Jenny Colon 6
181. la desirée 3
182. la Reine de Calcout 6
183. la croix 6
184. lactea grandiflora 3
185. Lady Warender 5
186. Lavallière 3
187. Lavienne Darcule 6
188. lilacina 4
189. Linné 4
190. Lord Pelphogor 6
191. Lucile Delmart 5
192. Louet 5
193. Melanie Willermoz 6
194. Milbille. 5
195. Narcisse 10
196. — du Bourbon 6
388. née à Fromont 10
197. nouvelle excellente 6
198. Nubienne 5
199. Nymphe Egérie 3
200. Princesse de Joinville 6
201. — Marie 5
202. Queen Victoria 20
203. Regina Victoria 3
204. Roi de Saxe 3
205. — — Siam 3
206. Royal Leopold 4
207. Romain 5
208. rose à cinq couleurs 10
209. sarmenteuse 3
210. Silche 5
211. Smiths Yellow (Sm. jaune) . . 10
213. Stephanie 5
214. Strombia 3
215. superba modesta 6
216. Taglioni 5
217. Theobaldine 6
218. Thonia 6
219. triomphe de Bollwiller . . . 6
220. — du Luxembourg 6
221. Triumph Orleans 6
222. triumphans 4

	ngr.
223. Valentine	5
224. venusta	6
225. Vesuv	6
226. victoire modeste	5
227. Vicomtesse Descazes	6
228. virginale	5
229. Viriginie	5
230. Wiener Thea	6
231. Zenobia	3

Uneingereihte.

	ngr.
490. Belle de Florence	10
6. cordica striata	3
391. Diadème des fleurs	10
344. Fanny	10
7. hybrida Maltonensis	5
8. Lanouviensis	5

XI. Verbenen.

Durchwinterte Pflanzen à Stück $2\frac{1}{2}$ Ngr., à Dutzend 25 Ngr.

3. alba variegata maculata.
2. Anatole.
7. Alexander Ernst.
10. Aline.
9. Barkerii.
14. Belle Etoile.
5. Boudoir de Vénus.
11. Boule de feu.
18. Brillant de Vaise.
22. Carl Michel.
15. Castellane *Den.*
30. Comte de Neipperg.
32. Criterion.
33. curiosa.
35. Deutscher Ruhm.
40. Duc d'Alençon.
20. elegans.
24. Eleonore. *Den.*
26. Emma.
41. Flora.
60. General Bosquet.
61. Gloire française.
64. Grand Sultan.
66. Jacob Dender.
27. Imperatrice Eugenie.
39. Ingrami
34. Louis Philippe.
36. Madame Briolett.
70. — Cambacères.
71. — Neubert.
74. Mlle. Grosjean.
75. — H. Stüpfel.
76. Maonettii *Rossi* (Kaiserin Elisabeth).
77. Marginate.
78. Marie Baumbach.
44. Minerva.
79. Mr. Alhalin.
81. — Cocardon.
82. — Richalet.
83. Mss. Woodroff.
45. Parfum Madelaine *Den.*
67. Prima Donna.
50. Renovera.
94. Sarah.
53. scabra
88. Schamyl.
89. Semiramis.
56. St. Margarethe Barker.
91. Surprice.
92. Sydonie.
93. Wunderful.

Neuere.

à Stück 3 Ngr., à Dutzend 1 Thlr.

6. Aigle de Meaux.
8. Dr. Anton Clemann *Kr.*
17. J. C. Schmidt *Kr.*
Le lion des combats.
19. Mad. Fabry.
21. — Ramberg *Kr.*
23. Mars *Kr.*
29. Napoléon.
31. Rosette.

Neueste diesjährige.

à St. 15 Ngr.

Comte de Morny, *L. Duflot.* Grosse runde scharlachrothe Blume mit grauem Auge.

Comtesse de — *L. Duflot.* Grosse runde schneeweisse Bl. mit rosa Centrum und weissem Auge.

Madame Miellez *L. Duflot.* Grosse runde Blume von lebhaftem schönem Rosa und dunklem Centrum mit grünlichgelbem Auge.

Freilandpflanzen.

Stauden.

Die mit **b** bezeichneten Pflanzen müssen im Winter bedeckt werden, die mit **g** bezeichneten gehören während des Winters ins Kalthaus.

	Fl.	ngr.
Acanthus mollis *L.*	—	10
— niger *Mill.*	—	10
Achillea asplenifolia *Vent.*	—	3
— Eupatorium *hort.*	—	3
— Ptarmica fl. pl.	—	3

Die niedlichen weiss gefüllten Blumen der letzten lassen sich gut als gefüllte Myrthe verwenden, da sie derselben täuschend ähnlich sehen.

	Fl.	ngr.
Aconitum grandiflorum *Pall.* (productum *Rchb.*)	—	3
— Napellus *Dod.*	—	3
— tauricum *Wulf.*	—	3
Allium azureum *Fisch.* . . . . z	—	5
bAlstroemeria psittacina vid. Amaryllideen	—	5
bAnemone japonica *Zucc.* et *Sieb.*	—	5
gAnthirrhinum majus *L.* β fl. pl.	—	10
— — var. Harlequin . .	—	5

Schöne buntgestreifte Varietät.

	Fl.	ngr.
Aquilegia vulgaris *L.* fl. pl. . .	—	3
Aralia nudicaulis vid. Araliaceen.		
— racemosa vd. Aral.		
Arundo Phragmites *L.* fol. varieg.	—	15

Sehr decorative buntblättrige Schilfart.

	Fl.	ngr.
Aster acuminatus *N. E.* (abbreviatus *N. E.* cornutus *Mill.*) .	—	3
— aestivus *Ait.*	—	3
— cordifolius *L.*	—	3
— ericoides *L.*	—	3
— miser *L.*	—	3
— multiflorus *Ait.*	—	3
— novae Angliae *L.*	—	3
— paniculatus *Ait.*	—	3
— spectabilis *Ait*	—	3
— versicolor *W.* (mutabilis *h.*)	—	3
Astrantia major *L.*	—	3
Bellis perennis *L.* var. Highlander	—	5
Betonica grandiflora *W.*	—	3
— orientalis *L.*	—	3
Cacalia suaveolens *L.*	—	5
Calimeris incisa	—	5
Calystegia pubescens *Ldl.* fl. pl. .	—	3

Unter allen Schlingpflanzen für den Garten mag wol so leicht keine dieser den Rang streitig machen. Vorlieb nehmend mit jeder Lage und jedem Boden, schmückt sie den Sommer über jede damit bepflanzte Wand, Laube, Pfeiler oder Pyramide mit dem saftigsten Grün, noch gehoben durch ihre massenhaften, grossen rosenrothen einer schönen gefüllten Rose gleichenden Blumen.

	Fl.	ngr.
Campanula bononiensis *L.* (Thaliana *Wallr.*)	—	5
— persicifolia *L.*	—	5
gCanna vide Scitamineae.		
Centaurea cruenta *W.*	—	5
— macrocephala *W.*	—	5
— montana *L.* (mollis *Kit.*) .	—	5
— stereophylla *Bess.*	—	5
Chrysanthemum indicum vide pag. 62.		
Cimicifuga foetida *L.*	—	10
Clematis erecta *L.* . . . . . s	—	5
— integrifolia *L.* . . . . . s	—	5
— lasiandra *Fisch.* (angustifolia (*Jacq.* var.?) . . . . s	—	10
b — tubulosa *Turcz.* (mongolica)	—	10
Coreopsis auriculata *L.* var. Warnierii	2	—

Empfehlenswerthe Neuheit, blüht ununterbrochen vom April bis November reichlich mit schönen grossen gelben Blumen.

	Fl.	ngr.
— verticillata *L.* (delphinifolia *Lam.*)	—	5
Delphinium bicolor *hort.*	—	5
— fissum *Kit.* (velutinum *Bertol.*)	—	5
— hybridum Iveryanum fl. albo pl. *V. Poulet*)	3	—

Neue reinweisse gefüllte sehr empfehlenswerthe Hybride.

	Fl.	ngr.
Dianthus caryphyllus *L.* calendularum . . . . à	—	10

Zwei schöne gefüllte Varietäten dieser immerblühenden Nelke.

	Fl.	ngr.
Dicentra formosa *hort.* (Dielytra *D. C.*)	—	5
— spectabilis *h.* (Dielytra *D. C.*)	—	5

Letztere ist wegen ihrem graziösen Bau, Reichthum und Schönheit nicht genug zu empfehlen. Im ersten Frühjahr erscheinen ihre zarten herrlich rosafarbigen Blüthenrispen. Sie hält vollkommen aus und lässt sich gut treiben.

	Fl.	ngr.
Dictamnus Fraxinella *P.* (albus *L.*)	—	10
— giganteus *auct.?*	3	—

Sehr empfohlene Neuheit. Die Blüthenstengel werden 3—4' hoch, Blätter und Blüthen sehr gross, letztere rosa mit purpur nüançirt; die Diptams eignen sich vorzüglich als Einzelpflanzen auf Rasenplätzen.

Fl. ngr.

Digitalis lanata *Chrk.* (Winterli *Roth.*) . . . . — 5

gDiplacus glutinosus *Nutt.* var. grandiflorus . . . . — 10

Blüht reich und schön, schon die kleinsten Stecklinge zieren sich mit Blüthen.

g — puniceus *Nutt.* . . . . — 5

Doronicum Pardalianches *L.* . . . — 3

Dracocephalum Ludovicianum *h.* — 3

Epimedium alpinum *L.* . . . . . — 3

Ein liebliches Frühlingsblümchen, vorzüglich für Steingruppen passend.

Erigeron bellidifolius *W.* (Serpentarius *Banks.*) . . . . . . — 3

Eryngium amethystinum *L.* (? azureum *Dsf.*) . . . . . . — 3

— planum *L.* . . . . — 3

Eupatorium variifolium *hort.* . . — 3

Fritillaria imperialis *L.* var. lutea — 5

Funkia lancifolia *Sprgl.* fol. var. (lanceaefol. *Dens.* japonica *hort.* fol. varieg. . . . . . — 15

Eine prächtige buntscheckige Freilandblattpflanze.

Galatella dracunculoides *Lam* . — 5

— trinervis *Dsf.* (rigida *Cas.*) — 5

Gentiana acaulis *L.* (angustifolia *Vill.*) . . . . — 7

Schöne dunkelblaue Glocken. Köstliche Felsen- und Einfassungspflanze.

Geranium aconitifolium *L'Her.* (rivulare *Vill.*). . . . . . . — 3

— Lancastriense *hort.* . . . . — 3

— macrorrhizum *L.* . . . . . — 3

— sanguineum *L.* . . . . — 3

— sibiricum *L.* . . . . — 3

— Vlassovianum *Fisch.* . . . — 3

Gnaphalium margaritaceum *hort.* — 5

gGynerium argenteum *N. E.* . . . — 10

Eine sehr effectvolle, besonders für Rasenpartien geeignete Gramineae.

Hedysarum obscurum *L.* (alpinum *Jacq.*) . . . . — 5

Helianthus laetiflorus *P.* (atrorubens *Lam.* ? luxurians *hort.*) — 5

— Maximiliani *Schrad.* . . . . — 5

— mollis *Lam.* (pubescens *W.* tomentosus *Mchx.*) . . . — 3

— orgyalis *D. C.* . . . . — 3

Hemerocallis fulva *L.* . . . . . — 3

bHypericum Webbii *Steud.* (Triadenia *Spach.* Androsaem. *Spach.*) . . . . — 5

Inula germanica *L.* . . . . . . — 5

— Helenium *L.* . . . . — 5

Fl. ngr.

Inula verbascifolia *Poir.* (thapsoides *Spgl.*) . . . . — 5

Iris flavescens *Redout.* . . . . . — 5

— germanica *L.* (nostras *hort.*) — 3

— pallida *Lam.* (odoratissima *Jacq.*) . . . . — 3

— sibirica *W.* var. leucantha. — 3

— squalens *L.* . . . . — 3

— variegata *L.* . . . . — 3

Lilium vide Amaryllideen et Liliaceen.

bLobelia cardinalis *L.* . . . . . — 5

b — texensis *Rafin.* (cardinalis *hort.* atrosanguinea *hort.*) . — 5

Sehr brillant blühende Gruppenpflanzen.

Lychnis chalcedonica *L.* . . . . — 3

— viscaria *L.* fl. pl. . . . . . — 3

Lysimachia ciliata *L.* . . . . . . — 5

Lythrum Salicaria *L.* . . . . . — 3

— virgatum *L.* (acuminatum *W.*) — 3

Mentha piperita *L.* fol. variegatis — 3

Mimulus moschatus *Dougl.* . . . — 3

Monarda fistula *L.* . . . . . . — 5

— purpurea *Pursh.* . . . . . — 3

Morina longifolia *D. C.* . . . . . — 10

Myosotis azorica *H. C. Wats.* . . — 5

Nepeta macrantha *Fisch.* (Dracocephal. sibir. *L.* Moldavica elata *Mch.*) . . . . — 3

bOxalis Bowei *Ait.* . . . . z — 5

b — flava *L.* . . . . z — 5

b — tetraphylla *Auv.* (esculenta *hort.*) . . . . 12 Stück — 3

— violacea *L.* . . . 12 „ — 3

Papaver orientale *L.* . . . . — 5

bgPenstemon albidum *Nutt.* . . . — 5

— atrocoerulea *hort.* . . . . . — 5

— Clausii *hort. Belg.* . . . . — 5

— fruticosum *hort.* . . . . . — 5

— gentianoides *hort.* (Hartwegii *Benth.* . . . . — 5

— — β coccinea . . . . . — 5

— — γ elegans . . . . . — 5

— magnificum *hort.* (Hybride) — 10

— Murrayanum *Hook.* . . . . — 5

— Premice de Plantier *hort.* (hybr.) . . . . — 10

— splendens azurea *h.* (hybr.) — 5

Die Penst. nehmen unter unsern Gruppenpflanzen einen hohen Rang ein, denn schöne lang dauernde Blüthen schmücken die dunkelgrüne Belaubung der buschig wachsenden Pflanzen, ja oft entfalten sie im Herbst in Töpfe gepflanzt, ihre Blüthen im Glashause bei Oberlicht.

Rß. ngr.

Phlox decussata *Lyon.* (acuminata *Pursh.*

In folgenden neuen und neuesten ausgezeichneten Varietäten. Es ist erstaunlich wie reich hierin das Glück die Kunst der Kreuzung — durch Grösse der Dolden und Lieblichkeit des Farbenschmelzes belohnte.

à Stück 10 Ngr.

1. Adolphe Fontaine.
2. admirabilis.
3. Amelia Ferry.
4. Arthur
5. Brillant.
6. Comtesse de Rudepont.
7. Crepuscule.
8. De Lademelle.
9. Davorchez.
10. Evèque de Nîmes.
11. Kraemer.
12. Louis Noisette.
14. Mad. Bis.
15. Mlle. Amandine.
16. — Judith.
17. — Lecerf.
18. — Lemichez.
19. — Mathilde.
20. Magnificent.
21. Mr. Bordier.
22. — Hennig-Fontaine.
23. — Gros.
24. — Guezon Duval.
25. — Güldenschuh.
26. — Margautin.
27. — Saucerotte.
28. — Vidal.
29. — Zimmermann.
30. purpurea superba.
32. Roi Leopold.
37. Shepherdii.
33. Souvenir de Fion.
34. — de 29. Octobre.
36. — d'un ami.
31. Virginiana.
35. Wilhelm Schürer.

gPhygelius capensis vid. Kalthauspflanzen.
Physalis Alkekengi *L.* . . . . . — 3
Physostegia imbricata *Hook.* . . . — 5
Polemonium coeruleum *L.* . . . . — 3
— — fl. albo . . . . . . — 3
Polygonum coccineum *Mühlbg.* . . — 5
Potentilla atropurpurea *hort.* . . . — 3
— Gesneriana *hort.* . . . . . . — 5
— grandiflora *Linné* . . . . . — 3

Rß. ngr.

Potentilla Hopwoodiana *Sweet.* . — 5
— Luciae *hort.* . . . . — 10
— Mac Nabiana *hort.* . . . . — 5
— Russeliana *hort.* . . . . . — 5
Primula acaulis *L.* rosea intus lutea — 15
— alpina *Schleich.* . . . . . — 5
— Auricula *L.* var. nigra plena — 20
— — Luiker aus einem Mustersortimente . . . . . a — 5
— farinosa *L.* . . . . — 5
— integrifolia *D. C.* . . . . . — 3
— undulata *Fisch.* . . . . . — 5
— veris *L.* Mazurelliana fl. pl. — 15
— — nanquin fl. pl. . . . . — 15
Pyrethrum Balsamita *W.* (Chrysanthemum *hort.*) . . . . . — 3
Rheum Emodi *hort.* . . . . . . — 10
Empfehlenswerthe Blattpflanze.
Rudbeckia hirta *L.* . . . . — 3
— laciniata *L.* . . . . — 3
gSalvia azurea *Lam.* (Lilleana *h.*) — 5
g — fulgens *Cav.* (cardinalis *H.B.*) — 5
g — — fol. var. . . . . — 5
g — gesneriaeflora *h. v. Htte.* . — 5
g — Grahamii . . . . — 5
g — Heerii *Rgl.* . . . . — 5
g — ianthina *Lk.* et *Otto* . . . — 5
g — involucrata *Cav.* . . . . . — 5
g — Roemeriana *hort.* . . . . . — 10
g — splendens *Ker.* (colorans *h.*) — 5
b — tricolor *hort.* (officinalis *L.* var.?) . . . . — 5
— verticillata *L.* . . . . — 3
Bei irgend nahrhaftem Boden bilden selbst schwache Pflanzen bald dichte Gruppen, deren Flor bis zum Spätherbst währt.
Saponaria officinalis *L.* . . . . . — 3
Saxifraga crassifolia *L.* . . . . . — 3
— sarmentosa *L.* (chinensis *Lour.* stolonifera *Jacq.*) . . . . . — 3
Sedum Sieboldii *Sweet.* (*Loud.*) . — 5
Sempervivum arachnoideum *L.* . . — 3
Senecio Doria *L.* (altissimus *Mill.*) — 5
Serratula gigantea *hort.* . . . . . — 5
Sylphium ternatum *Retz.* . . . . — 5
Solidago flexicaulis *L.* (scrophulariaefolia *Mill.*) . . . . . — 3
— gigantea *Ait.* (serotina *W.* non *Ait.*) . . . . — 3
— villosa *Pursh.* (Bosciana *Sw.*) — 3
Sonchus floridanus *Lim.* . . . . — 3
Spiraea Filipendula *L.* . . . . . — 5
— japonica *Sieb.* . . . . — 5
— lobata *Jacq.* . . . . — 5

	Fl.	ngr.
Stachys lanata *Jacq.*	—	5
Statice scoparia *Pall.*	—	10
Sehr effectvolle schöne Staude.		
Succisa australis *Rchb.* (Scabiosa repens *Brignol.*)	—	3
Swertia perennis *L.*	—	3
Symphytum orientale *L.*	—	3
Thalictrum aquilegiaefolium *L.*	—	5
Telekia cordifolia *D. C.* (speciosa *Bmg.*)	—	5
Thermopsis fabacea *D. C.* (rhomfol. *R. Nutt.*)	—	5
Tradescantia crassifolia *Cav.*	—	5
— Lyonii *hort.*	—	5
— subaspera *Ker.*	—	5
Trollius altissimus *hort.*	—	5
— asiaticus *L.*	—	5
— europaeus *L.*	—	5
— medius *hort.*	—	5
— speciosus *hort.*	—	5
Tussilago fragrans *Vill.*	—	5
Valeriana officinalis *L.*	—	3
Veronica austriaca *L.* (polymorpha *W.* Jacquinii *Schott.*)	—	3
— Bachofenii *Häuff.*	—	3
— gentianoides *Vahl.* (gentianaefol. *Swt.*)	—	3
— gracilis *R. B.*	—	3
— longifolia *L.*	—	3
— maritima *L.* (oxyphylla *Ster.*)	—	3
— — var. alba	—	3
— scaberrima *hort.*	—	3
— Waldsteiniana *Schott.* (spicata *L.* confusa *R.* et *S.*)	—	3
Viola arborea *L.* fl. pl.	—	3
— obliqua *Ait.* var. striata	—	3
— odorata *L.* fl. pl.	—	3
— pyrolaefolia *Poir.* (lutea *h.*)	—	15
b — tricolor *L.* var. Agnes Sorel	1	—
Waldsteinia trifolia *Roch.*	—	5
Zauschneria californica *Presl.*	—	5

Ziersträucher und Bäume.

Die mit **b** bezeichneten müssen im Winter geschützt werden.

	Fl.	ngr.
Acer pseudo-Platanus *L.* fol. varieg. hochstämmig	—	5-10
Ailanthus glandulosa *Dsf.*	—	5
Amygdalus pumila *hort.* (nana *L.*)	—	5
Amorpha fruticosa *L.*	—	5-10
bAndromeda rosmarinifolia *Pursh.*	—	5
Aralia japonica et spinosa vide Araliaceen	—	—
bAucuba japonica *Thbg.*	—	5-15
b — — var. latimaculata	—	20
bAzalea pontica vide Azaleen	—	—
Berberis aristata *Dc.* (Chitria *Hamilt.* angustifolia *Roxb.* floribunda *Wall.* petiolaris *Wall.*)	—	5
— vulgaris *L.*	—	3
— — flore albo *Mill.*	—	5
bBignonia radicans *L.* (Tecoma *Juss.*) r	—	10
Vorzügliche Kletterpflanze, welche in guter etwas geschützter Lage im Sommer reichlich prachtvolle Blüthen bringt.		
Buxus sempervirens *L.* *a.* arborescens *Mill.*	—	5
— — β fol. varieg.	—	5
Caragana arborescens *Lam.*	—	3-5
— pygmaea *Dc.*	—	5
Castanea vesca *L.*	—	5-20
Cephalanthus occidentalis *L.*	—	10
Chionanthus virginica *L.*	1	—
bCissus antarctica *Vent.*	—	5
b — variegata *hort.* r	—	5
bClematis azurea *Sieb.* v. grandiflora r	—	15
b — bicolor *Ldl.* r	—	10
— florida *Thbg.* r	—	5
— — — fl. pl. r	—	5
b — patens *Dcne* var. Hélene (*Sieb.*) r	—	15
b — — — — Sophie (*Sieb.*) r	—	15
— viticella *L.* fl. pl. r	—	5
Colutea arborescens *L.*	—	5
— cruenta *Ait.* (orientalis *Lam.* sanguinea *Pall.* humilis *Scop.*)	—	5
— media *W.*	—	5
— Pocockii *Ait.* (haleppica *Lam.* istria *Mill.* procumbens *L'Her.*)	—	5
Cornus alba *L.* (stolonifera *Mchx.* tatarica *Mill.*)	—	3
— sanguinea *L.* (foemina *Raf.*)	—	3
Coronilla Emerus *L.*	—	5
Crataegus orientalis *MB.* (odoratissima *hort.*)	—	5-20
— Oxyacantha *L.* fl. rubro	—	5-10

Rß. ngr.

Crataegus Oxyacantha *L.* fl. pl. . . — 5-15

— — splendens . . . . — 5-10

Cydonia japonica *P.* (Pyrus) . . . — 10

Gehört zu den effectvollsten blühenden Sträuchern des zeitigsten Frühjahrs; in weiter Entfernung leuchten die grossen scharlachrothen Blüthen.

— vulgaris *P.* maliformis *Mill.* — 6

— — pyriformis *Mill.* . . . . — 6

Cytisus biflorus *L'Her.* (supinus *Jacq.*) . . . . — 5

— glomeratus *Boj.* . . . . . . — 5

— Laburnum *L.* . . . . — 5-15

— — fol. involutis *hort.* . . . — 10

— — quercifolius *hort.* (incisus *hort.*) . . . . — 10

— sessilifolius *L.* . . . . — 5

— tomentosus *hort.* . . . . . . — 5

Deutzia corymbosa *R. Br.* (Philadelphus *Wall.*) . . . . . — 5

— crenulata *Sieb* et *Zucc.* . . — 5

— gracilis *Zucc.* (vera.) . . . — 5

— scabra *Thnbg.* . . . . — 5

— sanguinea *hort.* . . . . . . — 5

Die 3 letzteren lassen sich gut treiben, am vorzüglichsten passt jedoch gracilis dazu, denn sie machen mit zahlreichen weissen Blüthenträubchen einen guten Effect.

bElaeagnus reflexa *hort.* . . . . — 20

— angustifolius *Pursh.* . . . . — 5

Evonymus europaeus *L.* (vulgaris *Scop.*) . . . . — 3-5

— latifolius *Scop.* . . . . . . — 5

b — japonicus *Thbg.* fol. variegatis . . . . — 5-10

b — — — — maculatus . . . — 5-10

Beide sehr schöne immergrüne, buntblättrige Sträucher.

— verrucosus *Scop.* . . . . . . — 5

Fagus sylvatica *L.* . . . . — 5

— — fol. purpureis *Ait.* . . . . — 10

Gleditschia triacanthos *L.* (meliloba *Walt.* spinosa *Dnh.*) . . — 10

bGlycine chinensis *Curt.* . . . . . — 10

Schön gefiederte Blätter, herrliche blaue Blüthentrauben machen diese Pflanze, da sie sehr schnell Lauben, Wände und Pfeiler decorirt, für jeden Garten unentbehrlich.

Hedera vide Araliaceen . . . . . — —

Hydrangea hortensis *Sm.* . . . . — 5

— — fol. variegat. . . . . . . — 10

Vorzügliche weiss geschechte Decorationspflanze.

Ilex aquifolium *L.* albo-marginatum *hort.* . . . . — 20

— ciliata *hort.* . . . . — 15

Rß. ngr.

Ilex dipyrena vera *hort.* . . . . . — 15

— furcata *hort.* . . . . — 15

— serrata *hort.* . . . . — 15

— undulata *hort.* . . . . — 15

Kalmia glauca *Ait.* . . . . — 6

— spec. *Ait.* . . . . — 10

Ligustrum italicum *Mill.* . . . . — 8

Lonicera canadensis *Bartr.* (ciliata *Mhlbg.*) . . . . — 5

— Caprifolium *L.* β praecox r — 6

— Goldii *hort.* . . . . — 5

— Ledebourii *Eschsch.* . . . . — 5

— tatarica *L.* . . . . — 3-5

Magnolia acuminata *L.* . . . . . — —

Mahonia aquifolium *Nutt.* stark . — 15

— fascicularis *D. C.* . . . . . — 20

Mespilus Azarolus *hort.* (Crataegus *L.*) . . . . — 5-10

— caroliniana *hort.* . . . . . — 5

— Crus galli *Poir.* (cuneifolia *Mch.* hyemalis *Walt.* lucida *Wgnh.* Crataegus *L.* C. cuneifolia *Lodd.* lucida *Wgnh.* — 5-10

— sanguinea . . . . — 5-10

Paulownia imperialis *Sieb.* et *Zucc.* 1/6-1 —

Einer der schönsten Bäume für Anlagen, in warmer Lage gepflanzt, entwickelt derselbe eine Vegetation, wie kein anderer Baum; nur bedarf er des fleissigen Schnittes, damit er immer wieder grosse Blätter erzeuge.

Philadelphus coronarius *L.* . . . — 5

— floribundus *Schrad.* . . . . — 5

— Gordonianus *Lindl.* . . . . — 5

— hirsutus *Nutt.* (villosus *Lodd.*) — 5

— Zeyherii *Schrad.* . . . . . — 5

Phillyrea latifolia *L.* . . . . . . — 10

Prunus caroliniana *Ait.* . . . . — 5

— Padus *L.* . . . . — 5

Pyrus Botryapium *L.* . . . . . — 5-10

— communis *L.* fl. pl. . . . . — 5-10

— prunifolia *W.* (Malus β *Ait.* hybrida *Dsf.* baccata *hort.* rubicunda *Hffgg.*) . . . . . — 5-10

— spectabilis *Ait.* (M. sinensis *Dum.*) . . . . — 5-10

Quercus pedunculata Ehrhardt β fastigiata *Lam.* (pyramidalis *hort.* viminalis *Rosc.*) . . . — 15

Rhododendron ponticum vid. pag. 72.

Rhus Cotinus *L.* . . . . — 5-10

— elegans *Ait.* (glabra, coccinea *Loud.* caroliniana *Mill.*) — 5

Ribes aureum *Pursh.* (Chrysobotrya revoluta *Spach.*) . . . . . — 3

	Fl.	ngr.
Ribes Beatonii *hort.*	—	5
— Corinthium *hort.*	—	5
— Gordonii *hort.*	—	5
— sanguinea *Pursh.* (Calobotrya sanguinea *Spach.*)	—	5-10
Robinia hispidissima inermis	—	5
— inermis pyramidalis	—	15
— viscosa *Vent.* β fl. albo	—	10
Sambucus nigra *L.*	—	3
— racemosa *L.*	—	5
Spiraea adiantifolia *hort.*	—	5
— incisa *Thbg.*	—	5
— laevigata *L.* (altaica *Pall.*)	—	10
— opulifolia *L.*	—	5
— prunifolia *Sieb.* et *Zucc.* fl. pl.	—	5-10
— Reevesiana *Ldl.* (corymbosa *Roxb.* non *Rafin*)	—	5-10
— salicifolia *L.*	—	3
— — fl. rubro	—	6
Symphoricarpus racemosa *Mchx.* (leucocarpus *hort.*)	—	3
— — fol. varieg.	—	5

Ein sehr netter u. decorativer Strauch.

	Fl.	ngr.
Syringa chinensis *W.* (media *Dum.* sibirica *hort.* dubia *P.* rhodomagensis *Ren.*)	—	5
Syringa Josikaea *Jacq. fil.*	—	5
— persica *L.*	—	5
— vulgaris *L.* de Marly	—	10
— — Prince Notger	—	10
— — Valentiana	—	7
— — virginalis (alba major)	—	6
Ulex europaeus *L.*	—	5
Viburnum dentatum *L.*	—	5
— Lantana *L.*	—	5
— Opulus *L.*	—	5
— — fl. pl.	—	5-10
Vitis quinquefolia *Lam.* (Ampelopsis hederacea *L.*) r	—	5
— tiliaefolia *hort.* r	—	5-10
Weigelia rosea *Lindl.*	—	5-15

Ein herrlicher Strauch für jeden Garten passend. Er hält die strengsten Fröste aus, baut sich recht buschig und im Frühsommer ist er förmlich mit rosa Blüthen bedeckt; die rosa Farbe verändert sich mit der Dauer der Blüthe, so dass an einer Pflanze oft verschieden gefärbte Blumen vorhanden sind.

En-gros-Preise.

Warmhauspflanzen.

Nur nach meiner Wahl; sowie Hundert-Preise nur bis 50 Stück, und Dutzend-Preise nur bis ein halb Dutzend berechnet werden; ebenso gelten die Preise für Knollen nur bis zum April, dann treten Stückpreise ein. Da wo doppelte Preise vorgemerkt sind, steht es frei, die Wahl auf bessere Sorten oder stärkere Exemplare zu beziehen.

Stück				Fl.	ngr.
12	Acanthaceen in 12 Species			2	—
100	Achimenes, mit Namen, ältere Sorten	k	starke Knollen	1	20
100	— — — neuere Sorten	k	— —	2	20
12	— Chirita (Scheeria mexicana)	k	— —	—	15
100	— — — —	k	— —	3	10
12	Aeschynanthus, in 6 Sorten, stark		für Ampeln	2	—
12	Allamanda, div. Spec.			2	—
6	Alloplectus, div. Spec.		blühbar	2	—
12	Amaryllideen in 12 Species			6	—
100	Ananas, (durchwinterte Kindel)		sehr stark	15	—
100	— 2jährig } geripppte, rundbeerig,		— —	65	—
12	— 3jährig } geripppte, rundbeerig,		— —	16	—

Ananas-Früchte sind fast im ganzen Jahre vorräthig, die Preise richten sich nach der Jahreszeit und dem zu entnehmenden Quantum, Anmeldungen zu grösseren Lieferungen müssen zeitig im Frühjahre geschehen.

Stück		Fl.	ngr.
6	Araliaceen in 6 Species	3-6	—
12	Ardisia crenulata	2-3	—

Stück			ℛℓ.	ngr.
12	Aristolochia, in div. Spec.	r blühbar	2	—
12	Aroideen in 12 Species, kletternde, grossblättrige und einziehende oder auch getrennt	stark	2-4	—
25	— in 25 Species	—	4-8	—
12	Begonien, grossblättrige und schön blühende, oder getrennt		2	—
25	— in 25 Sorten, worunter die neueren		6	—
12	Biophytum sensitivum, Sinnpflanze v. Seite 2		2	—
12	Bromeliaceae in divers. Gattungen	stark	2-4	—
25	— — — —		3-6	—
12	Calodracon, Charlwoodia, Cordyline, Dracaena		2-4	—
12	Carludovica palmata		6-12	—
6	Cephalotus follicularis		30	—
12	Cissus discolor		2-4	—
12	Clerodendron div. spec.		3	—
12	Coffea arabica		3	—
100	— —		20	—
12	Crinum erubescens	blühbar	3-4	—
100	— —		20-24	—
12	Croton pictum		4	—
12	Curculigo recurvata		2-4	—
12	Cyclanthus cristatus		6-12	—
12	Dionaea muscipula, Fliegenfalle der Venus		3-12	—

Da sie sich im Zimmer gut cultivirt, so giebt sie für Handelsgärtner (in netten Töpfchen mit kleinen Glasglocken) allerliebste Nipptischpflanzen.

12	Dioscorea alata et discolor	k	1	20
12	Dracaena arborea	1 Fuss	2	—
12	— terminalis rosea	üppig, 6 Zoll	2	—
6	Echites div. spec.		1	15
12	Eucharis grandiflora et candida		12	—
12	Farrn in 12 Species fürs Warm- od. Kalthaus od. fürs freie Land		2-4	—
50	— in 50 Spec., darunter seltnere		10	—
12	Ficus, in div. schönen Species		2-6	—
12	Gardenia radicans, bis zum Sommer mit Knospen		3	—
12	— — Halbstämme, veredelt, mit Kronen und Knospen		4-6	—
12	Gesneria Geroldiana, zebrina et zebrina grandiflora (Nägelia)	k	—	15
12	Gloxinien, mit Namen	k stark blühbar	1	—
6	Gloxinia erecta, in 6 div. Sorten	k —	1	15
12	Heliconia, div. spec.		3	—
12	Heliotropium, div. hybr.		1	—
6	Hexacentris div.		1	20
12	Hibiscus, div.		2	—
12	— in 6 div. Species		1	20
12	Hippeastrum robustum (Amaryllis Tettauii)		6-12	—
12	— rutilum		3-6	—
12	— solandriflorum (Amaryllis)		3-10	—
100	— — —		20-80	—
12	Hoya, div. spec.	r stark	2	—
12	Hura crepitans		10-20	—
12	Hymenocallis expansa (Pancrat.)		20-50	—
12	Ilex paraguayensis		3	—
12	Illicium div. spec.		3-4	—
12	Ipomaea, div. spec.	r f blühbar	1	—
12	Isolepis prolifera et pygmaea	Ampelpflanzen	1	6

Stück				Thlr.	ngr.
6	Jasminum Sambac, grandiflorum, multiflorum	r	blühbar	1	20
6	—		gefüllt blühende	2	—
12	Inga Saman et pulcherrima			4	—
12	Justicien, div. spec.	f		1	20
12	Kämpferia Galanga	k		1	20
12	Lantanen, div. spec.	f		1	—
12	Lycopodium, div. spec.			1	15
12	Mammea americana			18-24	—
6	Manettia, div.			—	20
12	Maranta, div. spec.		blühbar	1⅔-6	—
12	Melastoma, div. spec.		—	1	20
12	Methonica div.			4	—
12	Myristica Horsfieldii			3	—
12	Nymphaea Ortgesiano-rubra		starke Knollen u. blühb.	4	—
12	Orchideen, div. spec.		blühbar	12-24	—
50	— — —			40-80	—
6	Pancratium, div.			4	—
12	Palmen, div.		1 Fuss hoch	48	—
12	— Attalea speciosa		Samenpflanzen	40	—
50	— — —		Samenpflanzen	144	—
12	— Bactris spinosa		—	48	—
12	— Calamus micranthus		ältere	48-70	—
12	— Cocos butyracea			48	—
25	— — —			80	—
6	— — nucifera		3 Fuss hoch	50	—
12	— Desmoncus horridus		Samenpflanzen	48	—
12	— Geonoma pinnatifrons		—	36	—
50	— — —		—	128	—
6	— Iriartea praemorsa		Samenpflanzen	18	—
12	— Livistonia borbonica		8 Wedel	72	—
12	— — Mauritiana			72	—
6	— Oenocarpus utilis		ältere	40	—
12	— Oreodoxia regia			8	—
100	— — —			50	—
1000	— — —			333	—
6	— Rhapis flabelliformis		ältere	12	—
12	Passifloren, in div. spec.		stark u. blühb.	2-3	—
12	Pereskien div.			2	—
12	Plumbago, div. spec.			1	20
12	Phyllanthus augussifolius			3	—
12	Psidium div. *spec.*			3	—
12	Rondoletien			2	—
12	Ruellien, div. spec.		blühbar	1	—
12	Russelia, div. spec.		—	2	—
6	Saccharum officinarum, Zuckerrohr			2-3	—
12	Scitamineen, div. Gattungen			2-6	—
12	Scutellaria, div. spec.		blühbar	1	20
12	Smilax Sarsaparilla			4	—
12	Siphocampylus, div. spec.		blühbar	1	20
6	Solanum in 6 Species			3	—
12	Spondias Mombin			10-30	—
12	Thunbergien, div. spec.	r f	blühbar	1	20
12	Thyrsacanthus barlerioides, rutilans			3	—

Stück			Thl.	ngr.
12	Torenia asiatica et concolor	r	1	20
12	Tradescantia, div. spec.	blühbar	1	—
12	Tydaea neuste in 12 div. Species		3	—
12	Vinca rosea et alba		1	20
100	Warmhauspflanzen in 100 Sorten	meist blühbar	10-20	—
100	Warmhaus-Decorationspflanzen		16-24	—
12	Warmhauspflanzen rankende		2	—
25	— buntblättrige		6	—
12	— —		4	—
12	Wasserpflanzen div. schöne spec. für Bassins	blühbar	2-4	—
12	— — — — — Zimmeraquarien		2	—

Kalthauspflanzen,

jedoch nur nach meiner Wahl u. s. w.

Stück			Thl.	ngr.
12	Abutilon, div. spec.		2	—
50	Amaryllis Belladonna		8	—
12	Azalea indica, in 12 Sorten	buschig	2	—
12	— ohne Namen, stark blühbar		1	20
100	— mit Namen	buschig	13	—
12	Bignonien, div. spec. 1—2 Fuss	r	1	15
12	Camellien, mit Namen, wurzelächt 1/2—1 Fuss		2	—
100	— — — 1/2—1 Fuss s. den Anhang		12	—
12	— neuere und neueste Sorten, 1/2—1 Jahr		4	—
50	— — — — — —		12	—
12	Canna, div. spec.	f k	1	20
12	Chrysanthemum, starke Büsche, zum Theilen	f	1	—
12	Citrus div.		2	—
12	— chinensis		3-6	—
12	Coniferen in 12 div. spec.		2-4	—
12	Crassula coccinea		1	20
12	Cuphea, div. spec.	f	1	—
12	Cyclamen, div. spec.	k	2	10
12	Daphne, div.		1	20
6	Datura arborea		1	—
12	Diosma, div. spec., buschig		1	20
12	Echeveria, div.		1	20
12	Fuchsia, in 12 neueren Sorten	f	1	6
12	Georginen, die neuesten und besten in Knollen	k	1	20
100	— , die neuen und neuesten in Knollen		10	—
12	Gladiolus div.		2	—
12	Habrothamnus, div. spec.		1	15
12	Hedera, div. spec., sehr stark		1	20
12	Melaleuca, div. spec., ästig, 1—2 Fuss		1	15
12	Metrosideros semperflorens, 1—2 Fuss		1	15
12	Mitraria coccinea		1	20
12	Pelargonium, ältere		2	—
12	— neuere und neueste		3	—
12	Petunien, neueste		1	—
12	Rhododendron arboreum		5	—
12	— Sikkim Himalaya, Assam et Bhotan		24	—
12	Rosa semperflorens, Noisettiana et Thea, nur gute Sorten	e	1	6
12	— Thea, nur gute Sorten	f	1	20

Stück			Th.	ngr.
12	Rosa ohne Namen, nur gute Sorten, stark	e	1	—
12	Salvia, in div. spec.	b	1	10
12	Tropaeolum, neueste		1	20
12	Verbenen, in 12 Sorten	25 ngr.—	1	—
12	Veronica, div. spec.		1	20
12	Viburnum Tinus		1	15
12	Zephyranthes candida	z	1	15
100	Kalthauspflanzen, blühbar		10-20	—

Freiland-Pflanzen.

12	Calystegia pubescens fl. pl.	1	—
12	Clematis viticella fl. pl.	1	15
12	Deutzia gracilis vera	2	—
12	— div. spec.	2	—
100	Oxalis tetraphylla	—	20
100	— violacea	—	20
6	Paulownia imperialis	3	—
12	Penstemon, diverse	1	20
12	Phlox decussata, neueste	3	—
12	Primula Auricula, Luicker aus einem Mustersortimente	1	—
12	Rosen fürs Freie, als Remontante, Prov. Perpet., nur gute Sorten	4	—
100	Stauden in 100 spec.	8	—
50	— — 50 —	5	—
12	Symphoria racemosa	1	—
12	— — fol. var.	1	20
100	Zierbäume und Sträucher in 50 Sorten	16	—
50	— — — — 25 —	10	—

Obst.

100	hochstämmige Aepfel aus einer vorzüglichen 100 Sorten starken Collection	20	—
12	— —	4	—
100	— Birnen, Auswahl aus 70 der vorzüglichsten Sorten	24	—
12	— —	4	—
12	Himbeeren Falstolf Seedling	—	24
100	Ananas-Erdbeeren, grossfrüchtige	2	—
12	Stachelbeeren, grossfrüchtige, extra schöne, in Rummel	1	—

Camellien à 100 Stück 12 Thlr.

Um den öfteren Anfragen zu begegnen, welche Sorten bei obigem Preise gegeben werden, lasse ich hier die betreffenden Nummern folgen: No. 7, 9, 17, 23, 48, 51, 60, 69, 71, 90, 93, 99, 101, 120, 122, 130, 139, 140, 145, 153, 158, 177, 181, 186, 198, 199, 206, 214, 257, 272, 273, 290, 304, 310, 323, 341, 349, 357, 360, 362.

Index Catologi

1858.

En-gros-Preise.

Druck von Ackermann u. Glaser in Leipzig.

